

LISTADO REVISADO DE LA FLORA VASCULAR DE LA COMARCA DE REQUENA-UTIEL (VALENCIA, ESPAÑA)

P. Pablo Ferrer Gallego^{1*}

Javier Fabado Alós²

Javier Armero Iranzo³

Iván Moya Antón³

Víctor París Huerta³

Emilio Laguna Lumbreras⁴

¹Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000, Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF), Generalitat Valenciana

²Jardí Botànic de la Universitat de València

³Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO)

⁴Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF)



Ononis tridentata subsp. *angustifolia*
(Lange) Devesa & G. López.
Foto: Iván Moya.

RESUMEN

Se aporta el listado florístico revisado (*checklist*) de las especies vegetales pertenecientes a la flora vascular presentes en la comarca de Requena-Utiel (Valencia, España). Este listado se ha construido a partir de las observaciones de campo realizadas por los autores, así como por la recopilación de datos sobre la corología de este grupo de plantas. La información compilada, bien aparece publicada en trabajos de índole científica, bien está incluida en el Banco de Datos de la Comunidad Valenciana. Asimismo, otra fuente de información relevante han sido los pliegos de herbario, testigos de recolecciones que se han realizado a lo largo de la historia dentro del territorio de esta comarca, y que se encuentran depositados en diferentes herbarios, principalmente en el del Jardí Botànic de la Universitat de València, o en las colecciones conservadas en el Real Jardín Botánico de Madrid o en el Institut-Jardí Botànic de Barcelona. La superficie de la comarca, con aproximadamente

1.725 km², representa el 7,4% del total de la superficie de la Comunidad Valenciana (con 23.255 km²); en toda ella se han registrado 1.540 especies de flora vascular, lo que supone el 43,63% del total de los táxones presentes en el territorio valenciano. Estos valores reflejan que la comarca es, sin duda, un área de gran riqueza florística dentro del territorio valenciano. Algunas de las especies más relevantes desde el punto de vista científico son: *Allium cyrilli*, *Anagallis monelli*, *Astragalus oxyglottis*, *Bupleurum tenuissimum*, *Centaurea toletana*, *Ceratocephala falcata*, *Cotoneaster tomentosus*, *Crocus nevadensis*, *Cynomorium coccineum*, *Dactylorhiza fuchsii*, *Damasonium polyspermum*, *Elatine brochonii*, *Eleocharis quinqueflora*, *Frangula alnus*, *Himantoglossum hircinum*, *Isoetes longissima*, *Leucanthemum maestracense*, *Littorella uniflora*, *Lomelosia divaricata*, *Lonicera splendida*, *Lythrum borysthenicum*, *Lythrum thymifolia*, *Marsilea strigosa*, *Narcissus bulbocodium*, *Ornithogalum bourgaeum*, *Platanthera montana*, *Phyllitis scolopendrium*, *Puccinellia hispanica*, *Rhamnus pumila*, *Sisymbrella aspera*, *Taxus baccata*, *Teucrium pugionifolium*, *Thymus lacaitae*, entre otras muchas. Un total de 66 especies figuran dentro del listado de flora protegida de la Comunidad Valenciana (Orden 2/2022, de 16 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se actualizan los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna), siendo el reparto el siguiente: 5 especies dentro de la categoría de «En peligro de extinción» (*Elatine brochonii*, *Isoetes longissima*, *Littorella uniflora*, *Marsilea strigosa*, *Myriophyllum alterniflorum*); 4 en la de «Vulnerable» (*Astragalus oxyglottis*, *Callipeltis cucullaris*, *Himantoglossum hircinum*, *Ophrys castellana*); 19 como «Protegidas no catalogadas», y 38 en la categoría de «Vigiladas». Un total de 170 especies presentes en la comarca son endemismos iberolevantinos, lo que representa el 11,13% del total de la flora catalogada. En el territorio existen asimismo lugares de gran valor ambiental y verdaderos santuarios para la flora, entre los que destacan: El Picarcho, Las Hoyuelas y los Lavajos de Sinarcas, la sierra del Negrete en Utiel, los picos Ropé y Bungal en Chera, el pico del Tejo en Requena, el valle del Cabriel, en Villargordo, Venta del Moro y Requena, las diferentes salinas (Villargordo del Cabriel, los Isidros y Jaraguas), y el Molón de Camporrobles, entre otros enclaves. La conservación de las especies vegetales y los ambientes donde viven es fundamental para la salud de los ecosistemas. La preservación de esta biodiversidad está amparada por la protección que ofrecen diferentes figuras de conservación, como son los dos parques naturales que se reparten por el territorio (Parque Natural de Chera-Sot de Chera y el Parque Natural de las Hoces del Cabriel) y las diferentes Microrreservas de Flora.

PALABRAS CLAVE

Comunidad Valenciana, conservación vegetal, corología, endemismo, florística, plantas vasculares, riqueza florística.

ABSTRACT

Checklist of the Vascular Flora of the Requena-Utiel Region (Valencia, Spain). A revised floristic checklist of the vascular plant species present in the Requena-Utiel region (Valencian Community, Spain) is provided. This checklist has been compiled based on field observations made by the authors, as well as data collected on the chorology of this group of plants. The compiled information is either published in scientific works or included in the Valencian Community Data Bank (Banco de Datos de la Comunidad Valenciana). Furthermore, another important source of information has been herbarium specimens, which are records of herbariums conducted throughout history in this region, and which are stored in various herbaria, primarily in the herbarium of the Jardí Botànic de la Universitat de València, or in the collections kept at the Real Jardín Botánico in Madrid or the Institut-Jardí Botànic in Barcelona. The area of the region, approximately 1725 km², represents 7.4% of the total surface area of the Valencian Community (23,255 km²); 1.540 vascular plant species have been recorded in the entire region. With this number, the proportion of the flora present in the Requena-Utiel region represents 43.63% of the total taxa found in the Valencian territory. These values reflect that the region is undoubtedly an area of great floristic richness within the Valencian territory. Some of the most relevant species from a scientific point of view include *Allium cyrilli*, *Anagallis monelli*, *Astragalus oxyglottis*, *Bupleurum tenuissimum*, *Centaurea toletana*, *Ceratocephala falcata*, *Cotoneaster tomentosus*, *Crocus nevadensis*, *Cynomorium coccineum*, *Dactylorhiza fuchsii*, *Damasonium polyspermum*, *Elatine brochonii*, *Eleocharis quinqueflora*, *Frangula alnus*, *Himantoglossum hircinum*, *Isoetes longissima*, *Leucanthemum maestracense*, *Littorella uniflora*, *Lomelosia divaricata*, *Lonicera splendida*, *Lythrum borysthenticum*, *Lythrum thymifolia*, *Marsilea strigosa*, *Narcissus bulbocodium*, *Ornithogalum bourgaea-num*, *Platanthera montana*, *Phyllitis scolopendrium*, *Puccinellia hispanica*, *Rhamnus pumila*, *Sisymbrella aspera*, *Taxus baccata*, *Teucrium pugionifolium*, *Thymus lacaitae*, among many others. A total of 66 species are included in the list of protected flora of the Valencian Community (Order 2/2022, of February 16, by the Ministry of Agriculture, Rural Development, Climate Emergency, and Ecological Transition, updating the Valencian lists of protected flora and fauna species), with the distribution as follows: 5 species in the «Endangered» category (*Elatine brochonii*, *Isoetes longissima*, *Littorella uniflora*, *Marsilea strigosa*, *Myriophyllum alterniflorum*); 4 in the «Vulnerable» category (*Astragalus oxyglottis*, *Callipeltis cucullaris*, *Himantoglossum hircinum*, *Ophrys castellana*); 19 as «Unclassified Protected»; and 38 in the «Monitored» category. A total of 170 species present in the region are Iberian-Levantine endemics, which represents 11.13% of the total cataloged flora. The territory also contains environmentally valuable sites and true plant sanctuaries, including: El Picarcho, Las Hoyuelas, Lavajos in Sinarcas, Sierra del Negrete in Utiel,

Pico Ropé and Pico Bungal in Chera, Pico del Tejo in Requena, Valle del Cabriel in Villargordo, Venta del Moro, and Requena; the different salt ponds (Villargordo del Cabriel, Los Isidros and Jaraguas), and El Molón of Camporrobles, among other sites. The conservation of plant species and the environments in which they live is essential for the health of ecosystems. The preservation of this biodiversity is supported by protection provided by various conservation figures, such as the two natural parks that span the region (Chera-Sot de Chera Natural Park and Hoces del Cabriel Natural Park) and the various Plant Microreserves.

Key-words

Endemism, plant conservation, Valencian Community, chorology, floristics, Vascular plants, floral richness.

INTRODUCCIÓN

El estudio florístico exhaustivo de un territorio es una labor ingente, un verdadero reto para quien se propone afrontarlo. Pero al mismo tiempo, una herramienta de importantísimo valor para conocer un territorio, para su correcta gestión desde el punto de vista ambiental y sobre todo para poder desarrollar una conservación efectiva y real que asegure la permanencia de los hábitats naturales y sus especies a lo largo del tiempo.

En el presente trabajo se expone el estudio que se ha realizado para llegar a conocer las diferentes especies de plantas vasculares presentes en la comarca de Requena-Utiel. Dicho grupo abarca las criptógamas (plantas sin flor) que poseen vasos conductores, como son los pteridófitos (helechos, colas de caballo y plantas afines); así como las fanerógamas, aquellas que poseen órganos reproductores visibles (árboles, arbustos y hierbas), también llamadas espermatófitas por tener semillas. Por tanto, no se tratan en este trabajo las plantas criptógamas no vasculares: briófitos (musgos y hepáticas), algas continentales, líquenes u hongos liquenizados.

La investigación científica de las plantas presentes en la comarca ya ha sido abordada en otros momentos pasados por diferentes botánicos. Es necesario destacar la tesis doctoral del Dr. Emilio García Navarro (García, 2003), específicamente dedicada a glosar la diversidad de las plantas de la comarca. Este trabajo mencionado, así como otros anteriores realizados y publicados por otros autores para zonas limítrofes de la comarca (Mateo, 1982; Figuerola, 1983; Peris, 1983; Sanchis, 1987; Laguna, 1997; Gómez Navarro, 2011; Ferrer-Gallego, 2014), son sin duda la base de nuestro estudio, construido a la luz de la relevante obra que representan las diferentes ediciones de las *Claves Ilustradas para la Flora Valenciana* (Mateo y Crespo, 2014) y *Flora Valentina* (Mateo *et al.*, 2011-2024), y que viene a actualizar los datos referentes a las especies de plantas según los cambios y modificaciones que experimenta la ciencia Botánica a lo largo del tiempo como resultado de los avances

y nuevos conocimientos en corología, taxonomía, nomenclatura, etc.

La comarca de Requena-Utiel, también conocida como Meseta de Requena-Utiel, ocupa una amplia banda central en el occidente de la provincia de Valencia; un altiplano hundido orográficamente hablando que linda con la Manchuela conquense y albaceteña, y que por ello es, de entre todas las comarcas levantinas, la que tiene un carácter más marcadamente manchego. Es la comarca con mayor superficie de toda la Comunidad Valenciana (1.725,92 km²) (Tabla 1), y también una de las de menor densidad poblacional, con 22 habitantes por kilómetro cuadrado.

Dicha comarca se caracteriza, ante todo, por una amplia dominancia de la agricultura, tanto en el paisaje como en su economía, destacando muy especialmente el aprovechamiento vitivinícola. Desde el punto de vista geográfico, consta de tres unidades paisajísticas claramente reconocibles (véase Piqueras, 1990, 2018):

- 1) La meseta central, que ocupa el centro de la demarcación, con suelos originados por materiales sedimentarios de épocas terciaria y cuaternaria, aprovechados por la agricultura en su mayor parte. Se extiende desde el corredor de El Reboollar al este, hasta las llanuras de Villargordo del Cabriel, Camporrobles y Sinarcas al oeste, noroeste y norte, respectivamente.
- 2) El sistema de alineaciones montañosas, dispuestas en dirección noroeste-sureste y que recorren el norte de la comarca. Cabe destacar las sierras de Mira y Tala-yuelas, que al entrar en Sinarcas alcanzan una altura en El Picarcho de 1.301 metros sobre el nivel del mar; la sierra del Negrete, con alturas que superan los 1.200 m en varios puntos e incluso los 1.300 m en el pico del Remedio (1.310 m) y en el pico del Águila (1.304 m); y la sierra del Tejo que llega a los 1.250 m; o el pico de Cinco Pinos, con 1.177 m, que supone la cumbre más alta de un magnífico cordal que pasa por el pico de la Nieve y acaba en Ropé, ambos pertenecientes al término municipal de Chera, con 1.111 m y 1.140 m, respectivamente. También, el Bural (1.119 m), que por su parte y aún en la jurisdicción de Chera, tiene continuación en un conjunto de interesantes sierras que siguiendo la misma dirección se adentran en las inmediaciones de Chiva y Gestalgar.
- 3) La tercera unidad geográfica que conforma el territorio comarcal es el extenso valle que el río Cabriel origina desde su entrada a la provincia de Valencia hasta que sus aguas confluyen con el Júcar, ya en la comarca vecina del Valle de Ayora-Cofrentes. Alrededor de 100 kilómetros de curso fluvial que conlleva una notable interrupción entre mesetas, y en concreto entre la Manchuela conquense y albacetense, y el altiplano comarcal. Se trata de un profundo socavón de unos 300-400 metros de desnivel con respecto a las planicies agrarias que, por la pobre naturaleza de un suelo esencialmente margoso y su acusada inclinación, origina unas características laderas de materiales sueltos o derrubios que dan nombre a las vertientes: Las Derrubiadas. En ellas no son raros los afloramientos de suelo de edad triásica ricos en arcillas, sales y yesos, lo que condiciona el tipo de vegetación que allí crece.

Tabla 1. Padrón municipal a 1 de enero de 2023 y superficie de los municipios de la comarca Requena-Utiel (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). Se expresa en % la proporción que aporta cada municipio al total comarcal.

Municipio	Población	Porcentaje	Superficie (km²)	Porcentaje	Densidad
Requena	20.387	53,8	814,2	47,2	25,0
Utiel	11.632	30,7	236,9	13,7	49,1
Camporrobles	1.189	3,1	89,5	5,2	13,3
Venta del Moro	1.164	3,1	272,6	15,8	4,3
Sinarcas	1.113	2,9	102,5	5,9	10,9
Caudete de las Fuentes	693	1,8	34,6	2,0	20,0
Fuenterrobles	688	1,8	49,5	2,9	13,9
Villargordo del Cabriel	577	1,5	54,5	3,2	10,6
Chera	483	1,3	71,6	4,1	6,7
Total	37.926	100	1.725,9	100	22,0

La superficie forestal, ocupada tanto por arbolado como matorral, se extiende por 908,2 km² según el Mapa Forestal de España de 2006; un 52,8% de la superficie total de la comarca. De ellos, los montes cubiertos por el pino carrasco *Pinus halepensis* constituyen la mayoría, con un total de 660 km², muy por delante de otros tipos de pinares como los de rodeno o *Pinus pinaster* con 10 km² o los de *Pinus nigra* con 3,6 km². Los carrascales de *Quercus ilex*, por su parte, suponen unos 16 km². El resto lo constituyen otras formaciones arbóreas, como los sotos riparios, y sobre todo las formaciones de matorral no arboladas.

Las rocas más antiguas de la comarca datan del período Triásico, de la facies Buntsandstein, y se encuentran en El Picarcho de Sinarcas; se trata de areniscas rojas (rodenos), que forman suelos silíceos arenosos poco frecuentes en la comarca. Pertenecientes al tramo Muschelkalk aparecen calizas y dolomías, rocas calcáreas que se formaron en un mar somero. Estos afloramientos pueden encontrarse en el valle del Cabriel, en las cercanías de Requena (Cerro del Telégrafo) y también en Sinarcas. Por último, los materiales del Keuper son los que presentan mayor extensión entre los del Triásico, apareciendo asociados tanto a las zonas anteriores como en Villargordo del Cabriel, Los Isidros, ciertas zonas del valle del Cabriel y Jaraaguas. En estos terrenos predominan arcillas y yesos originados por evaporación en un ambiente continental hipersalino. Los periodos Jurásico y Cretácico aparecen en las principales formaciones montañosas; se trata de rocas carbonatadas, principalmente de origen marino de plataforma continental (calizas, margas y dolomías). El Cuaternario se manifiesta como depósitos continentales de reducido espesor, asociados a los cursos de agua que discurren sobre la cubeta. Los últimos estratos, tanto del Neógeno (del periodo Terciario) como del Cuaternario, apenas se ven afectados por esfuerzos tectónicos, por lo que aparecen dispuestos fundamentalmente de forma horizontal (Yeves, 2000).

El clima de la comarca de Requena-Utiel es característicamente de tipo medi-

terráneo continental. Sin embargo, cabe decir que debido a la gran extensión de su superficie y a las diferencias notorias entre las altitudes hay una cierta variabilidad que se aprecia tanto en las temperaturas como en el régimen de precipitaciones. Igualmente, los valles de los ríos, como el del Cabriel, prolongan puntualmente dentro de la comarca condiciones de termicidad y atemperamiento térmico. Tomando como referencia los valores climatológicos de la capital comarcal, Requena (situada a 700 metros de altitud sobre el nivel del mar y a unos 60 kilómetros de la costa mediterránea), las temperaturas medias de los meses más cálidos (julio y agosto) y de los meses más fríos (enero y diciembre) son de 24°C y 5°C, respectivamente. Sin embargo, se alcanzan frecuentemente valores mucho más extremos en esos periodos, que pueden llegar incluso a -10°C en alguna temporada invernal y superar los 40°C en otras estivales. El régimen de precipitaciones en la comarca puede considerarse escaso, del orden de 450 mm anuales como dato promedio, y suele tener dos máximos de lluvias sobre todo en primavera y otoño.

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer el listado florístico revisado (*checklist*) de las especies vegetales pertenecientes a la flora vascular presentes en la comarca Requena-Utiel.

MATERIAL Y MÉTODOS

El listado florístico o *checklist* ha sido elaborado considerando la flora recolectada en el campo, así como las observaciones realizadas por los autores de este trabajo a lo largo de los años. Además de estas fuentes, se han consultado las referencias bibliográficas, que hemos podido localizar en la literatura botánica, que hacen referencia a plantas que se hallan en la zona. Por otro lado, el Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana ha sido una fuente importante de información que también ha sido consultada y analizada. Por último, los pliegos de herbario conservados en diferentes colecciones, sobre todo del Jardí Botànic de la Universitat de València, del Real Jardín Botánico de Madrid y del Institut-Jardí Botànic de Barcelona, han constituido una herramienta de gran utilidad para conocer la presencia de especies en la zona, así como para la identificación y reconocimiento de algunos grupos complejos desde el punto de vista taxonómico.

La información que aparece en el listado o *checklist*, en parte está basada en lo publicado por Mateo y Crespo (2014):

- Nombre científico de la planta.
- Autor/es que describieron la planta.
- Referencia bibliográfica; obra donde se publicó el nombre de la planta.
- Nombre de la planta según POWO (Plants of the World Online)
- Distribución general de la especie (corología); territorio biogeográfico donde aparece distribuida la planta.
- Biotipo o forma etológica de la planta.

- Periodo de floración o esporulación; meses del año en los que se puede observar floración.
- Tamaño; altura que puede llegar a alcanzar la planta.
- Abundancia; valor de abundancia/rareza de la planta para todo el territorio de la Comunidad Valenciana, y también para la comarca. Los valores empleados son los siguientes: CC (muy común), C (común), M (abundancia media), R (rara), RR (muy rara).
- El grado de protección de la especie según la legislación valenciana de conservación de flora; Orden 2/2022, de 16 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se actualizan los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna. Estas especies se han indicado en la tabla donde aparece el listado de especies o checklist de la siguiente manera: «EPE» (especies en peligro de extinción); «VU» (vulnerables); «PNC» (protegida no catalogada); «VI» (vigilada).
- Especies alóctonas, indicando además si la especie es o fue cultivada y se ha naturalizado en el territorio. Estas especies se han indicado en la tabla donde aparece el listado de especies o checklist con la letra «A» (alóctona) y «A (Cult.-Nat.)» (alóctona, cultivada y naturalizada).

Con el objetivo de homogeneizar la nomenclatura que viene empleándose en los estudios florísticos valencianos, para los nombres científicos se ha seguido lo publicado por Mateo y Crespo (2014), que es la base de los nombres empleados en la *Flora Valentina* (Mateo et al., 2011-2024). Sin embargo, dado que la taxonomía y la nomenclatura experimentan cambios constantes, se incluye además el nombre que según la relevante base de datos mundial *Plants of the World Online* es el vigente para cada taxon.

El valor de abundancia de la planta en la comarca se basa en las observaciones de los autores y en los datos extraídos de las diferentes fuentes consultadas.

Para la evaluación de la riqueza florística de la comarca de Requena-Utiel se han comparado los registros obtenidos con los de otras regiones próximas para las que se conocen datos exhaustivos relacionados con su flora vascular. Para conocer la relación de las referencias bibliográficas empleadas para el análisis de riqueza florística véase la tabla incluida en el apartado de resultados; esta bibliografía aparece relacionada en el trabajo de Ferrer-Gallego (2014). La riqueza de la comarca de Requena-Utiel ha sido analizada a través de la comparación y la representación del logaritmo de la superficie (en abscisas) y del número de táxones (en ordenadas). En la gráfica resultante se ajusta una recta a la nube de puntos obtenida que permite la comparación entre estas regiones, al tiempo que nos indica de manera gráfica aquellas áreas con elevada riqueza.

RESULTADOS

Listado revisado de la flora vascular de la comarca de Requena-Utiel

El listado (o *checklist*) de los táxones presentes en la comarca de Requena-Utiel se presenta en la tabla 2.

Análisis de la flora vascular de la comarca de Requena-Utiel

En la última edición del catálogo valenciano de flora vascular (Mateo y Crespo, 2014) el número de táxones asciende a 3.529. Con este valor, el porcentaje de la flora presente en la comarca de Requena-Utiel, con un total de 1.540 táxones, representa el 43,63% del total de los presentes en el territorio valenciano. Es importante remarcar que la superficie de la comarca, con aproximadamente 1.722 km², representa el 7,4% del total de la superficie de la Comunidad Valenciana (con 23.255 km²), lo que significa que esta comarca es sin duda un área de gran riqueza florística dentro del territorio valenciano.

En parte, una explicación plausible de esta gran riqueza florística puede estar en la diversidad geológica y la compleja orografía del terreno, con una gran variedad de accidentes geográficos de naturaleza muy diversa, lo que sin duda favorece la diversidad de hábitats. Un segundo factor a tener en cuenta es su posición geográfica como encrucijada o zona de convergencia de los principales sectores corológicos (zonas de influencia o personalidad florística propia) de la provincia de Valencia. Aunque se encuentra fundamentalmente en el sector Manchego, de óptimo continental, recibe por el N la influencia del Maestracense, por el NW la del Valenciano-Tarraconense, y por el E y SE la del sector Setabense; cada uno de estos sectores aporta a la comarca la presencia de especies endémicas propias. Asimismo, la larga historia de influencia humana sobre un territorio es un factor que favorece la riqueza florística, no sólo por la introducción de especies, sino también por la diversificación de hábitats, especialmente incentivados por las actividades agrícolas.

Por otro lado, la riqueza florística de una determinada área geográfica depende en gran parte del grado de exploración del territorio y de los criterios de determinación, analíticos o sintéticos, que utilizan los diferentes autores en la identificación de las especies. Sin embargo, aparte de los criterios exclusivamente taxonómicos adoptados en la catalogación de la flora, existen otros que afectan a la cifra definitiva de elementos presentes en un territorio, como por ejemplo el carácter alóctono y naturalizado de algunos de ellos. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con los híbridos. La inclusión o no de estos táxones se traduce en diferencias significativas en la riqueza florística total de un territorio. Además, la elección del área objeto de estudio juega también un papel importante en esta valoración, ya que muchos trabajos fijan sus límites según demarcaciones administrativas o fronteras geopolíticas que no se corresponden con las unidades biogeográficas o ecológicas y, en consecuencia, carecen de significación corológica, lo que afecta sobre todo a los estudios de

diversidad o relación táxones/superficie, posteriores a los de riqueza. Asimismo, la riqueza de especies de un determinado lugar, es un índice que está claramente sujeto a la intensidad de muestreo, de modo que dicha riqueza aumentará a medida que lo haga el área muestreada o el número de muestras tomadas. En este sentido, parece demostrado que existe una relación más o menos lineal entre el número de táxones de un área y el logaritmo de la misma. Este aspecto afecta muy especialmente a la flora urbana y la de zonas agrícolas, ya que, al presentar menor atractivo naturalístico, suelen estar menos prospectadas.

Como ya se ha indicado, la evaluación de la riqueza florística de la comarca se ha realizado comparando con resultados en otras regiones próximas para las que se conocen datos exhaustivos relacionados con su flora vascular. Además, para controlar factores de tipo histórico-biogeográficos, la comparación debe de ser con sectores de historia evolutiva de origen común. Así, la representación del logaritmo de la superficie (en abscisas) y del número de táxones (en ordenadas) registrados en los estudios florísticos realizados en determinadas regiones valencianas y territorios limítrofes y el ajuste de una recta a la nube de puntos obtenida nos permite la comparación entre estas regiones, al tiempo que nos indica de manera muy gráfica, aquellas áreas con elevada riqueza, situadas en la parte superior de la recta, y las de una baja riqueza de táxones, puntos situados en la zona inferior de la recta (Tabla 3, Figura 1). Los diferentes territorios que se han considerado en este análisis presentan superficies muy diferentes y solo una proyección de la relación área-táxones sobre una escala logarítmica (ley de Arrhenius) permite la comparación de manera satisfactoria (Arrhenius, 1921). Tras dicha proyección se ha realizado el cálculo de la recta de regresión y del coeficiente de determinación (r^2) (Zar, 1996).




Figura 1. Comparación, en modo logarítmico, de la riqueza florística o α fitobiodiversidad, medida en número de táxones en función de la superficie en km² de 41 territorios considerados de la Comunidad Valenciana y territorios limítrofes, en los que se han realizado exhaustivos estudios florísticos. El punto de color blanco corresponde con los valores para la comarca de Requena-Utiel.

La pendiente de la recta, con un valor de 0,22 (Figura 1), se encuentra entre los valores comunes de la relación de Arrhenius (1921), situados entre 0,15 y 0,4, y cercano al valor 0,26 que establecen Muers y Giller (1988). La linealidad de la relación es muy elevada $r^2 = 0,8253$ (Figura 1). La flora de la comarca de Requena Utiel se sitúa ligeramente sobre la recta de regresión y su exclusión del análisis no modifica el valor de r^2 . Así, este territorio muestra una riqueza florística equivalente o ligeramente superior a otros territorios de la Comunidad Valenciana y también a zonas limítrofes. Estos resultados son comparables con los obtenidos para otras áreas del Mediterráneo muy ricas desde el punto de vista florístico (Médail y Vidal, 1998 [$y = 0,5x + 0,7$ y $r^2 = 0,6$]; Fraga *et al.*, 2004 [$r^2 = 0,8299$]; Jeanmonod *et al.*, 2011 [$y = 0,27x + 2,26$ y $r^2 = 0,6968$]).

Tabla 3. Riqueza florística comparada entre determinadas regiones de la Comunidad Valenciana y territorios limítrofes. I.R.F.; Índice de Riqueza Florística; táxones/50 km². Densidad; táxones/km². Para las referencias de los estudios florísticos, véase Ferrer-Gallego (2014).

Territorio estudiado	Estudios florísticos	Táxones	km ²	IRF	Densidad
Comunidad Valenciana	Mateo & Crespo (2014)	3.529	23.255	70,58	0,15
Provincia de Valencia	Mateo & Crespo (2014)	2.788	10.763	55,76	0,26
Provincia de Alicante	Mateo & Crespo (2014)	2.408	5.816	48,16	0,41
Provincia de Castellón	Mateo & Crespo (2014)	2.543	6.632	50,86	0,38
Islas Baleares	Rita & Payeras (2006)	1.569	4.986,70	31,38	0,31
ZEC Muela de Cortes y El Caroché	Ferrer-Gallego (2014)	1.526	615,19	30,52	2,48
Requena-Utiel	Ferrer-Gallego <i>et al.</i> (presente estudio)	1.540	1.725,92	30,80	0,89
Baix Maestrat	Villaescusa (2000)	1.492	1.225,50	29,84	1,22
Marina Alta	Pérez (1997)	1.470	736	29,40	2,00
Plana de Utiel-Requena	García (2003)	1.383	1.620,60	27,66	0,85
Isla de Mallorca	Rita & Payeras (2006)	1.348	3.620,40	26,96	0,37
Marina Baixa	Solanas & Crespo (2001)	1.304	589,49	26,08	2,21
Serra Calderona	Crespo (1989)	1.280	1000	25,6	1,28
Extremo NE de Albacete y zonas adyacentes de la provincia de Valencia	Gómez (2009)	1.279	850	25,58	1,50
Sierra del Toro y las Navas de Torrijas	Aguilella (1985)	1.274	850	25,48	1,50
Alto Mijares	Roselló (1994)	1.248	647	24,96	1,93
Plana Alta	Tirado (1998)	1.229	928,3	24,58	1,32
Els Ports i La Tinença de Benifassà	Aguilella (1991)	1.219	904	24,38	1,35
Sierras de Boquerón y Palomera	Peris (1983)	1.200	590	24,00	2,03
Alto Maestrazgo	Fabregat (1995)	1.178	682	23,56	1,73
Palomita y el Bovalar de Vilafranca	Pitarch (1994)	1.163	500	23,26	2,33
Rincón de Ademuz	Mateo (1997)	1.142	370	22,84	3,09
Parque Natural de la Sierra de Mariola	Serra <i>et al.</i> (2012)	1.099	169,26	21,98	6,49

Isla de Menorca	Rita & Payeras (2006)	1.072	694,4	21,44	1,54
La Safor	Soriano (1995)	1.070	428	21,40	2,50
Sierra Santa María	Sanchis (1986)	1.044	400	20,88	2,61
Cortes de Pallás	Ferrer-Gallego (2017)	1.006	233	20,12	4,32
Sierra de Corbera	Borja (1950)	991	48,2	19,82	20,56
Font de la Figuera y terrenos colindantes	Cuchillo & Gimeno (2005)	982	84,3	19,64	11,65
Parque Natural de Font Roja	Serra & Soler (2011)	922	63	18,44	14,63
Sierras de Martés y Ave	Figuerola (1983)	883	600	17,66	1,47
Isla de Ibiza	Rita & Payeras (2006)	879	571	17,58	1,54
Sierra del Reclot y Cerro de la Sal	Navarro (1999)	698	80	13,96	8,73
Valle de Villena	Alonso (1996)	697	94	13,94	7,41
Sierra de Crevillente	Vicedo (1997)	617	100	12,34	6,17
Sierra del Cid	Juan (1995)	613	51	12,26	12,02
Umbria del Fresnal	Laguna (1997)	583	2,04	11,66	285,78
Isla de Formentera	Rita & Payeras (2006)	577	82	11,54	7,04
Vall dels Alcalans	Fos & Codoñer (2011)	551	95,31	11,02	5,78
Isla de Cabrera	Rita & Payeras (2006)	469	15,7	9,38	29,87
Isla de Dragonera	Rita & Payeras (2006)	328	2,7	6,56	121,48

Por último, destacar de entre todas las plantas incluidas en la *checklist* algunas especies sobresalientes para la flora de la comarca y en general para la flora valenciana, por su relevancia desde el punto de vista corológico, taxonómico, ecológico y sobre todo conservacionista. En las más destacadas resaltamos las siguientes: *Allium cyrilli*, *Anagallis monelli*, *Armeria filicaulis*, *Astragalus oxyglottis*, *Baldellia ranunculoides*, *Buglossoides incrassata*, *Bunium balearicum*, *Bupleurum tenuissimum*, *Callipeltis cucullaria*, *Campanula fastigiata*, *Centaurea toletana*, *Ceratocephala falcata*, *Chaenorhinum exile*, *Chaenorhinum reyesii*, *Chamaeiris foetidissima*, *Cotoneaster tomentosus*, *Cleonia lusitanica*, *Crocus nevadensis*, *Crypsis schoenoides*, *Cynomorium coccineum*, *Dactylorhiza fuchsii*, *Damasonium polyspermum*, *Elatine brochonii*, *Eleocharis quinqueflora*, *Erica cinerea*, *Frangula alnus*, *Gypsophila pilosa*, *Himantoglossum hircinum*, *Himantoglossum robertianum*, *Isoetes longissima*, *Jurinea pinnata*, *Linaria depauperata* subsp. *hegelmaieri*, *Listera ovata*, *Littorella uniflora*, *Lomelosia divaricata*, *Lonicera splendida*, *Lonicera xylosteum*, *Lythrum borysthenticum*, *Lythrum thymifolia*, *Marsilea strigosa*, *Mentha cervina*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Myriophyllum verticillatum*, *Narcissus bulbocodium*, *Ononis laxiflora*, *Ophrys ×brigittae*, *Ophrys ×turiana*, *Ophrys castellana*, *Orchis tenera*, *Ornithogalum bourgaeum*, *Phyllitis scolopendrium*, *Pimpinella tragioides* subsp. *lithophila*, *Pinus ×saurotae* nothosubsp. *curraeii*, *Puccinellia hispanica*, *Platanthera montana*, *Potentilla supina*, *Prunus prostrata*, *Rhamnus pumila*, *Silene oropediorum*, *Silene portensis*, *Sisymbrella aspera*, *Sisymbrium austriacum* subsp. *contortum*, *Sorbus aria*, *Sorbus torminalis*, *Stipa barbata*, *Taxus baccata*, *Teu-*

crium pugionifolium, *Thlaspi stenopterum*, *Thymelaea pubescens*, *Thymus lacaitae*, *Thymus leptophyllus* y *Veronica triphyllus*.

Un total de 170 especies presentes en la comarca son endemismos iberolevantineos, lo que representa el 11,03% del total de la flora catalogada. Por otro parte, un total de 66 especies figuran dentro del listado de flora protegida de la Comunidad Valenciana (Orden 2/2022, de 16 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se actualizan los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna), siendo el reparto el siguiente: 5 especies dentro de la categoría de «En peligro de extinción» (*Elatine brochonii*, *Isoetes longissima*, *Littorella uniflora*, *Marsilea strigosa* y *Myriophyllum alterniflorum*); 4 en la de «Vulnerable» (*Astragalus oxyglottis*, *Callipeltis cucullaris*, *Himantoglossum hircinum* y *Ophrys castellana*); 19 como «Protegidas no catalogadas» (*Baldellia ranunculoides*, *Barlia robertiana*, *Bupleurum tenuissimum*, *Centaurea toletana*, *Chamaeiris foetidissima*, *Chamaeiris reichenbachiana*, *Crypsis schoenoides*, *Damasonium polyspermum*, *Halimium umbellatum* subsp. *viscosum*, *Listera ovata*, *Lythrum borysthenicum*, *Mentha cervina*, *Narcissus bulbocodium*, *Ophrys incubacea*, *Orobanche schultzei*, *Phyllitis scolopendrium*, *Puccinellia hispanica*, *Stipa barbata* y *Thymus lacaitae*), y 38 en la categoría de «Vigiladas» (*Aceras anthropophorum*, *Anagallis monelli*, *Anagallis tenella*, *Armeria filicaulis*, *Asplenium foreziense*, *Asplenium septentrionale*, *Aster willkommii*, *Campanula fastigiata*, *Crocus nevadensis*, *Cynomorium coccineum*, *Cytisus fontanesii*, *Dactylorhiza fuchsii*, *Erica cinerea*, *Fumaria pugsleyana*, *Gymnadenia conopsea*, *Helianthemum angustatum*, *Jasione sessiliflora* subsp. *sessiliflora*, *Juncus pygmaeus*, *Linaria depauperata* subsp. *hegelmaieri*, *Linaria oligantha* subsp. *valentina*, *Lonicera pyrenaica*, *Lonicera splendida*, *Lythrum tribracteatum*, *Malva aegyptia*, *Ophrys sphegodes*, *Orchis langei*, *Orobanche portollicitana*, *Orobanche rosmarina*, *Pistorinia hispanica*, *Potamogeton coloratus*, *Potentilla supina*, *Quercus pyrenaica*, *Saxifraga carpetana*, *Sorbus torminalis*, *Taxus baccata*, *Teesdalia coronopifolia*, *Teucrium pugionifolium* y *Zannichellia peltata*).


En el territorio existen asimismo lugares de gran valor ambiental y verdaderos santuarios para la flora, entre los que destacan El Molón de Camporrobles, el Picarcho, Las Hoyuelas y los lavajos de Sinarcas, la sierra del Negrete en Utiel, el pico Ropé y la Fuente de la Puerca en Chera, el pico del Tejo en Requena, el valle del Cabriel y las salinas de Villargordo del Cabriel, los Isidros y Jaraguas, entre otros enclaves. La conservación de las especies vegetales y los ambientes donde viven es fundamental para la salud de los ecosistemas. La preservación de esta biodiversidad está amparada por la protección que ofrecen diferentes figuras de conservación, como son los dos parques naturales que se reparten por el territorio (Parque Natural de Chera-Sot de Chera y el Parque Natural de las Hoces del Cabriel) y las diferentes Microrreservas de Flora.

BIBLIOGRAFÍA

- Arrhenius, O. 1921. Species and area. *Journal of Ecology* 9: 95-99.
- Ferrer-Gallego, P.P. 2014. *Estudio crítico de la flora vascular del Lugar de Interés Comunitario Mucla de Cortes y Caroche (Valencia). Bases para su gestión y conservación*. Tesis Doctoral inédita. Universitat de València, Valencia.
- Figuerola, R. 1983. *Estudio de la vegetación y flora de las sierras Martés y Ave (Valencia)*. Tesis Doctoral inédita. Universitat de València, Valencia.
- Fraga, P., Mascaró, C., Carreras, D., García, Ò., Pallicer, X., Pons, M., Seoane, M. y Truyol, M. 2004. *Catàleg de la flora vascular de Menorca*. Institut Menorquí d'Estudis, Menorca.
- García, E. 2003. *Plantas de la Plana de Utiel*. Gómez Coll, Burjassot.
- Gómez Navarro, J. 2011. *Aportaciones al estudio de la flora y la vegetación del extremo NE de la provincia de Albacete y zonas adyacentes de la provincia de Valencia*. Serie 1, Estudios, vol. Nº 199. Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. Albacete.
- Jeanmonod, D., Schlüssel, A. y Gamisans, J. 2011. Analyse de la flore Corse : aspects biologiques. *Candollea* 66: 5-25.
- Laguna, E. 1997. *Vegetación y flora de la Umbria del Fresnal (Sierra de Malacara, Hoya de Buñol-Chiva)*. Instituto de Estudios Comarcales Hoya de Buñol-Chiva. Buñol.
- Mateo, G. 1982. *Estudio sobre la flora y vegetación de las sierras de Mira y Talayuelas*. Col. Monografías, nº 31. ICONA, Madrid.
- Mateo, G. y Crespo, M.B. 2014. *Claves Ilustradas para la Flora Valenciana*. Monografías de Flora Montiberica, nº 6. Jolube, Jaca.
- Mateo, G., Crespo, M.B. y Laguna, E. 2011-2024. *Flora Valentina*. Vols. I-V. Fundación de la Comunitat Valenciana para el Medio Ambiente (Vols. I-III) y JOLUBE (vols. IV y V), Valencia y Jaca.
- Médail, F. Y Vidal, E. 1998. Organisation de la richesse et de la composition floristique d'îles de la Méditerranée occidentale (sud-est de la France). *Canadian Journal of Botany* 76: 321-331.
- Myers, A.A. y Giller, P.S. (eds.) 1988. *Analytical biogeography: An integrated approach to the study of animal and plant distributions*. Chapman y Hall, New York.
- Peris, J.B. 1983. *Contribución al estudio florístico y fitosociológico de las sierras del Boquerón y Palomera*. Tesis Doctoral inédita. Universitat de València, Valencia.
- Piqueras, J. 1990. *Geografía de Requena-Utiel*. Fundación Centro de Estudios Requenses, Requena.
- Piqueras, J. 2018. *Atlas de la Meseta de Requena-Utiel*. Fundación Lucio Gil de Fagoaga, Requena.
- Sanchis, E. 1987. *Estudio de la flora e introducción al conocimiento de la vegetación de la sierra de Santa María y otras sierras colindantes*. Tesis Doctoral inédita. Universitat de València, Valencia.

Yeves, A. 2000. *Aspectos Geológicos de la Comarca Requena-Utiel*. Centro de Estudios Requenenses, Requena.


Zar, J.H. 1996. *Biostatistical analysis*. Prentice Hall, New Jersey.



a) *Marsilea strigosa* Willd; b) *Isoetes longissima* Bory.



c) *Pinus halepensis* var *minor* Lange; d) *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman.



e) *Lythrum thymifolia* L.; f) *Centaurea toletana* Boiss. & Reut; g) *Pinus x saportae nothsubsp. currasii* P.P. Ferrer, E. Laguna, R. Roselló & J.B. Peris; h) *Taxus baccata* L.



j) *Littorella uniflora* (L.) Asch. Foto. José Quiles; j) Pliego de Coincy *Aethionema saxatilis* (L.) W. T. Aiton; k) *Bupleurum tenuissimum* L.; l) *Marrubium xbastetanum* Coincy.



l) *Dianthus edetanus* (M.B. Crespo & Mateo) M.B. Crespo & Mateo; m) pliego de herbario recolectado por Carlos Pau en Villargordo del Cabriel, con un espécimen de *Centaurea saetabensis* Coincy; n) espécimen holotipo de *Sideritis xmurica nothosubsp. mediovalentina* M.B. Crespo & E. Laguna; ñ) espécimen holotipo de *Teucrium xjaragueense* P.P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & J.B. Peris.



o) espécimen isotipo de *Thymus x josephi-angeli* nothosubsp. edetanus Mateo, M.B. Crespo & E. Laguna;
p) *Thymus zygis* subsp. *gracilis* (Boiss.) R. Morales; q) *Thymus lacaitae* Pau; r) *Puccinellia hispanica* M. A. Juliá & J. M. Monts.



s) *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng; t) *Xiphion vulgare* Mill; u) *Allium cyrilli* Ten; v) *Prunus prostrata* Labill.

Tabla 2. LISTADO REVISADO DE LA FLORA VASCULAR DE LA COMARCA DE REQUENA-UTIEL.								
TAXON	NOMBRE ACEPTADO EN POWO	COROLOGÍA	BIOTIPO	FENOLOGÍA	ALTURA	ABUNDANCIA COMARCA	ABUNDANCIA C.VALENCIANA	PROTEGIDA / CULTIVADA
× <i>Agropogon lutosus</i> (Poir.) P. Fourn., Monde Pl. 36(213): 20. 1935		Subcosmopolita	Teróf.-esc.	VII-X	2-8 dm	RR	RR	
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik., Malv- enfam.: 28. 1787		Paleotemplada	Teróf.-esc.	VII-IX	5-10 dm	R	R	A
<i>Acer campestre</i> L., Sp. Pl.: 1055. 1753		Eurosiberiana	Macrofan.	IV-V	2-18 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Acer monspessulanum</i> L., Sp. Pl.: 1056. 1753		Mediterránea N	Mesofan.	IV-V	2-10 m	RR	R	
<i>Acer negundo</i> L., Sp. Pl.: 1056. 1753		Norteamericana	Macrofan.	III-V	2-20 m	M	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Acer opalus</i> subsp. <i>granatense</i> (Boiss.) Font Quer & Rothm., Sched. Fl. Iber. Select. Cent. 1: 56. 1934	<i>Acer granatense</i> Boiss., Elench. Pl. Nov.: 25. 1838	Mediterránea W	(Meso-) Macrofan.	IV-V	2-15 m	R	M	
<i>Acer platanoides</i> L., Sp. Pl.: 1055. 1753		Eurosiberiana	Macrofan.	IV-V	2-20 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., Sp. Pl.: 1054. 1753		Eurosiberiana	Macrofan.	IV-V	3-15 m	R	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) R. Br. in Aiton, Epit. Hortus Kew.: 281. 1814	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., Fl. Pedem. 2: 148. 1785	Circunmediterránea	Geóf.-tub.	III-VI	1-4 dm	R	R	VI
<i>Achillea ageratum</i> L., Sp. Pl.: 897. 1753		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-X	1-4 dm	M	M	
<i>Achillea millefolium</i> L., Sp. Pl.: 899. 1753		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	VI-IX	3-7 dm	RR	RR	

<i>Achillea odorata</i> L., Syst. Nat., ed. 10: 1225. 1759	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-VII	5-25 cm	M	M	
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., Sp. Pl.: 1096. 1753	Subcosmopolita	Geóf.-riz.	I-XII	1-4 dm	C	C	
<i>Adonis aestivalis</i> L., Sp. Pl., ed. 2, 2: 771. 1762	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	1-5 dm	M	R	
<i>Adonis annua</i> L., Sp. Pl.: 547. 1753	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	M	R	
<i>Adonis flammea</i> Jacq., Fl. Austriac. 4: 29. 1776	Euroiberiana S	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Adonis vernalis</i> L., Sp. Pl.: 547. 1753	Euroiberiana S	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	RR	R	
<i>Aegilops geniculata</i> Roth in Bot. Abh.: 45. 1787	<i>Aegilops kotschy</i> Boiss., Diagn. Pl. Orient. 7: 129. 1846	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	CC	CC	
<i>Aegilops neglecta</i> Bertol., Fl. Ital. 1: 787. 1833	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	IV-VI	5-40 cm	RR	RR	
<i>Aegilops triuncialis</i> L., Sp. Pl.: 1051. 1753	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) W. T. Aiton in Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 4: 80. 1812	Mediterránea N	Caméf.-sulf.	IV-VI	1-3 dm	RR	R	
<i>Agave americana</i> L., Sp. Pl.: 323. 1753	Neotropical	Hemic.-ros.	VI-VIII	3-6 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., Sp. Pl.: 448. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	V-IX	2-7 dm	M	M	
<i>Agrostemma githago</i> L., Sp. Pl.: 435. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-VII	3-8 dm	M	R	
<i>Agrostis castellana</i> Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26. 1842	Circunmediterránea	Geóf.-riz.	V-VII	2-8 dm	M	M	
<i>Agrostis nebulosa</i> Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26. 1842	Mediterránea W	Teróf.-esc.	VI-VII	5-30 cm	R	R	

<i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>scabrada</i> (Maire & Trab.) Maire, Fl. Afrique N. 2: 124. 1953	<i>Agrostis stolonifera</i> L., Sp. Pl.: 62. 1753	Holártica	Geóf.-riz.	V-VII	1-6 dm	M	M	
<i>Agrostis tenerrima</i> Trin., Gram. Uni- fl. Sesquifl.: 205. 1824		Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-IV	5-20cm	R	M	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle in J. Wash. Acad. Sci. 6: 495. 1916		Chino-japonesa	(Meso-) Mac- rofan.	V-VI	1-20 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Aira cupaniana</i> Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148. 1843		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	RR	M	
<i>Aira hircynica</i> Romero Zarco, M.Á. Ortiz & L. Sáez, Syst. Bot. 45: 81. 2020		Iberolevantina	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	RR	R	
<i>Aira multicalmis</i> Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 121. 1824		Mediterránea W-Eurosiberiana S	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	RR	R	
<i>Aizoon hispanicum</i> L., Sp. Pl.: 488. 1753	<i>Alzanthemopsis his- panica</i> (L.) Klak, Tax- on 66: 1165. 2017	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-30 cm	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 24. 1774		Mediterránea SW	Teróf.-esc.	II-V	3-20 cm	RR	R	
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 25. 1774		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	V-IX	5-20 cm	C	M	
<i>Alcea rosea</i> L., Sp. Pl.: 687. 1753		Paleotemplada	Hemic.-esc.	VII-IX	1-3 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Allium ampeloprasum</i> L., Sp. Pl.: 294. 1753		Circunmediterránea	Caméf.-sulfr.	I-IX	5-20 cm	C	M	
<i>Allium cepa</i> L., Sp. Pl.: 300. 1753		Paleotemplada	Geóf.-bulb.	IV-VIII	4-13 dm	C	C	A (Cult.-Nat.)
<i>Allium cyrilli</i> Ten., Fl. Napol. 3: 364. 1827		Desconocido	Geóf.-bulb.	VII-XI	5-12 dm	RR	RR	
<i>Allium lusitanicum</i> Lam., Encycl. 1: 70. 1783	<i>Allium schoenoprasum</i> L., Sp. Pl.: 301. 1753	Eurosiberiana S	Geóf.-bulb.	VI-VII	1-3 dm	RR	R	
<i>Allium moly</i> L., Sp. Pl.: 301. 1753		Mediterránea NW	Geóf.-bulb.	V-VI	1-4 dm	RR	R	
<i>Allium nigrum</i> L., Sp. Pl. ed. 2: 430. 1762		Mediterránea W	Geóf.-bulb.	IV-VI	5-10 dm	R	R	

<i>Allium paniculatum</i> L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 978. 1759	Circummediterránea	Geóf.-bulb.	V-VIII	1-6 dm	M	M	
<i>Allium roseum</i> L., Sp. Pl.: 296. 1753	Paleotemplada	Geóf.-bulb.	III-VI	2-7 dm	C	C	
<i>Allium sativum</i> L., Sp. Pl.: 296. 1753	Desconocido	Geóf.-bulb.	VI-VIII	4-10 dm	C	C	A (Cult.-Nat.)
<i>Allium sphaerocephalon</i> L., Sp. Pl.: 297. 1753	Paleotemplada	Geóf.-bulb.	V-VII	2-8 dm	C	C	
<i>Allium vineale</i> L., Sp. Pl.: 299. 1753	Paleotemplada	Geóf.-bulb.	V-VII	3-8 dm	R	M	
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., Fl. Petrop.: 16. 1799	Holártica	Hemic.-cesp.	V-VII	1-4 dm	RR	RR	
<i>Malva setigera</i> K.F. Schimp. & Spenn. In F.C.L. Spenner, Fl. Friburg. 3: 886. 1829							
<i>Althaea hirsuta</i> L., Sp. Pl.: 687. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	V-VII	5-20 cm	M	M	
<i>Althaea officinalis</i> L., Sp. Pl.: 686. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	VI-VIII	4-15 dm	R	R	
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., Amoen. Acad. 4: 487. 1759	Mediter-ránea-Iranotura-niana	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	R	M	
<i>Alyssum granatense</i> Boiss. & Reut. in Boissier & Reuter, Pugillus Pl. Nov. Afr. Bor. Hispan.: 9. 1852	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	R	R	
<i>Alyssum linifolium</i> Stephan ex Willd. in Willdenow, Sp. Pl., ed. 4, 3(1): 467. 1800	Mediter-ránea-Iranotura-niana	Teróf.-esc.	IV-VI	5-25 cm	M	R	
<i>Alyssum montanum</i> L., Sp. Pl.: 650. 1753	Eurosiberiana S-Mediterránea	Caméf.-sufir.	IV-VI	5-25 cm	M	R	
<i>Alyssum serpyllifolium</i> Desf., Fl. Atlant. 2: 70. 1798	Mediterránea W	Caméf.-sufir.	V-VIII	1-4 dm	M	R	
<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 290. 1799	Mediter-ránea-Iranotura-niana	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	

<i>Amaranthus albus</i> L., Syst. Nat., ed. 10: 1268. 1759	<i>Amaranthus thubergii</i> Moq., A.P. de Candolle, Prodr. 13(2): 262. 1849	Neotropical	Teróf.-esc.		VII-IX	1-6 dm	CC	C	A
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 12: 273. 1877		Norteamericana	Teróf.-esc.		VI-X	2-6 dm	CC	C	A
<i>Amaranthus deflexus</i> L., Mant. Pl.: 295. 1771		Neotropical	Teróf.-esc.		VII-X	1-8 dm	C	M	A
<i>Amaranthus hybridus</i> L., Sp. Pl.: 990. 1753		Neotropical	Teróf.-esc.		XII-X	2-10 dm	C	C	A
<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347. 1875		Neotropical	Teróf.-esc.		VII-X	2-10 dm	RR	R	A
<i>Amaranthus retroflexus</i> L., Sp. Pl.: 991. 1753		Norteamericana	Teróf.-esc.		VII-X	2-10 dm	C	C	A
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., Gesch. Bot.: 79. 1793		Mediterránea N	Neno (Meso)-fan		IV-V	1-3 m	M	M	
<i>Anacamptis champagneuxii</i> (Barnéoud) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 12: 120. 1997	<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>champagneuxii</i> (Barnéoud) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr., Orchid Gen. Anacamptis Orchis Neotinea, ed. 2: 130. 2007	Mediterránea W	Geóf.-tub.		IV-V	1-4 dm	RR	R	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 33. 1817		Circummediterránea	Geóf.-tub.		IV-VI	3-6 dm	R	RR	
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers., Syn. Pl. 2: 465. 1807		Circummediterránea	Teróf.-esc.		III-VI	1-4 dm	CC	CC	
<i>Anacyclus valentinus</i> L., Sp. Pl.: 892. 1753		Mediterránea W	Teróf.-esc.		III-VI	1-4 dm	R	C	
<i>Anagallis arvensis</i> L., Sp. Pl.: 148. 1753	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Marns & Anderb., Willdenowia 39: 51. 2009	Subcosmopolita	Teróf.-rept.		III-X	5-20 cm	CC	CC	

<i>Anagallis foemina</i> Mill., Gard. Diet., ed. 8: Anagallis no. 2. 1768	<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U. Manns & Anderb., Willdenowia 39: 52. 2009	Subcosmopolita	Teróf.-rept.	III-X	5-20 cm	M	M	
<i>Anagallis monelli</i> L., Sp. Pl.: 148. 1753	<i>Lysimachia monelli</i> (L.) U. Manns & Anderb., Willdenowia 39: 52. 2009	Mediterránea W	Hemic.-esc. (Caméf.-sufr.)	V-VII	1-4 dm	RR	RR	VI
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., Syst. Veg., ed. 13, 13: 165. 1774	<i>Lysimachia tenella</i> L., Sp. Pl.: 148. 1753	Mediterránea-Atlántica	Hemic.cesp	V-VII	418 cm	R	R	VI
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260. 1800		Mediterránea NW	Hemic.-bien.	V-VII	2-6 dm	R	R	
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 123. 1808		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Anchusa azurea</i> Mill., Gard. Diet., ed. 8: Anchusa no. 9. 1768		Mediterránea-Iranoturániana	Hemic.-esc.	IV-VII	3-8 dm	C	C	
<i>Androsace maxima</i> L., Sp. Pl.: 141. 1753		Paleotemplada	Teróf.-ros.	IV-VI	3-12 cm	R	M	
<i>Andryala integrifolia</i> L., Sp. Pl.: 808. 1753		Mediterránea-Atlántica	Teróf. (Hemic.)-esc.	IV-VII	2-6 dm	C	C	
<i>Andryala ragusina</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 1136. 1763		Mediterránea W	Hemic.-ros.	V-IX	1-5 dm	CC	C	
<i>Anethum graveolens</i> L., Sp. Pl.: 263. 1753		Iranoturániana	Teróf.esc.	VI-VIII	2-5 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Anthemis arvensis</i> L., Sp. Pl.: 894. 1753		Mediterránea-Iranoturániana	Teróf. (Hemic.)-esc.	IV-VII	1-5 dm	C	C	
<i>Anthemis cotula</i> L., Sp. Pl.: 894. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-IX	3-7 dm	R	R	
<i>Anthericum liliago</i> L., Sp. Pl.: 310. 1753		Mediterránea N	Hemic.-esc.	IV-VI	3-7 dm	M	M	
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230. 1808		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	2-8 dm	M	R	

<i>Anthyllis cytisoides</i> L., Sp. Pl.: 720. 1753	Mediterránea W	Nanofan.	II-VI	4-12 dm	C	C	
<i>Anthyllis montana</i> L., Sp. Pl.: 719. 1753	Mediterránea W	Caméf.-sufr.	IV-VI	5-25 dm	R	R	
<i>Anthyllis onobrychioides</i> Cav., Icon. 2: 40. 1793	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VI	2-5 dm	RR	R	
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>gandog- eri</i> (Sagorski) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287. 1931	Mediterránea SW	Hemic.-esc.	IV-VII	1-4 dm	CC	CC	
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>gandog- eri</i> (Sagorski) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287. 1931	Mediterránea SW	Hemic.-esc.	IV-VII	1-4 dm	RR	R	
<i>Antirrhinum barcelleri</i> Boreau, Graines Recolt. Jard. Bot. Angers: 1854[2]. 1855	Iberolevantina	Hemic.-esc.	III-VII	4-15 dm	C	C	
<i>Antirrhinum controversum</i> Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 146. 1909	Iberolevantina	Hemic.-esc.	III-VII	4-15 dm	M	M	
<i>Antirrhinum majus</i> L., Sp. Pl.: 617. 1753	Mediterránea	Hemic.-esc.	IV-IX	4-15 dm	RR	RR	
<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1: 115. 1771	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	IV-VI	5-15 cm	R	R	
<i>Aphyllanthus monspeliensis</i> L., Sp. Pl.: 294. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	III-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Helosciadium nod- iflorum</i> (L.) W.D.J. Koch, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 126. 1824	Circummediterránea	Hidrof.-rad.	V-VIII	3-10 dm	C	C	

<i>Aquilegia vulgaris</i> L., Sp. Pl.: 533. 1753	Eurosiberiana	Hemic.-esc.	IV-VI	5-15 mm	R	R	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. in Heynhold, Fl. Sachsen 1(2): 538. 1842	Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-V	5-30 cm	M	M	
<i>Arabis auriculata</i> Lam. in Lamarck & Poir., Encycl. 1: 219. 1783	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-V	5-25 cm	M	M	
<i>Arabis parvula</i> Dufour in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 228. 1821	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	III-V	5-20 cm	R	R	
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rehb. in Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 13. 1837-1838	Mediterránea NW	Hemic.-bien. (esc.)	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Araujia sericifera</i> Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62. 1818	Neotropical	Fan.-escand.	IV-IX	1-5 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Arbutus unedo</i> L., Sp. Pl.: 395. 1753	Circunmediterránea	Mesofán.	IX-XII	1-5 m	M	M	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154. 1800	Eurosiberiana	Hemic.-bien.	VI-IX	5-15 dm	M	M	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> subsp. <i>crassifolia</i> Rivas Mart. ex De la Torre, Alcanaz & M.B. Crespo, Lazaroa 16: 154. 1996	Mediterránea W	Fan.-rept.	II-V	3-18 dm	M	M	
<i>Arenaria aggregata</i> (L.) Loisel., Dict. Sci. Nat., ed. 2, 46: 513. 1827	Mediterránea NW	Caméf.-sufit.	V-VII	3-25 cm	R	R	
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rehb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824. 1845	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	3-12 cm	CC	C	
<i>Arenaria modesta</i> Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 291. 1821	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-VI	4-14 cm	M	M	
<i>Arenaria obtusiflora</i> Kunze in Flora 29: 632. 1846	Iberolevantina	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	R	R	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., Sp. Pl.: 423. 1753	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P. W. Ball in Feddes Rept. 79: 41. 1968	Mediterránea W	Caméf.-sufit. (Hemic.-esc.)	II-VI	8-25 cm	CC	C	

<i>Arisarum vulgare</i> O. Targ. Tozz., Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze 2(2): 67. 1810	Circummediterránea	Geóf.-riz.	XI-IV	1-4 dm	R	M	
<i>Aristolochia paucinerervis</i> Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136. 1874	Circummediterránea	Geóf.-tub.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Aristolochia pistolochia</i> L., Sp. Pl.: 962. 1753	Circummediterránea	Geóf.-tub.	IV-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 441. 1813- 1820	Iberolevantina	Hemic.-ros.	V-VII	2-5 dm	M	M	
<i>Armeria filicaulis</i> (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 527. 1841	Iberolevantina	Hemic.-ros.	V-VII	1-4 dm	RR	RR	VI
<i>Arrhenatherum album</i> (Vahl) Clayton in Kew Bull. 16: 250. 1962	Mediterránea W	Geóf.-bulb.	V-VII	5-10 dm	M	M	
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bae-</i> <i>ticum</i> Romero Zarco in Acta Bot. Malacit. 10: 134. 1985	Circummediterránea	Geóf.-bulb.	V-VII	2-10 dm	RR	RR	
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>sar-</i> <i>doum</i> (Em. Schmid) Gamisans in Candollea 29: 46. 1974	Mediterránea W	Hemic.-cesp.	V-VII	5-15 dm	C	M	
<i>Artemisia absinthium</i> L., Sp. Pl.: 848. 1753	Paleotemplada	Hemic.-esc.	VII-IX	3-10 dm	R	M	
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>gluti-</i> <i>nosa</i> (Besser) Batt. in Battandier & Trabut, Fl. Algérie, Dicot.: 469. 1889	Paleotemplada	Caméf.-frut. (Na- nofan.)	VII-X	4-10 dm	CC	C	
<i>Artemisia herba-alba</i> subsp. <i>valenti-</i> <i>na</i> (Lam.) Masclans in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 30: 177. 1966	Mediterránea W	Caméf.-sufit.	IX-XII	1-5 dm	M	M	
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte in Compt.-Rend. Assoc. Franc. Avancem. Sci. 1876: 513. 1877	Chino-japonesa	Hemic.-esc.	IX-XII	5-15 dm	R	R	A

<i>Arum italicum</i> Mill., Gard. Dict. ed. 8. 2. 1768	Circummediterránea	Geóf.-riz.	IV-V	3-8 dm	M	M	
<i>Arundo donax</i> L., Sp. Pl.: 81. 1753	Paleotropical	Geóf.-riz.	VII-XI	2-5 m	CC	CC	A (Cult.-Nat.)
<i>Asparagus acutifolius</i> L., Sp. Pl.: 314. 1753	Mediterránea	Fan.-escand.	VII-X	3-15 dm	CC	C	
<i>Asparagus horridus</i> L., Syst. Veg. ed. 13: 274. 1774	Circummediterránea	Geóf.-riz. (Na- no fan.)	VII-X	3-10 dm	R	C	
<i>Asparagus officinalis</i> L., Sp. Pl.: 313. 1753	Iranoturaniána	Geóf.-riz.	V-VI	4-15 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Asperugo procumbens</i> L., Sp. Pl.: 138. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	2-8 dm	R	R	
<i>Asperula aristata</i> subsp. <i>scabra</i> (J. Presl) P. Caputo & Del Guacchio, Pl. Biosystems 154: 770. 2020	Circummediterránea	Caméf.-sufr.	IV-IX	2-5 dm	C	C	
<i>Asperula arvensis</i> L., Sp. Pl., ed. 1: 103. 1753	Iranoturaniána	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Asperula cynanchica</i> L., Sp. Pl., ed. 1: 104. 1753	Mediterránea N	Caméf.-sufr. (Hemic.-esc.)	V-IX	1-4 dm	C	M	
<i>Asphodelus cerasiferus</i> J. Gay, Bull. Soc. Bot. France 4: 610. 1857	Mediterránea W	Geóf.-tub.	II-VI	6-18 dm	C	C	
<i>Asphodelus fistulosus</i> L., Sp. Pl.: 309. 1753	Mediterránea-Iranoturaniána	Hemic.-esc. (bilateral)	III-V	2-6 dm	C	C	
<i>Asphodelus serotinus</i> Wolley-Dod, J. Bot. 52: 13. 1914	Holártica	Hemic.-ros.	III-XI	1-3 dm	R	R	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., Sp. Pl.: 1081. 1753	Mediterránea NW	Hemic.-ros.	I-XII	5-30 cm	R	R	
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh. in J. Bot. (Schrader) 1799(1): 314. 1799	Mediterránea-Atlántica	Hemic.ros	I-XII	5-30 cm	RR	M	

<i>Asplenium foreziense</i> Magnier, Fl. Select. Exsicc.: [in schedis] no. 743, 1884		Mediterránea-Paleotropical	Hemic.-ros.	I-XII	15-45 cm	RR	RR	VI
<i>Asplenium onopteris</i> L., Sp. Pl.: 1081. 1753		Iberolevantina	Hemic.-ros.	X-VII	5-10 cm	R	M	
<i>Asplenium petrarcae</i> subsp. <i>bivalens</i> (D. E. Mey.) Lovis & Reichst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 79: 336, 1970		Holártica	Hemic.-ros.	I-XII	3-15 cm	R	R	
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., Sp. Pl.: 1081. 1753		Holártica	Hemic.-ros.	I-XII	5-20 cm	R	M	
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. (Crypt.): 12, 1795		Paleotemplada	Hemic.-ros.	I-XII	5-30 cm	RR	R	VI
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D. E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456, 1962		Subcosmopolita	Hemic.-ros.	I-XII	5-30 cm	M	M	
<i>Aster aragonensis</i> Asso, Syn. Stürp. Aragon.: 121. 1779	<i>Galatella aragonensis</i> Nees, Gen. Sp. Aster.: 167. 1832	Paleotemplada	Hemic.-esc.	VII-XI	2-8 dm	R	R	
<i>Aster sedifolius</i> L., Sp. Pl.: 874. 1753	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter, Willdenowia 33: 47. 2003	Neotropical	Hemic.-bien.	VII-X	4-14 dm	R	M	
<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron. in Bot. Jahrb. Syst. 29: 19. 1900	<i>Symphytotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L. Nesom, Phytologia 77: 292. 1995	Iberolevantina	Hemic.-esc.	VII-IX	1-3 dm	C	C	
<i>Aster willkommii</i> Sch. Bip. in Flora 34: 742. 1851		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-30 cm	RR	R	VI
<i>Asteriscus aquaticus</i> (L.) Less., Syn. Gen. Compos.: 210. 1832		Circummediterránea	Hemic.-bien.	IV-VII	2-5 dm	M	C	

<i>Asteriscus spinosus</i> (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthelot, Hist. Nles Canaries 3(2.2): 230. 1844	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass., G.-F. Cuvier, Dict. Sci. Nat., ed. 2. 37: 276. 1825	Mediterránea-Iranoturmiana	Teróf.-esc.	III-V	2-5 dm	CC	CC	
<i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68. 1844	<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L., Sp. Pl.: 148. 1753	Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VII	2-15 cm	C	C	
<i>Astragalus alopecuroides</i> L., Sp. Pl.: 755. 1753 subsp. <i>alopecuroides</i>		Mediterránea SW	Caméf.-rept.	III-V	5-15 cm	R	R	
<i>Astragalus bourgaeanus</i> Coss., Notes Pl. Crit.: 160. 1852		Circummediterránea	Teróf.-rept.	IV-VI	1-5 dm	RR	RR	
<i>Astragalus echinatus</i> Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 222. 1770		Mediterránea W	Caméf.-rept.	IV-VI	5-25 cm	R	R	
<i>Astragalus glaux</i> L., Sp. Pl.: 759. 1753		Mediterránea-Iranoturmiana	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Astragalus hamosus</i> L., Sp. Pl.: 758. 1753		Mediterránea W	Hemic.-ros.	IV-VI	5-20 cm	C	C	
<i>Astragalus incanus</i> L., Syst. Nat., ed. 10, 10: 1175. 1759		Mediterránea W	Hemic.-ros.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>gypsophilus</i> Rouy, Bull. Soc. Bot. France 35: 116. 1888		Mediterránea W	Caméf.-rept.	IV-VI	5-25 cm	M	C	
<i>Astragalus oxyglottis</i> M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 192. 1808		Circummediterránea	Teróf.-rept.	IV-VI	5-35 cm	RR	RR	VU
<i>Astragalus sesameus</i> L., Sp. Pl.: 759. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Astragalus stella</i> L. Syst. Nat., ed. 12. 2: 1134. 1767		Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VI	5-25 cm	M	M	
<i>Atractylis cancellata</i> L., Sp. Pl.: 830. 1753		Mediterránea W	Hemic.-cesp. (Caméf.-sufr.)	VII-X	1-4 dm	C	C	
<i>Atractylis humilis</i> L., Sp. Pl.: 829. 1753		Paleotemplada	Nanofan.	VII-X	8-20 dm	M	M	

<i>Atriplex halimus</i> L., Sp. Pl.: 1052. 1753	Holártica	Teróf.-esc.	VII-X	3-10 dm	C	C	
<i>Atriplex patula</i> L., Sp. Pl.: 1053. 1753	Holártica	Teróf.-esc.	VI-IX	3-8 dm	M	M	
<i>Atriplex prostrata</i> DC. in Lamarck & Candolle., Fl. Franç., ed. 3: 387. 1805	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	3-14 cm	M	M	
<i>Avellinia festuoides</i> (Link) Valdés & H. Scholz, Willdenowia 36: 662. 2006	Mediter-ránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-VI	2-15 dm	M	C	
<i>Avena barbata</i> Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315. 1800	Mediter-ránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-VI	2-15 dm	RR	RR	
<i>Avena fatua</i> L., Sp. Pl.: 80. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	2-10 dm	R	R	
<i>Avena sterilis</i> subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Gillet & Magne in Gillet, Nouv. Fl. Franc. 3: 532. 1875	Mediter-ránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-V	4-12 dm	M	M	
<i>Avena sterilis</i> L., Sp. Pl., ed. 2, 1: 118. 1762 subsp. <i>sterilis</i>	Mediter-ránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-V	4-12 dm	CC	C	
<i>Avenula bromoides</i> (Gouan) H. Scholz in Willdenowia 7: 420. 1974	Mediterránea W	Hemic.-cesp.	IV-VI	2-8 dm	CC	C	
<i>Helictichloa pratensis</i> subsp. <i>iberica</i> (St.-Yves) Romero Zarco, Candollea 66: 103. 2011	Euroiberiana	Hemic.-cesp.	V-VII	3-10 dm	M	M	
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., Nuov. Gen. Sp. Monocot.: 58. 1854	Paleotemplada	Hidróf.-rad.	IV-VII	1-5 dm	RR	RR	PNC

<i>Ballota hirsuta</i> Benth., Labiat. Gen. Spec.: 595. 1834	<i>Pseudodictamnus hirsutus</i> (Willd.) Salmaki & Siadat, Taxon 67: 779. 2018	Mediterránea SW	Caméf.-suf.	V-VII	3-8 dm	CC	C	
<i>Ballota nigra</i> L., Sp. Pl.: 582. 1753	<i>Himantoglossum roberianum</i> (Loisel.) P. Delforge, Naturalistes Belges 80: 401. 1999	Euroiberiana	Hemic.-esc.	VI-X	2-6 dm	C	M	
<i>Barila roberiana</i> (Loisel.) Greuter, Boissiera 13: 192. 1967		Circummediterránea	Geóf.-tub.	II-V	3-8 dm	RR	RR	PNC
<i>Barbisia trixago</i> L., Sp. Pl. 2: 602. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	2-4 dm	M	M	
<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck in Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 24: 155. 1909		Paleotemplada	Caméf.-suf.	VII-X	1-6 dm	R	R	
<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott in Feddes Repert. 89: 108. 1978		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	VI-X	4-15 dm	C	C	
<i>Bellis annua</i> L., Sp. Pl.: 887. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	II-V	2-14 dm	M	M	
<i>Bellis perennis</i> L., Sp. Pl.: 886. 1753		Paleotemplada	Hemic.-ros.	III-VI	5-15 cm	M	M	
<i>Beta macrocarpa</i> Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 302. 1827		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	2-4 dm	RR	RR	
<i>Beta maritima</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 322. 1762		Circummediterránea	Hemic.-esc.(bien)	IV-VII	2-8 dm	M	M	
<i>Beta vulgaris</i> L., Sp. Pl.: 222. 1753		Desconocido	Hemic.-bien./esc.	V-IX	6-20 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Bidens bipinnata</i> L., Sp. Pl.: 832. 1753		Neotropical	Teróf.esc.	VII-XI	3-8 dm	R	R	A
<i>Bidens radiata</i> Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2: 422. 1799		Neotropical	Teróf.esc.	VII-XI	3-8 dm	R	R	A
<i>Bidens subalternans</i> DC., Prodr. 5: 600. 1836		Neotropical	Teróf.esc	VII-XI	2-8 dm	M	M	A
<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng. in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 6: 448. 1820		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	R	R	

<i>Biscutella alcarriæ</i> A. Segura in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 4: 353. 1988	Iberolevantina	Hemic.-esc. (ros.)	IV-VII	2-5 dm	RR	RR	
<i>Biscutella atropurpurea</i> Mateo & Figuerola, Fl. Analit. Prov. Valencia: 370. 1987	Iberolevantina	Hemic.-esc. (ros.)	IV-VI	1-4 dm	RR	RR	
<i>Biscutella auriculata</i> L., Sp. Pl.: 652. 1753	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Biscutella conquensis</i> Mateo & M.B. Crespo, Bot. J. Linn. Soc. 132(1): 8. 2000	Iberolevantina	Hemic.-esc.	III-V	1-4 dm	R	R	
<i>Biscutella dufourii</i> Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 149. 1993	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VII	2-4 dm	RR	R	
<i>Biscutella stenophylla</i> Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 299. 1820	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	II-VI	2-7 dm	C	C	
<i>Biscutella turolensis</i> Pau ex Crespo & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 32. 1992	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VII	2-5 dm	R	R	
<i>Biscutella valentina</i> (L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155. 1962	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-IX	2-10 dm	RR	R	
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Sturt. in Bothalia 13: 318. 1981	Mediterránea SW	Caméf.-sufr. (Hemic.-esc.)	II-X	3-10 dm	CC	C	
<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25. 1933	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	8-20 cm	R	M	
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., Fl. Angl.: 146. 1762	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-IX	1-5 dm	M	M	
<i>Bolboschoenus glaucus</i> (Lam.) S. G. Sm. in Novon 5: 101. 1995	Cosmopolita	Geóf.-riz.	V-VIII	3-10 dm	M	M	

<i>Bombacilaena discolor</i> (Pers.) M. Lainz in Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos 16: 194. 1973	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-15 cm	M	M	
<i>Bombacilaena erecta</i> (L.) Smoljan. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarov Akad. Nauk SSSR 17: 450. 1955	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-15 cm	C	C	
<i>Borago officinalis</i> L., Sp. Pl.: 137. 1753	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	II-VI	2-5 dm	C	C	
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 155. 1812	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	III-V	5-25 cm	CC	C	
<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 740. 1817	Mediterránea W	Hemic.-esc. (Geóf.-riz.)	VI-VIII	4-10 dm	CC	C	
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101. 1812	Mediterránea W	Hemic.-esc. (Geóf.-riz.)	IV-VI	1-5 dm	CC	CC	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 101. 1812	Paleotemplada	Hemic.-cesp.	VI-VIII	3-6 dm	R	R	
<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo in Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 7. 1792	Mediterránea S	Hemic.-bien. (esc.)	X-V	2-5 dm	M	M	
<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch in Röhl. Deutschl. Fl., ed. 3, 4: 713. 1833	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	3-8 dm	R	R	
<i>Brassica oleracea</i> L., Sp. Pl.: 667. 1753	Atlántica	Caméf.-sufr. (Hemic.-esc.)	III-VII	4-18 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>africana</i> (Maire) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 86. 1983	Mediterránea SO	Hemic.-ros.	IV-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>blancoana</i> (Boiss.) Heywood in Feddes Rept. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 153. 1962	Iberolevantina	Hemic.-ros.	IV-VI	2-5 dm	R	R	
<i>Bromus diandrus</i> Roth in Bot. Abh.: 44. 1787	Paleotemplada	Teróf.-esc.	II-V	2-6 dm	C	C	

<i>Bromus erectus</i> Huds., Fl. Angl., ed. 1: 39. 1762	Paleotemplada	Hemic.-cesp.	V-VII	3-8 dm	M	M	
<i>Bromus hordeaceus</i> L., Sp. Pl.: 77. 1753	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	V-VII	1-6 dm	M	M	
<i>Bromus madritensis</i> L., Cent. Pl. 1: 5. 1755	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	III-V	1-4 dm	CC	CC	
<i>Bromus rigidus</i> Roth in Bot. Mag. (Zürich) 4(10): 21. 1790	Paleotemplada	Teróf.-esc.	II-V	2-5 dm	M	M	
<i>Bromus rubens</i> L., Cent. Pl. 1: 5. 1755	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	III-V	1-4 dm	CC	C	
<i>Bromus squarrosus</i> L., Sp. Pl.: 76. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Bromus sterilis</i> L., Sp. Pl.: 77. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	2-7 dm	M	M	
<i>Bromus tectorum</i> L., Sp. Pl.: 77. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq., Fl. Austriac. 2: 59. 1773	Paleotemplada	Hemic.-escand.	V-VII	1-3 m	M	M	
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, Feddes Rept. 79: 61. 1968							
<i>Bufoia perennis</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Loscós) Maleg., Sin. Fl. Iber. 24: 259. 1975	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	VI-VIII	1-4 dm	R	R	
<i>Bufoia tenuifolia</i> L., Sp. Pl.: 123. 1753	Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VIII	8-30 cm	R	R	
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnston, in J. Arnold Arbor. 35: 44. 1954	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	III-VI	1-5 dm	C	C	
<i>Buglossoides incrassata</i> (Guss.) I. M. Johnston, in J. Arnold Arbor. 35: 43. 1954	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	1-5 dm	RR	RR	

<i>Bunium balearicum</i> (Sennen) Mateo & López Udias in Anaes Jard. Bot. Madrid 57: 229. 1999	Iberolevantina	Geórf.-bulb.		IV-VI	2-6 dm	RR	RR	
<i>Bupleurum baldense</i> Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120. 1764	Circummediterránea	Teróf.-esc.		IV-VI	5-30 cm	M	M	
<i>Bupleurum frutescens</i> L., Cent. Pl. 1: 9. 1755	Mediterránea W	Caméf.-sulfr.		VI-IX	3-10 dm	CC	CC	
<i>Bupleurum fruticosum</i> L., Sp. Pl.: 238. 1753	Circummediterránea	Nanofan.		VII-IX	1-2.5 m	R	R	
<i>Bupleurum rigidum</i> L., Sp. Pl.: 238. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.		VI-VIII	3-10 dm	C	M	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., Sp. Pl.: 236. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.		V-VII	1-5 dm	R	R	
<i>Bupleurum semicompositum</i> L., Demonstr. Pl.: 7. 1753	Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.		IV-VI	3-20 cm	R	M	
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., Sp. Pl.: 238. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.		VI-VII	5-40 cm	R	R	PNC
<i>Buxus sempervirens</i> L., Sp. Pl.: 983. 1753	Mediterránea NW	Nanofan.		II-IV	5-25 dm	M	M	
<i>Calendula arvensis</i> (Vaill.) L., Sp. Pl., ed. 2: 1303. 1763	Paleotemplada	Teróf.-esc.		I-XII	5-35 cm	CC	CC	
<i>Calendula officinalis</i> L., Sp. Pl.: 921. 1753	Asiática?	Hemic.-esc. (bi- enal)		II-XII	2-6 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 225. 1822	Mediterránea W	Nanofan.		III-VI	1-3 m	M	M	
<i>Callipeltis cucullaris</i> (L.) DC., Prodr. 4: 613. 1830	Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.		III-V	5-20 cm	RR	RR	VU
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, Brit. Fl., ed. 2, 1: 114. 1808	Mediterránea-At- lántica	Nanofan.		VII-X	3-14 dm	R	R	

<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br., Prodr.: 483. 1810	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl., J. Hort. Soc. London 1: 70. 1846	Subcosmopolita	Hemic.-escand.	V-IX	4-20 dm	C	C	
<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC. in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 517. 1821		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Campanula erinus</i> L. Sp. Pl.: 169. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	3-13 cm	C	C	
<i>Campanula fastigiata</i> Schult. in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 5: 136. 1819		Mediterránea-Iranotur-niana	Teróf.-esc.	IV-VI	2-8 cm	RR	RR	VI
<i>Campanula hispanica</i> Willk. in Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 291. 1868		Iberolevantina	Hemic.-esc	VI-VIII	3-6 dm	RR	RR	
<i>Campanula lusitanica</i> L. in Loefl., Iter Hisp.: 111. 1758		Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VIII	8-25 cm	RR	RR	
<i>Campanula rapuncululus</i> L., Sp. Pl.: 164. 1753		Paleotemplada	Hemic.-bien.	IV-VII	3-10 dm	M	M	
<i>Campanula semisecta</i> Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 115. 1897		Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VI	5-25 cm	R	R	
<i>Camphorosma monspeliaca</i> L., Sp. Pl.: 122. 1753		Mediterránea-Iranotur-niana	Caméf.-suf.	VI-IX	1-5 dm	R	R	
<i>Cannabis sativa</i> L., Sp. Pl.: 1027. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	VI-IX	5-20 cm	RR	R	A
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. in Medikus, Pfl.-Gatt.: 85. 1792		Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-XII	1-4 dm	CC	CC	
<i>Cardamine hirsuta</i> L., Sp. Pl., ed. 1: 655. 1753		Cosmopolita	Teróf.-esc.	I-V	5-25 cm	C	C	
<i>Carduncellus hispanicus</i> subsp. <i>araneosus</i> (Boiss. & Reut.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 531. 1982	<i>Carthamus hispanicus</i> subsp. <i>araneosus</i> (Boiss. & Reut.) Greuter, Willdenowia 33: 53. 2003	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	1-4 dm	R	R	

<i>Carduncellus monspelliensis</i> All., Fl. Pedem. 1: 154. 1785	<i>Cardhamus carduncellus</i> L., Sp. Pl.: 831. 1753	Mediterránea W	Caméf.-sufr.	V-VII	2-15 cm	M	M	
<i>Carduus bourgeanus</i> Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 62. 1852		Mediterránea W	Hemic.-bien.	IV-VI	3-12 dm	R	R	
<i>Carduus nigrescens</i> Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30. 1779		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	4-12 dm	M	M	
<i>Carduus pycnocephalus</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 1151. 1763		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-VI	4-10 dm	C	C	
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, Fl. Londin.: Ad t. 55. 1789		Mediterránea-Atlántica	Teróf.-esc.	III-VI	4-12 dm	C	C	
<i>Carduus valentinus</i> Boiss. & Reut. in Boissier, Diagn. Pl. Orient., ser. 2 3: 45. 1856	<i>Carduus meonanthus</i> subsp. <i>valentinus</i> (Boiss. & Reut.) Desvosa & Talavera, Rev. Carduus en Penins. Iberica e Is. Baleares: 102. 1981	Iberolevantina	Hemic.-bien.	IV-VI	2-5 dm	R	R	
<i>Carex caryophyllea</i> Latour., Chlor. Lugd.: 27. 1785		Paleotemplada	Geóf.-riz.	III-VI	5-30 cm	R	R	
<i>Carex distans</i> L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1263. 1759		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	IV-VII	3-8 dm	R	M	
<i>Carex divisa</i> Huds., Fl. Angl.: 348. 1762		Paleotemplada	Geóf.-riz.	III-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Carex divulsa</i> Stokes in Withering, Bot. Arr. Brit. Pl., ed. 2: 1035. 1787		Eurosiberiana	Hemic.-cesp.	IV-VII	2-6 dm	R	M	
<i>Carex flacca</i> Schreb., Spic. Fl. Lips.: App. 178. 1771		Eurosiberiana-Mediterránea	Geóf.-riz.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Carex halleriana</i> Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133. 1779		Circummediterránea	Hemic.-cesp.	III-VI	1-4 dm	CC	C	
<i>Carex hirta</i> L., Sp. Pl.: 975. 1753		Paleotemplada	Geóf.-riz.	V-VII	1-4 dm	R	R	

<i>Carex hispida</i> Schkuhr, Besch. Riedgräs.: 63. 1801		Circummediterránea	Geóf.-riz.	IV-VII	6-18 dm	R	M	
<i>Carex humilis</i> Leyss., Fl. Halens.: 175. 1761		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	II-V	5-25 cm	C	C	
<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., Pl. Env. Paris: 18. 1840		Mediterránea W	Hemic.-cesp.	IV-VII	2-5 dm	R	M	
<i>Carex muricata</i> subsp. <i>pairae</i> (F. W. Schultz) Čelak. in Kvetena Okoli Pražského: 43. 1870	<i>Carex pairae</i> F.W. Schultz, Flora 51: 303. 1868	Paleotemplada	Hemic.-cesp.	IV-VII	2-5 dm	RR	R	
<i>Carex pendula</i> Huds., Fl. Angl.: 352. 1762		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	IV-VII	6-18 dm	RR	R	
<i>Carex riparia</i> Curtis, Fl. Londin. 2(4): t. 60. 1783		Paleotemplada	Geóf.-riz. (Hemic.-cesp.)	V-VII	5-15 dm	RR	R	
<i>Carlina hispanica</i> Lam., Encycl. 1: 624. 1785		Mediterránea W	Hemic.-esc.	VII-X	2-5 dm	C	C	
<i>Carlina vulgaris</i> L., Sp. Pl.: Errata. 1753		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	VII-IX	2-6 dm	M	M	
<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC., Mém. Mus. Hist. Nat. 7: 250. 1821		Mediterránea-Iranoturaniána	Teróf.-esc.	II-V	5-30 cm	RR	M	
<i>Carthamus creticus</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 1163. 1763		Mediterránea merid.	Teróf.-esc.	VI-VII	3-6 dm	M	M	
<i>Carthamus lanatus</i> L., Sp. Pl.: 830. 1753	<i>Phonus lanatus</i> (L.) Hill, Hort. Kew.: 56. 1768	Circummediterránea	Teróf.-esc.	VI-VIII	3-5 dm	C	C	
<i>Catananche caerulea</i> L., Sp. Pl.: 812. 1753		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	3-8 dm	M	M	
<i>Caucalis platycarpus</i> L., Sp. Pl.: 241. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	5-30 cm	M	M	
<i>Celtis australis</i> L., Sp. Pl.: 1043. 1753		Circummediterránea	Macrofan.	IV-V	5-20 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Centaurea x polymorpha</i> Lag., Gen. Sp. Pl.: 32. 1816		Iberolevantina	Caméf.-sulf.	III-VI	1-4 dm	R	R	

<i>Centaurea x pouzinii</i> DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 91. 1813	Iberolevantina	Caméf.-suffr.	III-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Centaurea x ernalii</i> Mateo & M.B. Crespo, Bol. Soc. Brot. ser. 2. 61: 265. 1988	Mediterránea W	Caméf.-suffr.	II-XI	2-5 dm	R	C	
<i>Centaurea aspera</i> L., Sp. Pl.: 916. 1753 subsp. <i>aspera</i>	Iberolevantina	Caméf.-suffr.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>stenophylla</i> (Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 432. 1879	Iberolevantina	Caméf.-suffr.	II-XI	2-5 dm	M	M	
<i>Centaurea bofilliana</i> Sennen ex Devesa & E. López, Lagascalea 32: 250. 2012	Paleotemplada	Hemic.-esc.	III-X	2-6 dm	R	CC	
<i>Centaurea calcitrapa</i> L., Sp. Pl.: 917. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-IX	2-5 dm	C	R	
<i>Centaurea castellanoides</i> subsp. <i>italaverae</i> E. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 33: 60. 2008	Paleotemplada	Hemic.-esc.	IV-VI	2-5 dm	RR	R	
<i>Centaurea cyanus</i> L., Sp. Pl.: 911. 1753	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	IV-VI	2-5 dm	R	R	
<i>Centaurea depressa</i> M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 346. 1808	Iberolevantina	Caméf.-suffr.	III-VI	1-4 dm	RR	R	
<i>Centaurea gabrielis-blancæ</i> Fern. Casas in Fontqueria 10: 6. 1986	Circummediterránea	Teróf.-esc.	V-VIII	2-7 dm	R	M	
<i>Centaurea melitenensis</i> L., Sp. Pl.: 917. 1753	Mediterránea W	Hemic.-ros.	VI-VII	2-8 dm	M	M	
<i>Centaurea ornata</i> Willd., Sp. Pl. 3: 2320. 1803	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Centaurea pinæ</i> Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 12. 1887	Mediterránea W	Hemic.-ros.	VI-VII	2-8 dm	R	M	

<i>Centaurea saetabensis</i> Coincy in J. Bot. (Morot) 13: 332. 1899	<i>Centaurea resupinata</i> Coss., Notes Pl. Crit.: 114. 1851 subsp. <i>resupinata</i>	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 cm	M	M	
<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>cephalariifolia</i> (Willk.) Greuter in Willdenowia 33: 56. 2003		Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-VII	4-10 dm	M	M	
<i>Centaurea solstitialis</i> L. Sp. Pl.: 917. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	V-VII	3-12 dm	RR	RR	
<i>Centaurea toletana</i> Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 210. 1842		Iberolevantina	Hemic.-ros.	V-VII	3-8 cm	RR	RR	PNC
<i>Centaurea triumphetti</i> subsp. <i>lingulata</i> (Lag.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 209. 1976		Mediterránea NW	Hemic.-esc.	V-VII	4-20 cm	M	M	
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75. 1800		Paleotemplada	Hemic.-bien.	V-VII	1-3 dm	M	M	
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, Fl. Berks.: 342. 1898		Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-IX	4-20 cm	M	M	
<i>Centaureum quadrifolium</i> (L.) G. López & C.E. Jarvis, Anales Jard. Bot. Madrid 40: 342. 1984		Iberolevantina	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	IV-IX	1-3 dm	C	C	
<i>Centaureum spicatum</i> (L.) R. M. Fritsch in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien nov. ser., 5: 97. 1907	<i>Schenkia spicata</i> (L.) G. Mans., Taxon 53: 726. 2004	Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-IX	4-20 cm	R	R	
<i>Centaureum tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) R. M. Fritsch in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien nov. ser., 5: 97. 1907		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-IX	5-20 cm	R	R	
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Duft., Hist. Nat. Valer.: 39. 1811	<i>Valeriana calcitrapae</i> L., Sp. Pl.: 31. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	II-VII	5-30 cm	M	M	
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 4: 239. 1805	<i>Valeriana rubra</i> L., Sp. Pl.: 31. 1753	Circummediterránea	Caméf.-sufit.	II-VI	4-10 dm	M	M	

<i>Cephalanthera damasonium</i> (Müll.) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 225. 1906	Eurosiberiana	Geóf.-riz.	IV-VII	2-5 dm	RR	R	
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) R. M. Fritsch, Oesterr. Bot. Z. 38: 81. 1888	Paleotemplada	Geóf.-riz.	IV-VI	1-4 dm	RR	R	
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 38. 1817	Paleotemplada	Geóf.-riz.	IV-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. nov. (15), 3: 47. 1818	Circunmediterránea	Caméf.-sulf.	VII-X	3-8 dm	C	C	
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers., Syn. Pl. 1: 520. 1805	Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	III-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Cerastium dichotomum</i> L., Sp. Pl.: 438. 1753	Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	III-V	1-2 dm	R	R	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., Fl. Env. Paris: 226. 1799	Cosmopolita	Teróf.-esc.	III-V	5-25 cm	C	C	
<i>Cerastium gracile</i> Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 304. 1820	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-V	5-15 cm	C	C	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, Fl. Lon- din. 2: (6) t. 30. 1777	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Ceratocephala falcata</i> (L.) Cramer, Disp. Syst. Pl.: 70. 1803	Eurosiberiana	Teróf.-esc.	III-VII	2-10 cm	RR	RR	
<i>Ceratonía siliqua</i> L., Sp. Pl.: 1026. 1753	Circunmediterránea	Macrofan.	IX-XII	2-15 m	R	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Cercis siliquastrum</i> L., Sp. Pl.: 374. 1753	Mediterránea E	Mesofan.	III-V	2-6 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Ceterach officinarum</i> Willd., Anleit. Selbststud. Bot.: 578. 1804	Circunmediterránea	Hemic.-ros.	I-XII	5-30 cm	C	C	
<i>Chaenorhizum crassifolium</i> (Cav.) Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2. 1870: 579	Iberolevantina	Caméf.-sulf.	IV-VII	5-20 cm	C	C	

<i>Chaenorhinum exile</i> (Coss. & Kralik) Lange	<i>Chaenorhinum rup- estre</i> (Guss.) Speta, Stapfia 7: 25. 1980	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-V	1-10 cm	RR	RR	
<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577. 1870.		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-IX	5-20 cm	M	M	
<i>Chaenorhinum reyesii</i> (C. Vicioso & Pau) Benedi, Collect. Bot. (Barcelo- na) 20: 55. 1991		Iberolevantina	Teróf.-esc.	IV-V	5-30 cm	RR	RR	
<i>Chaenorhinum robustum</i> Loscos in Trat. Pl. Arag. 1: 14. 1876.		Iberolevantina	Teróf.-esc.	IV-VII	5-30 cm	R	R	
<i>Chaenorhinum rubrifolium</i> (DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127. 1869		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	5-20 cm	R	R	
<i>Chaenorhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578. 1870		Iberolevantina	Teróf.-esc.	IV-VII	5-30 cm	R	R	
<i>Chamaeiris foetidissima</i> Medik., Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418. 1790	<i>Iris foetidissima</i> L., Sp. Pl.: 39. 1753	Mediterránea W	Geóf.-riz.	III-VI	3-6 dm	RR	RR	PNC
<i>Chamaeiris reichenbachiana</i> (Klatt) M.B. Crespo, Flora Montiber. 49: 68. 2011	<i>Iris reichenbachiana</i> Klatt, Linnaea 34: 613. 1866	Circunmediterránea	Geóf.-riz.	III-VI	3-6 dm	R	R	PNC
<i>Chamaerops humilis</i> L., Sp. Pl.: 1187. 1753		Mediterránea C-W	Nano (Meso)-fan.	III-V	5-25 dm	RR	C	
<i>Chamaesyce canescens</i> (L.) Prokh., Consp. Syst. Thymalus As. Med.: 15, 19. 1933	<i>Euphorbia chamaesyce</i> L., Sp. Pl.: 455. 1753	Circunmediterránea	Teróf.-rept.	IV-X	5-35 cm	M	M	
<i>Cheilanthes acrostica</i> (Balb.) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215. 1866	<i>Hemionitis acrostica</i> (Balb.) Mosyakin, Phytotaxa 373: 165. 2018)	Circunmediterránea	Hemic.-ros.	IX-VII	3-20 cm	R	M	

<i>Cheirolophus intybaceus</i> (Lam.) Dostál in Bot. J. Linn. Soc. 71: 274. 1976	Mediterránea W	Caméf.-sufir.	V-X	4- 15 dm	M	M	
<i>Chelidonium majus</i> L., Sp. Pl.: 505. 1753	Holártica	Hemic.-esc.	III-VII	2-8 dm	R	R	
<i>Chenopodium album</i> L., Sp. Pl.: 219. 1753	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	VI-XI	4-12 dm	CC	CC	
<i>Chenopodium ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, Ukrayins'k. Bot. Zhurn. 59: 382. 2002	Neotropical	Hemic.-esc.	VII-X	4-12 dm	M	M	A
<i>Chenopodium murale</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, Will- denowia 42: 14. 2012	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	I-XII	1-6 dm	CC	CC	
<i>Chenopodium opulifolium</i> W. D. J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6. 1814	Paleotemplada	Teróf.-esc.	VI-XI	4-12 dm	C	C	
<i>Chenopodium pumilio</i> R. Br., Prodr.: 407. 1810	Australiana	Teróf. (Hemic.- esc.)	VII-X	2-5 dm	RR	RR	A
<i>Chenopodium vulvaria</i> L., Sp. Pl.: 220. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-IX	1-5 dm	C	C	
<i>Chondrilla juncea</i> L., Sp. Pl.: 796. 1753	Mediterránea-Iranoturamiana	Hemic.-bien.	VII-IX	4-12 dm	M	C	
<i>Cichorium intybus</i> L., Sp. Pl.: 813. 1753	Paleotemplada	Hemic.-esc.	VII-IX	4-12 dm	CC	C	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., Fl. Carn- iol., ed. 2, 2: 126. 1772	Paleotemplada	Geóf.-rad.	V-IX	3-12 dm	C	C	

<i>Cirsium echinatum</i> (Desf.) DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 5: 465. 1815	<i>Lophiolepis echinata</i> (Desf.) Del Guacchio, Bureš, Iamónico & P. Caputo, Pl. Biosystems 156: 1279. 2022	Mediterránea W	Hemic.-bien.	VI-VIII	2-5 dm	M	M	
<i>Cirsium odontolepis</i> DC., Prodr. 7: 305. 1838	<i>Lophiolepis odontolepis</i> (Boiss. ex DC.) Del Guacchio, Bureš, Iamónico & P. Caputo, Pl. Biosystems 156: 1284. 2022	Mediterránea W	Hemic.-bien.	VI-VIII	3-8 dm	M	M	
<i>Cirsium pyrenaicum</i> (Jacq.) All., Fl. Pedem. 1: 151. 1785		Mediterránea W	Geóf.-riz.	VI-IX	5-15 dm	R	R	
<i>Cirsium valdespinulosum</i> Sennen, Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 28(5-8): 105. 1930		Iberolevantina	Hemic.-bien.	IV-VI	4-15 dm	R	R	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., Fl. Na- pol. 5: 209. 1835-1838		Paleotemplada	Hemic.-bien.	IV-VI	6-18 dm	C	C	
<i>Cistus cyprius</i> Lam. in Eycl. 2: 16. 1786		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	3-10 dm	RR	RR	
<i>Cistus xflorentinus</i> Lam. in Eycl. 2: 17. 1786		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	3-10 dm	RR	RR	
<i>Cistus xhybridus</i> Pourr. in Mén. Acad. Sci. Toulouse 3: 312. 1788		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	3-10 dm	RR	RR	
<i>Cistus xincanus</i> L., Sp. Pl.: 524. 1753		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	3-10 dm	RR	RR	
<i>Cistus albidus</i> L., Sp. Pl.: 524. 1753		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	4-12 dm	C	C	
<i>Cistus clusii</i> Dunal in Candolle, Prodr. 1: 266. 1824		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	4-12 dm	C	C	
<i>Cistus ladaniifolius</i> L., Sp. Pl.: 523. 1753		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	4-12 dm	R	R	
<i>Cistus laurifolius</i> L., Sp. Pl.: 523. 1753		Circunmediterránea	Nanofan.	III-VI	1-3 m	R	R	

<i>Cistus monspeliensis</i> L., Sp. Pl.: 524. 1753	Circummediterránea	Nanofan.	V-VII	8-18 dm	R	R	
<i>Cistus populifolius</i> L., Sp. Pl.: 523. 1753	Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	5-15 dm	R	M	
<i>Cistus salvifolius</i> L., Sp. Pl.: 524. 1753	Circummediterránea	Nanofan.	IV-VI	5-16 dm	C	C	
<i>Cistus ×limon</i> (L.) Osbeck in Reise Ostindien: 250. 1765	Centroasiática	Nanofan.	III-VI	3-10 dm	R	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Cistus ×sinensis</i> (L.) Osbeck in Reise Ostindien: 250. 1765	Chino-japonesa	Mesofan.	I-XII	2-5 m	R	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Cistus aurantium</i> L., Sp. Pl.: 783. 1753	Chino-japonesa	Mesofan.	IV-X	2-5 m	R	C	A (Cult.-Nat.)
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32. 1809	Subcosmopolita	Geóf.-riz.	VI-VIII	8-22 dm	M	M	
<i>Clematis flammula</i> L., Sp. Pl.: 544. 1753	Circummediterránea	Fan.-escand.	VI-IX	1-4 m	C	C	
<i>Clematis vitalba</i> L., Sp. Pl.: 544. 1753	Eurosiberiana	Fan.-escand.	VI-VIII	2-10 m	R	R	
<i>Cleonia lusitanica</i> (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837. 1763	Mediterránea W	Teróf.-esc.	VI-VIII	5-25 cm	RR	RR	
<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 513. 1891	Paleotemplada	Teróf. (Hemic.)-esc.	V-VII	8-20 cm	R	R	
<i>Clinopodium alpinum</i> subsp. <i>meridionale</i> (Nyman) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 16. 1999	Mediterránea	Caméf.-sulf.	V-VII	5-20 cm	M	M	
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 515. 1891	Circummediterránea	Hemic.-esc.	VII-XI	2-6 dm	R	M	
<i>Clinopodium rotundifolium</i> (Pers.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 515. 1891	Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VII	5-20 cm	R	R	

<i>Clypeola ionthlaspi</i> L., Sp. Pl.: 652. 1753 subsp. <i>ionthlaspi</i>		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Clypeola ionthlaspi</i> subsp. <i>microcarpa</i> (Moris) Fiori in Arcangeli, Comp. Fl. Atlant.: 63. 1882	<i>Clypeola ionthlaspi</i> L., Sp. Pl.: 652. 1753	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-V	4-15 cm	M	M	
<i>Cnicus benedictus</i> L., Sp. Pl.: 826. 1753	<i>Centaurea benedicta</i> (L.) L., Sp. Pl., ed. 2.: 1296. 1763	Circummediterránea	Teróf.-esc.	V-VII	1-5 dm	RR	RR	
<i>Colutea arborescens</i> subsp. <i>hispanica</i> (Talavera & Arista) Mateo & M.B. Crespo, Man. Determin. Fl. Valenciana, ed. 2 450. 2001		Iberolevantina	Mesofan.	III-V	2-3 m	M	M	
<i>Colutea brevislata</i> Lange, Ind. Sem. Horto Haun. 1861: 30. 1861		Mediterránea NW	Mesofan.	III-VI	1-4 m	M	M	
<i>Conopodium arvense</i> (Coss.) Calest. in Webbia 1: 279. 1905		Iberolevantina	Geóf.-bulb.	IV-VII	2-5 dm	R	R	
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (Boiss.) Calest. in Webbia 1: 279. 1905		Iberolevantina	Geóf.-bulb.	V-VI	2-6 dm	R	R	
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort. in Dumortier, Fl. Belg.: 123. 1827		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	IV-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Consolida orientalis</i> Schrödingier, Abh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 4(5): 27. 62. 1909	<i>Delphinium ajacis</i> L., Sp. Pl.: 531. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	1-5 dm	R	R	
<i>Consolida pubescens</i> (DC.) Soó in Oesterr. Bot. Z. 71: 241. 1922	<i>Delphinium pubescens</i> DC., J.B.A.M. de Lamarck & A.P. de Candolle, Fl. Franç., éd. 3, 4: 641. 1805	Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VII	1-5 dm	M	M	
<i>Convolvulus althaeoides</i> L., Sp. Pl.: 156. 1753		Circummediterránea	Hemic.-escansd.	IV-VI	3-12 dm	CC	C	
<i>Convolvulus arvensis</i> L., Sp. Pl.: 153. 1753		Cosmopolita	Geóf.-riz.	IV-IX	2-10 dm	CC	CC	

<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr. in Lamarek, Encycl. 3: 551. 1792		Mediterránea W	Caméf.-sufir.	III-VI	1-4 dm	CC	C	
<i>Convolvulus lineatus</i> L., Syst. Nat., ed. 10: 923. 1759		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	IV-VI	5-20 cm	CC	C	
<i>Coryza bonariensis</i> (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632. 1943	<i>Erigeron bonariensis</i> L., Sp. Pl.: 863. 1753	Neotropical	Teróf.-esc.	I-XII	2-8 dm	CC	C	
<i>Coryza canadensis</i> (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632. 1943	<i>Erigeron canadensis</i> L., Sp. Pl.: 863. 1753	Norteamericana	Teróf.-esc.	VI-X	3-8 dm	CC	C	
<i>Coriaria myrtifolia</i> L., Sp. Pl.: 1037. 1753		Mediterránea W	Mesofan.	III-V	5-25 dm	R	M	
<i>Coris monspeliensis</i> L., Sp. Pl.: 177. 1753		Iberolevantina	Caméf.-sufir.	IV-VI	5-25 cm	C	C	
<i>Cornus sanguinea</i> L., Sp. Pl.: 117. 1753		Eurosiberina	Mesofan.	V-VI	2-5 m	R	R	
<i>Coronilla glauca</i> L., Cent. Pl. I: 23. 1755	<i>Coronilla valentina</i> subsp. <i>glauca</i> (L.) Batt., J.A. Battandier & L.C. Trabut, Fl. Algérie, Dicot.: 285. 1889	Circunmediterránea	Nanofan.	II-V	3-12 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Coronilla juncea</i> L., Sp. Pl.: 742. 1753		Mediterránea W	Nanofan.	II-VI	4-12 dm	M	C	
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., Cent. Pl. II 2: 28. 1756		Mediterránea W	Caméf.-sufir.	III-VII	1-14 cm	M	M	
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>lotoides</i> (W. D. J. Koch) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 185. 1878		Mediterránea N	Caméf.-sufir.	IV-VII	4-4 dm	M	C	
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2: 188. 1835		Mediter-ránea-Iranotura-niana	Teróf.-esc.	III-VI	5-25 cm	C	C	
<i>Coronilla varia</i> L., Sp. Pl.: 743. 1753		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	V-VII	2-6 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm. in Smith, Comp. Fl. Brit., ed. 1: 691. 1800	<i>Lepidium didymum</i> L., Mant. Pl.: 92. 1767	Neotropical	Teróf.-esc.	II-VI	1-4 dm	C	M	

<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325. 1900	Neotropical	Hemic.-cesp.	VII-IX	2-4 m	RR	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Corylus avellana</i> L., Sp. Pl.: 998. 1753	Euroiberiana	Mesofan.	III-IV	2-5 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P. Beauv., Agrostogr. 90: 159. 1812	Euroiberiana	Hemic.-cesp.	VI-VII	1-4 dm	R	M	
<i>Corynephorus divaricatus</i> (Pourr.) Breistr. in Procès-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol. (Grenoble), ser. 3, 17: 3. 1950	Mediterránea W	Teróf.-esc.	II-IV	1-4 dm	R	M	
<i>Cosentinia vellea</i> (Aiton) Tod. in Giom. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 220. 1866	Mediterránea-Sub-tropical	Hemic.-ros.	IX-VII	4-20 cm	R	R	
<i>Cotoneaster tomentosus</i> (Aiton) Lindl. in Trans. Linn. Soc. London 13: 101. 1821	Mediterránea N	Meso (Nano)-fan.	IV-VI	1-3 m	RR	RR	
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87. 1903	Mediterránea-Atlántica	Teróf.-esc.	II-V	1-5 cm	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., Fl. Austriac. 3: 50. 1775	Paleotemplada	Mesofan.	IV-VI	1-5 m	C	C	
<i>Crepis albidia</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (Rouy) Bab. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22: 315. 1947	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657. 1841	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Crepis foetida</i> L., Sp. Pl.: 807. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	V-VII	1-5 dm	M	M	
<i>Crepis pulchra</i> L., Sp. Pl.: 806. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-VII	3-8 dm	M	M	
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thull.) Thell. in Schinz & Keller, Fl. Schweiz, ed. 3, 2: 361. 1914	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VII	1-6 dm	C	C	
<i>Crocus nevadensis</i> Amo & Campo, Revista Progr. Ci. Exact. 5: 55. 1871	Mediterránea SW	Geóf.-bulb.	II-IV	5-12 cm	RR	RR	VI

<i>Crucianella angustifolia</i> L., Sp. Pl.: 108. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	V-VIII	1-4 dm	C	C	
<i>Crucianella patula</i> L., Demonstr. Pl.: 4. 1753	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	V-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris) Vis., Fl. Dalmat. 2: 42. 1847	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Crupina vulgaris</i> Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 12: 68. 1817	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	2-5 dm	C	C	
<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 166. 1792	Paleotemplada	Teróf.-esc.	VII-X	3-20 cm	RR	RR	PNC
<i>Sporobolus schoenoides</i> (L.) P.M. Peterson, Taxon 63: 1234. 2014							
<i>Cucumis melo</i> L., Sp. Pl.: 1011. 1753	Paleotropical	Teróf.escand.	VI-IX	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Cucumis sativus</i> L., Sp. Pl.: 1012. 1753	Paleotropical	Teróf.escand.	VI-IX	1-2 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne in Lamarek, Encycl. 2: 151. 1786	Neotropical	Teróf.escand.	VI-IX	1-5 dm	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Cucurbita pepo</i> L., Sp. Pl.: 1010. 1753	Neotropical	Teróf.escand.	VI-IX	5-15 dm	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Hesperocyparis arizonica</i> (Greene) Bartel, Phytologia 91: 180. 2009	Norteamericana	Macrofan.	III-VI	4-25 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Hesperocyparis macrocarpa</i> (Hartw.) Bartel, Phytologia 91: 182. 2009	Norteamericana	Macrofan.	II-V	4-20 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Cupressus sempervirens</i> L., Sp. Pl.: 1002. 1753	Mediterránea E	Macrofan.	II-V	4-25 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Cuscuta approximata</i> Bab. in Ann. Mag. Nat. Hist. 13: 253. 1844	Mediterránea-Subtropical	Teróf.-par.	IV-VII	1-3 dm	R	R	
<i>Cuscuta campestris</i> Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138. 1932	Norteamericana	Teróf.-par.	IV-X	1-3 dm	R	R	

<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., Syst. Veg., ed. 13: 140. 1774		Paleotemplada	Teróf.-par.	I-XII	1-3 dm	C	C	
<i>Cuscuta scandens</i> Brot., Fl. Lusit. 1: 208. 1804		Subcosmopolita	Teróf.-par.	V-IX	1-3 dm	R	R	
<i>Cydonia oblonga</i> Mill., Gard. Diet., ed. 8: Cydonia no. 1. 1768		Iranoturaniiana	Mesofan.	IV-V	2-5 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Cylindropuntia pallida</i> (Rose) F.M. Knuth, Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 126. 1936		Neotropical	Mesofan.	IV-VI	2-5 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397. 1800		Subcosmopolita	Hemic.-esc.	III-X	1-5 dm	M	M	
<i>Cynanchum acutum</i> L., Sp. Pl.: 212. 1753		Mediterránea-Paleotropical	Fan.-escand.	VI-VIII	1-4 m	M	M	
<i>Cynara cardunculus</i> L., Sp. Pl.: 827. 1753		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	V-VII	3-12 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85. 1805		Subcosmopolita	Geóf.-riz.	I-XII	1-5 dm	CC	CC	
<i>Pardoglossum cheirifolium</i> (L.) E. Barbier & Mathez, Candollea 28: 306. 1973		Mediterránea W	Hemic.-bien.	II-V	1-4 dm	C	C	
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill., Gard. Diet., ed. 8: Cynoglossum no. 3. 1768		Mediterránea-Iranoturaniiana	Hemic.-bien.	III-VII	2-7 dm	C	C	
<i>Cynomorium coccineum</i> L., Sp. Pl.: 970. 1753		Mediterránea-Iranoturaniiana	Geóf.-riz.	III-V	1-3 dm	RR	RR	VI
<i>Cynosturus echinatus</i> L., Sp. Pl.: 72. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Cynosurus effusus</i> Link., J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315. 1800		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Cyperus flavidus</i> Retz., Observ. Bot. 5: 13. 1788		Subtropical	Teróf.-cesp.	VI-IX	1-5 dm	M	M	

<i>Cyperus fuscus</i> L., Sp. Pl.: 46. 1753		Paleotemplada	Teróf.-cesp.	VII-X	4-20 cm	R	R	
<i>Cyperus longus</i> L., Sp. Pl.: 45. 1753		Paleotemplada	Geóf.-riz.	VI-IX	5-10 dm	M	M	
<i>Cyperus rotundus</i> L., Sp. Pl.: 45. 1753		Subtropical	Geóf.-riz	VII-XI	1-4 dm	R	M	
<i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>macranthus</i> Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 35: 95. 1910		Mediterránea SW	Geóf.-par.	III-VI	3-10 cm	R	R	
<i>Cytinus ruber</i> (Fourr.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich, ed. 3: 69. 1922		Circummediterránea	Geóf.-par.	III-VI	3-10 cm	RR	M	
<i>Cytisus fontanesii</i> Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 405. 1878		Mediterránea W	Caméf.-sufi.	IV-VI	2-5 dm	R	R	VI
<i>Cytisus heterochrous</i> Colmeiro in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 333. 1872	<i>Genista patens</i> DC., Prodr. 2: 145. 1825	Iberolevantina	Mesofan.	IV-VI	1-4 m	M	M	
<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>reverchonii</i> (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart., Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid 3: 94. 1971; et l.c. 4: 77. 1971		Iberolevantina	Nanofan.	IV-VI	5-18 dm	R	R	
<i>Dactylis glomerata</i> L., Sp. Pl.: 71. 1753 subsp. <i>glomerata</i>		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	V-VIII	5-13 dm	R	R	
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 819. 1882		Circummediterránea	Hemic.-cesp.	IV-VII	2-6 dm	CC	C	
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8. 1962	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i> (Druce) Hyl., Nord. Kärlväxtfl. 2: 387. 1966	Mediterránea W	Geóf.tub	V-VII	3-8 dm	RR	RR	VI
<i>Damasonium polyspermum</i> Coss., Notes Pl. Crit.: 47. 1849		Circummediterránea	Hidróf.-rad.	V-VII	3-15 cm	RR	RR	PNC
<i>Daphne gnidium</i> L., Sp. Pl.: 357. 1753		Circummediterránea	Nanofan.	VII-IX	5-15 dm	C	C	

<i>Datura innoxia</i> Mill., Gard. Diet., ed. 8; Datura no. 5. 1768		Neotropical	Teróf.-esc.	VI-IX	3-20 dm	M	M	A
<i>Daucus carota</i> L., Sp. Pl.: 242. 1753		Paleotemplada	Hemic.-bien.	V-X	3-8 dm	CC	CC	
<i>Delphinium gracile</i> DC., Syst. Nat. 1: 347. 1817		Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-X	1-8 dm	M	M	
<i>Delphinium halteratum</i> subsp. <i>verdunense</i> (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 5(2): 703. 1929	<i>Delphinium verdunense</i> Balb., Cat. Pl.: 31. 1804	Mediterránea-Atlántica	Teróf.-esc.	VI-X	1-4 dm	M	M	
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(2): 192. 1891		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	3-8 dm	C	C	
<i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin in Clapham & al., Fl. Brit. Isles: 1434. 1952	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubb., J.G. Dony, Fl. Bedfordshire: 437. 1953	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	4-20 cm	CC	CC	
<i>Dianthus brachyanthus</i> Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 85. 1839	<i>Dianthus pungens</i> subsp. <i>brachyanthus</i> (Boiss.) B. Fern. Casas, G. López & M. Lainz, Anales Jard. Bot. Madrid 44: 180. 1987	Mediterránea W	Caméf.-sufit.	V-VII	4-15 cm	RR	RR	
<i>Dianthus broteri</i> subsp. <i>valentinus</i> (Willk.) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle, Rivasgodaya 6: 29. 1991	<i>Dianthus broteri</i> Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 22. 1852	Iberolevantina	Caméf.-sufit.	IV-VII	3-8 dm	R	M	
<i>Dianthus edetanus</i> (M.B. Crespo & Mateo) M.B. Crespo & Mateo, Flora Montibet. 40: 64. 2008		Iberolevantina	Caméf.-sufit.	V-VII	3-6 dm	R	R	

<i>Dianthus algetanus</i> subsp. <i>turoloensis</i> (Pau) M. Bernal, Lainz & Muñoz Garm., Anales Jard. Bot. Madrid 45: 575. 1988 publ. 1989	Iberolevantina	Caméf.-suf.	VI-IX	1-4 dm	R	R	
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng. Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. Ser. 10: 201. 1936	Subcosmopolita	Hemic.-cesp.	VI-XI	3-5 dm	M	M	
<i>Dictamnus hispanicus</i> Webb ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 263. 1893	Mediterránea W	Caméf.-suf.	V-VII	3-8 dm	R	R	
<i>Digitalis obscura</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 867. 1763	Iberolevantina	Caméf.-suf.	IV-VII	2-10 dm	M	M	
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler, Descr. Gram.: 27. 1802	Subtropical	Hemic.-esc.	IV-VII	2-10 dm	R	R	A
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik., Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 431. 1790	Mediterránea W	Geóf.-bulb.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC. in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 631. 1821	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	I-XII	1-5 dm	CC	CC	
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC. in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 634. 1821	Circummediterránea	Teróf.-ros.	II-V	8-30 cm	M	M	
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC. in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 635. 1821	Circummediterránea	Teróf.-ros.	XII-VI	5-25 cm	C	C	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., Sp. Pl.: 97. 1753	Paleotemplada	Hemic.-bien.	VI-IX	5-20 dm	M	M	

<i>Ditrichia viscosa</i> (L.) Greuter in Exsic. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fasc.: 71. 1973		Circummediterránea	Caméf.-sufr.	VIII-XI	4- 12 dm	C	C	
<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208. 1825	<i>Lotus hirsutus</i> L., Sp. Pl.: 775. 1753	Circummediterránea	Caméf.-sufr.	IV-VII	2-5 dm	M	M	
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2: 87. 1772 subsp. <i>pentaphyllum</i>	<i>Lotus dorycnium</i> L., Sp. Pl.: 776. 1753	Circummediterránea	Caméf.-sufr.	IV-VI	4-10(30) dm	CC	CC	
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>gracile</i> (Jord.) Rouy, Fl. France 5: 137. 1899	<i>Lotus jordanii</i> (Loret & Barrandon) Coulot, Rabaute & J.-M. Tison, Bioscme Mésogéen 31: 2. 2014	Mediterránea W	Caméf.-sufr.	V-VII	5-18 dm	R	R	
<i>Dorycnium rectum</i> (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208. 1825	<i>Lotus rectus</i> L., Sp. Pl.: 775. 1753	Circummediterránea	Nanofan.	V-VII	5-18 dm	M	M	
<i>Draba hispanica</i> Boiss. in Boissier, Elench. Pl. Nov.: 13. 1838		Mediterránea W	Caméf.-sufr.	IV-V	4-15 cm	R	R	
<i>Echallium elaterium</i> (L.) A. Rich., Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19. 1824		Circummediterránea	Geóf.-tub.	V-VIII	2-6 dm	M	M	
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 385. 1799		Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	IV-VI	3-20 cm	M	M	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 53. 1812		Paleotropical	Teróf.-esc.	VI-IX	3-15 dm	M	M	A
<i>Echinops ritro</i> L., Sp. Pl.: 815. 1753		Circummediterránea	Hemic.-esc.	VII-X	2-6 dm	CC	C	
<i>Echium asperinum</i> Lam., Tabl. Encycl. 1: 412. 1792		Mediterránea W	Hemic.-bien.	IV-VII	2-6 dm	M	M	
<i>Echium creticum</i> subsp. <i>granatense</i> (Coincy) Valdés in Castroviejo & al., Fl. Iberica 11. 2011		Mediterránea W	Hemic.-bien.	II-VI	2-7 dm	C	C	
<i>Echium plantagineum</i> L., Mant. Pl.: 202. 1771		Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	V-VIII	3-6 dm	R	R	

<i>Echium vulgare</i> subsp. <i>pusillum</i> (Sm.) Em. Schmid & Gans in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195. 1927		Mediterránea SW	Hemic.-bien.	II-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Echium vulgare</i> L., Sp. Pl.: 139. 1753 subsp. <i>vulgare</i>		Paleotemplada	Hemic.-bien.	V-VIII	2-6 dm	M	M	
<i>Elaeostelinum asclepium</i> L., Fl. Ital. 3: 383. 1838	<i>Thapsia asclepium</i> L., Sp. Pl.: 261. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	3-12 dm	M	M	
<i>Elatine bronchii</i> Clavaud., Actes Soc. Linn. Bordeaux 37: 63. 1883		Mediterránea-Atlántica	Teróf.-esc.	VII-IX	1-5 cm	RR	RR	EPE
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154. 1817		Subcosmopolita	Geóf.-riz.	VI-IX	2-20 cm	RR	RR	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. Br., Prodr. 1: 80, 244. 1810		Subcosmopolita	Geóf.-riz.	IV-VII	2-5 dm	R	R	
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz in Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1: 89. 1949		Holártica	Geóf.-riz.	V-VIII	5-25 cm	RR	RR	
<i>Elymus campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen, Lejeunia, n.s., 110: 57. 1983	<i>Elymus pungens</i> subsp. <i>campestris</i> (Godr. & Gren.) Melderis, Bot. J. Linn. Soc. 76: 380. 1978	Holártica	Hemic.-cesp	V-VII	4-12 dm	RR	RR	
<i>Elymus caninus</i> (L.) L., Fl. Suec., ed. 2: 39. 1755		Circummediterránea	Hemic.-cesp.	VI-VII	5-12 dm	R	R	
<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 380. 1978	<i>Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth & D.R. Dewey, Amer. J. Bot. 72: 772. 1985	Euroasiática	Geóf.-riz	V-VII	5-12 dm	R	R	
<i>Elymus obtusiflorus</i> (DC.) Conert in G.Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur., ed. 3, 1(3; 10): 787. 1997	<i>Thinopyrum obtusiflorum</i> (DC.) Banfi, Nat. Hist. Sci. 5(2): 60. 2018	Mediterránea-Atlántica	Geóf.-riz.	V-VII	1-20 dm	R	R	
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould in Madroño 9: 127. 1947		Subcosmopolita	Geóf.-riz.	V-VII	4-12 dm	M	M	

<i>Ephedra distachya</i> L., Sp. Pl.: 1040. 1753		Mediterránea-Iranoturaniana	Nanofan.	IV-VI	2-10 dm	R	R	
<i>Ephedra fragilis</i> Desf., Fl. Atlant. 2: 372. 1799		Circummediterránea	Nanofan.	IV-V	4-15 dm	R	R	
<i>Epilobium hirsutum</i> L., Sp. Pl.: 347. 1753		Subcosmopolita	Hemic.-esc.	V-X	4-16 dm	C	C	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., Spic. Fl. Lips.: 146 & 155. 1771		Paleotemplada	Hemic.-esc.	VI-IX	3-12 dm	M	M	
<i>Epipactis kleinii</i> M. B. Crespo & M. R. Lowe & Piera, Taxon 50: 854. 2001		Iberolevantina	Geóf.-riz.	V-VII	2-5 dm	R	M	
<i>Equisetum arvense</i> L., Sp. Pl.: 1061. 1753		Holártica	Geóf.-riz.	III-V	2-5 dm	R	R	
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., Fl. Atlant. 2: 398. 1799		Subcosmopolita	Geóf.-riz.	I-XII	2-20 dm	CC	CC	
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287. 1783		Holártica	Geóf.-riz.	II-IV	4-14 dm	RR	R	
<i>Eragrostis barrelieri</i> Davaeu in J. Bot. (Morot) 8: 289. 1894		Paleotropical	Teróf.esc	VII-IX	1-4 dm	R	R	
<i>Erianthus ravennae</i> (L.) P. Beauv., Ess. Agrostr.: 14. 1812	<i>Triplidium ravennae</i> (L.) H. Scholz, Willdenowia 36: 664. 2006	Mediterránea-Paleotropical	Hemic.-cesp.	VIII-X	1-4 m	M	M	
<i>Erica arborea</i> L., Sp. Pl.: 353. 1753		Mediterránea-Paleotropical	(Nano-) Mesofan.	II-V	1-4 m	R	M	
<i>Erica cinerea</i> L., Sp. Pl.: 352. 1753		Lateatlántica	Caméf.-sufr.	VII-X	2-6 dm	RR	RR	VI
<i>Erica erigena</i> R. Ross in Watsonia 7: 164. 1969		Mediterránea-Atlántica	Nanofan.	I-IV	5-18 dm	RR	R	
<i>Erica multiflora</i> L., Sp. Pl.: 355. 1753		Mediterránea W	Nanofan.	IX-IV	5-20 dm	CC	CC	
<i>Erica scoparia</i> L., Sp. Pl.: 353. 1753		Mediterránea W	Nanofan.	IV-VI	5-20 dm	R	M	
<i>Erigeron acris</i> L., Sp. Pl.: 863. 1753		Holártica	Hemic.-esc.	VII-X	1-5 dm	M	M	

<i>Erinacea anthyllis</i> Link, Handbuch 2: 156. 1831		Mediterránea W	Caméf.-pulv.	IV-VII	5-30 cm	M	M	
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., Trans. Linn. Soc. London 13: 102. 1821		Chino-japonesa	Mesofan.	X-II	2-5 m	R	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Erodium chium</i> (L.) Willd., Phytographia 1: 10. 1794		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	III-V	1-4 dm	M	M	
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415. 1789		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	2-7 dm	M	M	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414. 1789		Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-VII	1-6 dm	CC	CC	
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415. 1789		Circunmediterránea	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	II-VI	1-5 dm	C	C	
<i>Erodium pulverulentum</i> (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3: 632. 1800		Mediterránea S	Hemic.-bien.	III-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Erophila verna</i> subsp. <i>spathulata</i> (Láng) Vollm. in Vollmann, Fl. Bayern: 315. 1914	<i>Draba verna</i> var. <i>boerhaavii</i> H.C. Hall, Spec. Bot.: 149. 1821	Circunmediterránea	Teróf.-ros.	I-V	2-15 cm	C	M	
<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. in Ca- vanilles, Deser. Pl.: 426. 1802		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	II-V	2-6 dm	C	C	
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54 Beibl. 119: 56. 1916		Circunmediterránea	Hemic. (Teróf.-)esc.	III-VII	3-8 dm	CC	CC	
<i>Erucastrum virgatum</i> subsp. <i>brachycarpum</i> (Rouy) Gómez-Campo in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 68. 1983		Iberolevantina	Caméf.-suff.	IV-VI	4-14 dm	M	M	
<i>Eryngium campestre</i> L., Sp. Pl.: 233. 1753		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	VI-VIII	1-5 dm	CC	CC	

<i>Erysimum gomezcampoi</i> Polatschek in Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 82: 336. 1979	<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>gomez-campoi</i> (Polatschek) P.W. Ball, Bot. J. Linn. Soc. 103: 205. 1990	Iberolevantina	Hemic.-esc.		III-VI	2-6 dm	C	C	
<i>Erysimum incanum</i> subsp. <i>mairei</i> (Semmen & Mauricio) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 278. 1990	<i>Erysimum incanum</i> Kunze, Flora 29: 752. 1846 subsp. <i>incanum</i>	Mediterránea W	Teróf.-esc.		IV-VI	5-25 cm	M	M	
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh., Cat. Horti Camald., ed. 2: 20. 1832		Australiana	Macrofan.		IV-VII	5-15 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Euphorbia characias</i> L., Sp. Pl.: 463. 1753		Mediterránea W	Caméf.-sufr.		I-VI	5-14 dm	M	C	
<i>Euphorbia exigua</i> L., Sp. Pl.: 456. 1753		Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.		III-IX	4-20 cm	C	C	
<i>Euphorbia falcata</i> L., Sp. Pl.: 456. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.		III-IX	5-25 cm	C	C	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. in de Lamarck & de Candolle, Fl. Franç. 6: 364. 1815		Mediterránea W	Caméf.-sufr.		II-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., Sp. Pl.: 459. 1753		Cosmopolita	Teróf.-esc.		I-XII	1-3 dm	CC	CC	
<i>Euphorbia hirsuta</i> L., Amoen. Acad. 4: 483. 1759		Circummediterránea	Geóf.-riz.		II-X	3-8 dm	M	M	
<i>Euphorbia isatidifolia</i> Lam., Encycl. 2: 430. 1788		Mediterránea SW	Geóf.tub		III-V	1-4 dm	R	R	
<i>Euphorbia minuta</i> Loscos & J. Parado, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 96. 1863		Iberolevantina	Caméf.-sufr.		III-V	5-15 cm	M	M	
<i>Euphorbia nicaeensis</i> All., Fl. Pedem. 1: 285. 1785		Circummediterránea	Caméf.-sufr.		III-VII	2-5 dm	C	C	
<i>Euphorbia peplus</i> L., Sp. Pl.: 456. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.		I-XII	5-25 cm	CC	CC	

<i>Euphorbia vegetalis</i> L., Sp. Pl.: 458. 1753		Circummediterránea	Teróf. (Hemic.)-esc.	I-XII	2-5 dm	C	C	
<i>Euphorbia serrata</i> L., Sp. Pl.: 459. 1753		Mediterránea-Iranoturmiana	Geóf.-riz.	III-VI	2-5 dm	CC	C	
<i>Euphorbia sulcata</i> Lens ex Loisel., Fl. Gall., ed. 2, 1: 339. 1828		Mediterránea W	Teróf.-esc.	II-VI	5-15 cm	M	M	
<i>Euphorbia terracina</i> L., Sp. Pl. ed. 2: 654. 1762		Circummediterránea	Hemic.-esc.	II-IX	2-5 dm	C	C	
<i>Evax pygmaea</i> (L.) Brot., Fl. Lusit. 1: 363. 1804	<i>Filago pygmaea</i> L., Sp. Pl.: 927. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	II-V	2-5 cm	R	R	
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 6: 176. 1971		Centroasiática	Fan.-escand.	VI-X	1-5 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300. 1970		Holártica	Teróf.-esc.	V-VIII	2-8 dm	M	M	
<i>Ferula communis</i> subsp. <i>catalaunica</i> (C. Victoso) Sánchez-Cux. & M. Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236. 1998		Iberolevantina	Hemic.-esc.	VI-VII	1-3 m	M	R	
<i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>fenas</i> (Lag.) Arcang., Comp. Fl. Ital., ed. 2: 61. 1894	<i>Lolium interruptum</i> (Desf.) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi, Taxon 66: 713. 2017	Circummediterránea	Hemic.-cesp.	IV-VI	3-8 dm	M	M	
<i>Festuca capillifolia</i> Dufour in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 735. 1817		Mediterránea W	Hemic.-cesp.	V-VII	3-6 dm	M	M	
<i>Festuca durandoi</i> subsp. <i>capillifolia</i> (Willk.) Rivas Ponce & al. in Fontqueria 31: 238. 1991	<i>Patzkea durandoi</i> (Clauson) G.H. Loos, Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 1: 126. 2010	Iberolevantina	Geóf.-bulb.	V-VII	5-16 dm	RR	RR	
<i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 105. 1890		Mediterránea NW	Hemic.-cesp.	V-VII	2-4 dm	RR	R	

<i>Festuca gracilior</i> (Hack.) Mark- gr.-Dann. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 325. 1978	Iberolevantina	Hemic.-cesp.	V-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Festuca hystrix</i> Boiss., Elench. Pl. Nov.: 89. 1838	Mediterránea W	Hemic.-cesp.	V-VI	5-25 cm	M	M	
<i>Festuca paniculata</i> subsp. <i>pau</i> Ce- bolla & Rivas Ponce in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 87. 1990	Iberolevantina	Geóf.-tub.	V-VII	5-10 dm	RR	R	
<i>Festuca salzmannii</i> subsp. <i>peris-gis- bertii</i> R. Roselló, S. Cirujano, G. Stübing & P.P. Ferrer; Flora Montib- er. 89: 131. 2024	Iberolevantina	Teróf.-esc.	IV-VI	5-25 cm	RR	RR	
<i>Festuca salzmannii</i> (Boiss.) Boiss. ex Coss., Notes Pl. Crit.: 131. 1851 subsp. <i>salzmannii</i>	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-25 cm	M	M	
<i>Ficus carica</i> L., Sp. Pl.: 1059. 1753	Circunmediterránea	Mesofan.	V-VII	2-8 m	C	C	A (Cult.-Nat.)
<i>Filago arvensis</i> L., Sp. Pl.: [1230]. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	5-30 cm	R	R	
<i>Filago congesta</i> DC., Prodr. 6: 248. 1838	Mediterránea S	Teróf.-esc.	III-V	2-10 dm	M	M	
<i>Filago pyramidata</i> L., Sp. Pl.: 1199, [1230]. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-35 cm	CC	CC	
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, Methodus: 663. 1794	Eurosiberiana S	Hemic.-esc.	V-VII	2-6 dm	R	R	
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Bég., Ann. Mus. Civico Sto- riaNat. «Giacomo Doria», ser. 3, 3: 447. 1907	Circunmediterránea	Hemic.-esc.	VI-IX	5-20 dm	CC	CC	
<i>Fragaria vesca</i> L., Sp. Pl.: 494. 1753	Eurosiberiana	Hemic.-rept.	IV-VII	5-25 cm	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Frangula alnus</i> Mill., Gard. Diet., ed. 8: Frangula no. 1. 1768	Eurosiberiana	Mesofan.	V-VI	2-5 dm	RR	RR	
<i>Frankenia pulverulenta</i> L., Sp. Pl.: 332. 1753	Paleotemplada	Teróf.-rept.	III-VI	5-20 cm	RR	R	

<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, Enum. Pl. 1: 52. 1804		Mediterránea W	Macrofan.	III-V	5-25 m	R	M	
<i>Fraxinus ornus</i> L., Sp. Pl.: 1057. 1753		Mediterránea N	(Meso-) Macrofan.	III-V	2-10 m	R	M	
<i>Fritillaria lusitanica</i> Wikstr., Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1821: 352. 1821		Mediterránea W	Geóf.-bulb.	III-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Fumana × neverensis</i> Pérez Dacosta, Flora Montibet. 51: 127. 2012		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-X	2-7 dm	RR	RR	
<i>Fumana ericoides</i> subsp. <i>montana</i> (Pomel) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 338. 1937		Circummediterránea	Caméf.-sufr. (rept.)	III-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand. in Magnier, Fl. Select. Exsicc.: [in schedis] no. 201. 1883		Mediterránea SW	Caméf.-sufr.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Fumana hispidula</i> Loscos & J. Pardo in Willkomm, Ser. Inconf. Pl. Aragon: 12. 1863	<i>Fumana laevis</i> (Cav.) Pau, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 209. 1901	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-X	2-7 dm	R	R	
<i>Fumana laevipes</i> (L.) Spach in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 2, 6: 359. 1836		Circummediterránea	Caméf.-sufr. (rept.)	III-V	2-4 dm	C	M	
<i>Fumana laevis</i> (Cav.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 209. 1901		Circummediterránea	Caméf.-sufr. (rept.)	IV-VI	2-4 dm	M	M	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godt., Fl. France 1: 173. 1847		Mediterránea N	Caméf.-rept.	V-VIII	5-20 cm	R	R	
<i>Fumana scoparia</i> Pomel, Mat. Fl. Atl.: 10. 1860		Mediterránea	Caméf.-sufr.	IV-VI	2-4 dm	R	R	
<i>Fumana thymifolia</i> (L.) Webb, Iter Hispan.: 69. 1838		Circummediterránea	Caméf.-sufr.	III-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Fumaria capreolata</i> L., Sp. Pl.: 701. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	I-VI	2-10 dm	R	C	
<i>Fumaria densiflora</i> DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 113. 1813		Mediterránea-Atlántica	Térof.esc.	II-VI	1-4 dm	R	R	

<i>Fumaria officinalis</i> L., Sp. Pl.: 700. 1753 subsp. <i>officinalis</i>		Cosmopolita	Teróf.-esc.	III-VI	1-6 dm	C	C	
<i>Fumaria wirtgenii</i> (W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2: 1018. 1845)		Eurosiberiana W	Teróf.-esc.	III-IV	1-4 dm	R	R	
<i>Fumaria parviflora</i> Lam., Encycl. 2: 567. 1788		Paleotemplada	Teróf.-esc.	II-VII	1-3 dm	C	C	
<i>Fumaria pugsleyana</i> (Pugsley) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 222. 1984		Mediterránea SW	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	RR	RR	VI
<i>Fumaria rupestris</i> Boiss. & Reut., Pugill. Pl Afr. Bor. Hispan.: 4. 1852		Mediterránea SW	Teróf.-esc.	III-IV	2-10 dm	RR	RR	
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 358. 1809		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	RR	R	
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., Fl. Belg.: 140. 1827		Eurosiberiana	Geóf.-bulb.	II-III	1-10 cm	RR	R	
<i>Galactites tomentosus</i> Moench, Methodus: 558. 1794		Circunmediterránea	Hemic.-bien.	IV-VI	2-8 dm	C	C	
<i>Galium aparine</i> L., Sp. Pl.: 108. 1753		Paleotemplada	Teróf.-escand.	III-VI	4-15 dm	C	C	
<i>Galium estebanii</i> Sennen, Diagn. Nouv. 1928-35, 289. 1936		Mediterránea NW	Hemic.-esc.	V-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Galium lucidum</i> subsp. <i>frutescens</i> (Cav.) O. Bolos & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100. 1983		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VII	2-5 dm	M	M	
<i>Galium lucidum</i> All., Auct. Syn. Meth. Sturp. Hort. Regii Taur.: 5. 1773		Circunmediterránea	Caméf.-sufr.	IV-VII	2-7 dm	M	M	
<i>Galium maritimum</i> L., Mant. Pl.: 38. 1767		Mediterránea NW	Hemic.-esc.	V-VIII	2-8 dm	M	M	

<i>Galium minutilum</i> Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 182. 1846		Mediterránea W	Teróf.-esc.	II-V	5-15 cm	RR	RR	
<i>Galium paritense</i> L., Sp. Pl.: 108. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Galium setaceum</i> Lam. in Lam. & Poit., Encycl. 2: 584. 1788		Mediter- ránea-Iranotur- niana	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	R	R	
<i>Galium spurium</i> subsp. <i>aparinella</i> (Lange) Rivas Mart. & Castrov., Anales Inst. Bot. Cavanilles 34(2): 555. 1978	<i>Galium spurium</i> L., Sp. Pl.: 106. 1753 subsp. <i>spurium</i>	Paleotemplada	Teróf.-escand.	III-VI	1-8 dm	M	M	
<i>Galium tricornutum</i> Dandy in Watsonia 4: 47. 1957		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-5 dm	C	C	
<i>Galium valentinum</i> Lange in Vindensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 95. 1882		Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Galium verrucosum</i> Huds. in Philos. Trans. 56: 251. 1767		Circummediterránea	Teróf.-esc.	II-V	5-30 cm	M	M	
<i>Galium verum</i> L., Sp. Pl., ed. 1: 107. 1753		Paleotemplada	Hemic.-esc.	VI-VII	2-8 dm	R	R	
<i>Genista ×segurae</i> Uribe-Ech. & Urrutia, Estud. Mus. Cienc. Nat. Álava 7: 107. 1993		Iberolevantina	Caméf.-pulv.	IV-VI	2-4 dm	RR	RR	
<i>Genista cinerea</i> subsp. <i>ausetana</i> O. Bolós & Vigo in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., Secc. Bot. 38: 69. 1974	<i>Genista ausetana</i> (O. Bolós & Vigo) Talavera, Anales Jard. Bot. Madrid 57: 206. 1999	Iberolevantina	Nanofan.	IV-VI	3-8 dm	RR	R	
<i>Genista hispanica</i> L., Sp. Pl.: 711. 1753		Mediterránea NW	Nanofan.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Genista pumila</i> (Hervier) Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 181. 1919	<i>Genista versicolor</i> subsp. <i>pumila</i> (Debeaux & E. Rev. ex Hervier) Fern. Casas, Fontqueria 8: 31. 1985	Iberolevantina	Caméf.-pulv.	IV-VI	2-4 dm	R	R	

<i>Genista scorpius</i> (L.) DC. in Lam., Fl. Franç., ed. 2, 4: 498. 1805	Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	3-10 dm	C	C	
<i>Genista valentina</i> (Spreng.) Steud., Nomencl. Bot., ed. 2, 1: 671. 1840	Iberolevantina	Nanofan.	IV-VI	4-15 dm	M	M	
<i>Geranium columbinum</i> L., Sp. Pl.: 682. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Geranium dissectum</i> L., Cent. Pl. 1: 21. 1755	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-5 dm	M	M	
<i>Geranium lucidum</i> L., Sp. Pl.: 682. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Geranium molle</i> L., Sp. Pl.: 682. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Geranium purpureum</i> Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 272. 1786	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	
<i>Geranium robertianum</i> L., Sp. Pl.: 681. 1753	Subcosmopolita	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	IV-VII	2-6 dm	R	R	
<i>Geranium rotundifolium</i> L., Sp. Pl.: 683. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VII	1-3 dm	CC	CC	
<i>Geum sylvaticum</i> Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 319. 1788	Mediterránea NW	Hemic.-esc.	IV-VII	3-7 dm	R	M	
<i>Gladiolus communis</i> L., Sp. Pl.: 36. 1753	Circummediterránea	Geóf.-bulb.	III-VI	5-10 dm	M	M	
<i>Gladiolus italicus</i> Mill., Gard. Diet. ed. 8: 2. 1768	Mediterránea-Iranoturaniana	Geóf.-bulb.	IV-VI	5-10 dm	M	M	
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph, Fl. Jen. Pl.: 13. 1781	Holártica	Teróf.-esc.	III-IV	1-3 dm	R	R	
<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181. 1841	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	3-10 dm	R	M	
<i>Globularia alba</i> L., Sp. Pl.: 95. 1753	Circummediterránea	Caméf.-sufir.	X-IV	3-8 dm	C	C	

<i>Globularia linifolia</i> subsp. <i>hispanica</i> (Willk.) M.B. Crespo & Mateo, Flora Montibet. 45: 92. 2010	<i>Globularia bisnagari- ca</i> L., Sp. Pl.: 96. 1753	Mediterránea NW	Hemic.-esc.	IV-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Globularia repens</i> Lam., Fl. France, ed. 1, 2: 325. 1779		Mediterránea NW	Caméf.-rept.	V-VI	5-25 dm	R	R	
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L., Sp. Pl.: 742. 1753		Eurasiática	Geóf.riz	V-VII	4-10 dm	R	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Guillonea scabra</i> (Cav.) Coss., Notes Pl. Crit.: 110. 1851	<i>Thapsia scabra</i> (Cav.) Simonsen, Ronsied, Weitzel & Spalik, Bot. J. Linn. Soc. 174: 635. 2014	Iberolevantina	Hemic.-esc.	VII-IX	3-12 dm	M	M	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. in Aiton, Hortus Kew. 5: 191. 1813		Paleotemplada	Geóf.-tub.	V-VII	3-6 dm	RR	R	VI
<i>Gypsophila pilosa</i> Huds. in Philos. Trans. 56: 252. 1767		Iranoturana	Teróf.-esc.	V-VI	2-6 dm	RR	RR	
<i>Gypsophila struthium</i> L. in Loefl., Iter Hispan.: 73, 303. 1758 subsp. <i>struthium</i>		Iberolevantina	Caméf.-sufi.	VI-VIII	3-8 dm	R	R	
<i>Halimium umbellatum</i> subsp. <i>viscosum</i> (Willk.) O. Bolós & Vigo in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 79. 1974	<i>Cistus umbellatus</i> subsp. <i>viscosus</i> (Willk.) Demoly, Acta Bot. Gallica 153: 317. 2006	Mediterránea W	Nanofan.	IV-VI	3-7 dm	RR	R	PNC
<i>Haplophyllum linifolium</i> subsp. <i>rosmarinifolium</i> (Pers.) O. Bolós & Vigo in Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 82. 1974		Mediterránea W	Caméf.-sufi.	IV-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Hedera helix</i> L., Sp. Pl.: 202. 1753 subsp. <i>helix</i>		Mediterránea N	Fan.-escand.	VIII-XI	1-10 m	C	C	
<i>Hedera helix</i> subsp. <i>rhizomatifera</i> McAll., Plantsman 15: 118. 1993	<i>Hedera rhizomatifera</i> (McAll.) Jury, Willdenowia 34: 352. 2004	Iberolevantina	Fan.-escand.	VIII-XI	1-10 m	R	R	

<i>Hedynois rhagadioloides</i> subsp. <i>tubaeformis</i> (Ten.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(2): 807. 1931	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	
<i>Hedysarum boveanum</i> subsp. <i>europaeum</i> Guitt. & Kerguelen in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 81. 1991	Mediterránea W	Hemic.-esc. (Camef.-sufr.)	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Helianthemum</i> <i>×coronadoi</i> Mateo, Flora Montiber. 50: 31. 2012	Iberolevantina	Camef.-sufr.	II-VI	1-4 dm	RR	RR	
<i>Helianthemum</i> <i>×lineariforme</i> Pau in Anales Soc. Españ. Hist. Nat. 27: 420. 1899	Iberolevantina	Camef.-sufr.	II-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Helianthemum</i> <i>×mansanetianum</i> nothosub. <i>ayorense</i> Pérez Dacosta, Mateo & J.M. Aparicio in Flora Montiber. 50: 50. 2012	Iberolevantina	Camef.-sufr.	II-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Helianthemum</i> <i>×serranicum</i> Mateo, Flora Montiber. 50: 33. 2012	Iberolevantina	Camef.-sufr.	II-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Helianthemum angustatum</i> Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 218. 1874	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	IV-VI	5-25 cm	RR	RR	VI
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., Gard. Diet., ed. 8: Helianthemum no. 4. 1768	Mediterránea W	Camef.-sufr.	IV-VII	1-3 dm	M	M	
<i>Helianthemum asperum</i> Lag. ex Dunal in Candolle, Prodr. 1: 283. 1824 subsp. <i>asperum</i>	Iberolevantina	Camef.-sufr.	III-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Helianthemum asperum</i> subsp. <i>willkommii</i> Mateo & M.B. Crespo, Flora Montiber. 4: 15. 1996	Iberolevantina	Camef.-sufr.	III-VI	1-4 dm	R	M	

<i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>cavanillesianum</i> M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 191. 1964	<i>Helianthemum apenninum</i> subsp. <i>cavanillesianum</i> (M. Lainz) G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 50: 48. 1992	Iberolevantina	Camef.-sufr.		IV-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>stoechadifolium</i> (Brot.) M. B. Crespo & M. Fabregat in Itinera Geobot. 15: 702. 2002	<i>Helianthemum apenninum</i> subsp. <i>stoechadifolium</i> (Brot.) Samp., Bol. Soc. Brot., ser. 2, 7: 131. 1931	Iberolevantina	Camef.-sufr.		IV-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Helianthemum dichroum</i> Kunze in Flora 29: 633. 1846	<i>Helianthemum marifolium</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: no. 24. 1768 subsp. <i>marifolium</i>	Iberolevantina	Camef.-sufr.		II-VI	1-3 dm	R	M	
<i>Helianthemum hirtum</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: no. 14. 1768		Mediterránea W	Camef.-sufr.		III-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: no. 20. 1768		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.		IV-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Helianthemum marifolium</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: no. 24. 1768		Mediterránea W	Camef.-sufr.		II-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Helianthemum origanifolium</i> subsp. <i>glabratum</i> (Willk.) Guinea & Heywood in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 71: 133. 1954	<i>Helianthemum origanifolium</i> (Lam.) Pers., Syn. Pl. 2: 76. 1806 subsp. <i>origanifolium</i>	Iberolevantina	Camef.-sufr.		III-VI	15-40 cm	M	M	
<i>Helianthemum rotundifolium</i> Duval in DC., Prodr. 1: 277. 1824		Mediterránea W	Camef.-sufr.		IV-VII	1-3 dm	C	C	
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: no. 21. 1768		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.		IV-VI	4-30 cm	M	M	
<i>Helianthemum squamatum</i> (L.) Pers., Syn. Pl. 2: 78. 1806		Mediterránea SW	Camef.-sufr.		IV-VI	5-25 cm	R	R	

<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 129. 1802	Circummediterránea	Caméf.-suffr.	III-VI	2-5 dm	C	C	
<i>Helianthemum violaceum</i> (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 78. 1806	Mediterránea W	Caméf.-suffr.	II-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Helianthus annuus</i> L., Sp. Pl.: 904. 1753	Norteamericana	Teróf.-esc.	VII-IX	5-18 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Helianthus tuberosus</i> L., Sp. Pl.: 905. 1753	Norteamericana	Geóf.-tub.	VII-X	8-25 dm	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Helichrysum serotinum</i> (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327. 1840	Mediterránea W	Caméf.-suffr.	VII-X	3-8 dm	C	C	
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, Methodus: 575. 1794	Circummediterránea	Caméf.-suffr.	III-VI	1-4 dm	CC	C	
<i>Helictotrichon filifolium</i> (Lag.) Hen- rard in Blumea 3: 430. 1940	Mediterránea SW	Geóf.-riz.	IV-VII	6-14 dm	M	M	
<i>Heliotropium europaeum</i> L., Sp. Pl.: 130. 1753	Mediter- ránea-Iranotura- niana	Ter.-esc.	VI-IX	1-4 dm	M	M	
<i>Helleborus foetidus</i> L., Sp. Pl.: 558. 1753	Euroiberiana SW	Caméf.-suffr.	I-IV	3-7 dm	RR	R	
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb., Spic. Fl. Lips.: 39. 1771	Holártica	Hemic.-ros.	I-V	1-3 dm	RR	R	
<i>Herniaria cinerea</i> DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 5: 375. 1815	Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	III-VI	3-18 cm	C	C	
<i>Herniaria fruticosa</i> L., Cent. Pl. I: 1: 8. 1755	Iberolevantina	Caméf.-frut.	IV-VI	5-15 cm	R	R	
<i>Herniaria glabra</i> L., Sp. Pl.: 218. 1753	Paleotemplada	Hemic.-bien. (esc.)	V-VII	5-20 cm	M	M	
<i>Herniaria scabrida</i> Boiss., Elench. Pl. Nov.: 42. 1838	Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VIII	1-4 dm	M	M	
<i>Hibiscus trionum</i> L., Sp. Pl.: 697. 1753	Paleotropical	Teróf.-esc.	VII-IX	2-6 dm	RR	R	A (Cult.-Nat.)

<i>Hieracium amplexicaule</i> L., Sp. Pl.: 803. 1753		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	VII-IX	2-5 dm	R	R	
<i>Hieracium avi-chodesii</i> Mateo, Flora Montiber. 60: 32. 2015		Iberolevantina	Hemic.-esc.	VII-IX	2-5 dm	RR	RR	
<i>Hieracium bourgaei</i> Boiss., Diagn. Pl. Orient., ser. 2: 3: 102. 1856		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	15-40 cm	RR	R	
<i>Hieracium compositum</i> Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 476. 1813		Mediterránea NW	Hemic.-esc.	VIII-IX	1-4 dm	RR	RR	
<i>Hieracium lawsonii</i> Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 36. 1779		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	VI-VII	5-30 cm	RR	RR	
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord., Cat. Graines Jard. Dijon 1848: 22. 1848		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	V-VII	2-6 dm	M	M	
<i>Hieracium lopesudiae</i> Mateo, Flora Montiber. 38: 48. 2008	<i>Hieracium laniferum</i> subsp. <i>texedense</i> (Pau) Blanca, Cueto & Quesada, Saussurea 19: 26. 1989	Iberolevantina	Hemic.-esc.	V-VII	5-30 cm	RR	RR	
<i>Hieracium loscosianum</i> Scheele in Linnaea 32: 668. 1864		Iberolevantina	Hemic.-esc.	V-VII	5-35 cm	RR	R	
<i>Hieracium lychitis</i> Scheele in Linnaea 31: 658. 1863	<i>Hieracium nobile</i> subsp. <i>lychnitis</i> (Scheele) Mateo, Egido & Gómiz, Flora Montiber. 83: 130. 2022	Eurosiberiana	Hemic.-esc.	V-VII	2-4 dm	RR	RR	
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch in Flora 11, Ergänzungsbl. 1: 65. 1828		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	V-VII	2-4 dm	R	R	
<i>Hieracium spathulatum</i> Scheele in Linnaea 32: 666. 1864	<i>Hieracium laniferum</i> subsp. <i>spathulatum</i> (Scheele) Zahn, H.G.A. Engler (ed.), Pflanzenr., IV, 280: 145. 1921	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VII	5-20 cm	RR	RR	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694. 1826		Mediterránea-Atlántica	Geóf.-tub.	V-VII	2-6 dm	RR	RR	VU

<i>Hippocrepis biflora</i> Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 73. 1815		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-V	5-20 cm	R	R	
<i>Hippocrepis bourgaei</i> (Nyman) Her- vier in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 17: 37. 1907	<i>Hippocrepis scabra</i> DC., Prodr. 2: 312. 1825	Iberolevantina	Caméf.sufr.	II-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd. in Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neu- esten Entdeck. Gesammten Naturk. 2: 173. 1808		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	
<i>Hippocrepis commutata</i> Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274. 1903		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	II-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Hippocrepis comosa</i> L., Sp. Pl.: 744. 1753		Eurosiberiana	Caméf.-sufr.	V-VII	5-35 cm	R	R	
<i>Hippocrepis frutescens</i> Semmen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 118. 1928		Mediterránea W	Caméf.-sufr.	II-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Hippocrepis squamata</i> (Cav.) Coss., Notes Pl. Crit.: 105. 1851		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	III-VI	5-20 cm	R	R	
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss. in Lagreze-Fossat, Fl. Tam Garonne: 19. 1847		Mediterránea-Iranotura- niana	Teróf. (Hemic.)- esc.	IV-VII	2-6 dm	C	C	
<i>Holcus lanatus</i> L., Sp. Pl.: 1048. 1753		Holártica	Hemic.-cesp.	V-VII	3-8 dm	M	M	
<i>Holosteum umbellatum</i> L., Sp. Pl.: 88. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-V	5-20 cm	M	M	
<i>Hordeum marinum</i> Huds., Fl. Angl., ed. 2. 1: 57. 1778		Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-VII	5-30 cm	R	R	
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 805. 1882		Mediterránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	III-VI	1-5 dm	CC	CC	
<i>Hordeum vulgare</i> L., Sp. Pl.: 84. 1753		Paleotropical	Teróf.-esc.	VI-VII	5-15 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)

<i>Hornathophylla lapeyrouseana</i> subsp. <i>toriuosa</i> (Willk.) M.B. Crespo & Mateo, Flora Montiber. 45: 93. 2010	<i>Hornathophylla lapeyrouseana</i> (Jord.) P. Kúpfér, Boissiera 23: 213. 1974	Iberolevantina	Caméf.-sufir.	IV-VI	5-25 cm	M	M	
<i>Hornathophylla spinosa</i> (L.) P. Kúpfér in Boissiera 23: 208. 1974		Mediterránea W	Caméf.-sufir.	IV-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rehb. in Reichenbach, Deutschl. Fl. 1: 33. 1837		Paleotemplada	Teróf.-esc.	II-V	3-15 cm	C	C	
<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. ex Schinz & Thell. in Vierteljahrschr. Naturf. Ges. Zürich 66: 285. 1921	<i>Hornungia procumbens</i> (L.) Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 480. 1925	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	I-V	5-25 cm	R	M	
<i>Hyoscyamus albus</i> L., Sp. Pl.: 180. 1753		Circummediterránea	Hemic.-esc. (Caméf.-sufir.)	IV-IX	2-5 dm	C	C	
<i>Hyoseris scabra</i> L., Sp. Pl.: 809. 1753		Circummediterránea	Teróf.-ros.	III-V	3-15 cm	M	M	
<i>Hyarrhenia hirta</i> (L.) Stapf in D. Oliver & auct. suc. (eds.), Fl. Trop. Afr. 9: 315. 1919		Mediterránea-Paleotropical	Hemic.-cesp.	I-XII	5-15 dm	C	C	
<i>Hyarrhenia pubescens</i> (Andersson) Chiov., Pl. Nov. Aethiop.: 29. 1928	<i>Hyarrhenia hirta</i> (L.) Stapf, D. Oliver & auct. suc. (eds.), Fl. Trop. Afr. 9: 315. 1919	Mediterránea-Paleotropical	Hemic.-cesp.	I-XII	5-15 dm	C	C	
<i>Hypecoum pendulum</i> L., Sp. Pl.: 124. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Hypecoum procumbens</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Benth.) Bonnier & Laves, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 13. 1894	<i>Hypecoum imberbe</i> Sm., J. Sibthorp & J.E. Smith, Fl. Graec. Prodr. 1: 107. 1806	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Hypericum caprifolium</i> Boiss., Elench. Pl. Nov.: 26. 1838		Iberolevantina	Hemic.-esc.	V-VII	3-8 dm	R	R	
<i>Hypericum ericoides</i> L., Sp. Pl.: 785. 1753		Mediterránea SW	Caméf.-sufir.	VI-VIII	5-30 cm	M	M	

<i>Hypericum montanum</i> L., Fl. Succ., ed. 2: 266. 1755	Paleotemplada	Hemic.-esc.	VI-VII	3-7 dm	R	R	
<i>Hypericum perforatum</i> L., Sp. Pl.: 785. 1753	Paleotemplada	Hemic.-esc.	V-VIII	3-8 dm	C	C	
<i>Hypericum tomentosum</i> L., Sp. Pl.: 786. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-VIII	2-5 dm	M	M	
<i>Hypochoeris glabra</i> L., Sp. Pl.: 811. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-V	5-30 cm	M	M	
<i>Hypochoeris radicata</i> L., Sp. Pl.: 811. 1753	Paleotemplada	Hemic.-ros.	IV-IX	2-6 dm	C	C	
<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>canescens</i> (DC.) Nymán, Consp. Fl. Eur.: 587. 1881	Mediterránea W	Caméf.-sufi.	VII-X	2-5 dm	R	R	
<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>lagascana</i> (DC.) Mateo & Figuerola, Fl. Analit. Valencia: 369. 1987	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	4-15 cm	RR	R	
<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>lagascana</i> (DC.) Mateo & Figuerola, Fl. Analit. Valencia: 369. 1987	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	4-15 cm	RR	R	
<i>Iberis ciliata</i> subsp. <i>vinetorum</i> (Pau) Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430. 1995	Iberolevantina	Hemic.-esc. (bidental)	IV-VI	15-30 cm	RR	R	
<i>Iberis saxatilis</i> subsp. <i>cinerea</i> (Poir.) Font Quer in Font Quer, Fl. Hispan. Herb. Norm.: no. 135. 1946	Iberolevantina	Caméf.-sufi.	III-VI	1-3 dm	RR	R	
<i>Iberis saxatilis</i> subsp. <i>valentina</i> Mateo & Figuerola in Mateo & Figuerola, Fl. Analit. Prov. Valencia: 370. 1987	Iberolevantina	Caméf.-sufi.	II-V	2-4 dm	RR	R	
<i>Ilex aquifolium</i> L., Sp. Pl.: 125. 1753	Euroiberiana	Mesofan.	IV-VI	2-8 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f. in Bot. Mag.: tab. 7878. 1903	Centroasiática	Teróf.-esc.	VI-X	4-10 dm	RR	RR	A (Cult.-Nat.)

<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch., Nomencl. Bot., ed. 3: 10. 1797	<i>Pentanema squarrosum</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort., Phytotaxa 395: 18. 2019	Mediterránea-Paleotropical	Geóf.-riz.	VI-IX	4-9 dm	M	M	
<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC., Prodr. 5: 464. 1836		Eurosiberiana S	Hemic.-bien.	VII-IX	4-12 dm	M	M	
<i>Inula montana</i> L., Sp. Pl.: 884. 1753	<i>Pentanema montanum</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort., Taxon 67: 159. 2018	Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	1-3 dm	M	M	
<i>Inula salicina</i> L., Sp. Pl.: 882. 1753	<i>Pentanema salicinum</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort., Taxon 67: 159. 2018	Eurosiberiana	Hemic.-esc.	VI-VII	2-6 dm	R	R	
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27. 1787		Neotropical	Hemic.-escand.	VI-VII	4-10 dm	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Iris</i> × <i>germanica</i> L., Sp. Pl. 1: 38. 1753		Desconocida	Geóf.-riz.	I-V	3-8 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Iris lutescens</i> Lam., Encycl. 3: 297. 1789		Mediterránea W	Geóf.-riz.	IV-VI	5-30 cm	M	M	
<i>Isoetes longissima</i> Bory, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165. 1844	<i>Isoetes velata</i> A. Braun in Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 37, fig. 1. 1849	Mediterránea W	Hidrof.-rad.	V-VII	5-20 cm	RR	RR	EPE
<i>Isolepis cernua</i> (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106. 1825		Subcosmopolita	Teróf.-cesp.	V-IX	4-15 cm	M	M	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br., Prodr.: 222. 1810		Subcosmopolita	Teróf.-cesp.	VI-VIII	4-15 cm	R	R	

<i>Jasione foliosa</i> Cav., Icom. 2: 38. 1793		Iberolevantina	Hemic.-ros.	VII-IX	4-15 cm	R	R	
<i>Jasione montana</i> L., Sp. Pl.: 928. 1753		Paleotemplada	Teróf.(Hemic.)-esc.	V-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Jasione sessiliflora</i> Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21. 1842 subsp. <i>sessiliflora</i>		Iberoatlántica	Hemic.-esc.	VI-VIII	5-30 cm	RR	RR	VI
<i>Chrysosaminum fruticans</i> (L.) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 1(1): 4. 2014		Mediterránea W	Nanofan.	III-VI	3-15 dm	M	M	
<i>Chiladenus glutinosus</i> (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 17: 93. 1869		Mediterránea W	Hemic.-esc.	VII-IX	1-4 dm	C	C	
<i>Jasione glutinosa</i> (L.) DC., Prodr. 5: 476. 1836		Mediterránea NW	Geóf.-tub.	VII-X	1-4 dm	M	M	
<i>Juglans tuberosa</i> (L.) DC., Prodr. 5: 476. 1836		Mediterránea E	Macrofan.	IV-VI	5-20 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Juglans nigra</i> L., Sp. Pl.: 997. 1753		Mediterránea E	Macrofan.	IV-VI	5-20 m	C	C	A (Cult.-Nat.)
<i>Juglans regia</i> L., Sp. Pl.: 997. 1753		Mediterránea-Atlántica	Hemic.-cesp.	V-VII	5-15 dm	M	M	
<i>Juncus acutus</i> L., Sp. Pl.: 325. 1753		Holártica	Geóf.-riz.	V-VIII	1-4 dm	C	C	
<i>Juncus articulatus</i> L., Sp. Pl.: 327. 1753		Paleotemplada	Teróf.-cesp.	IV-VII	5-30 cm	M	C	
<i>Juncus bufonius</i> L., Sp. Pl.: 328. 1753		Subcosmopolita	Térof.esc.	IV-VII	5-25 cm	RR	R	
<i>Juncus hybridus</i> Brot., Fl. Lusit. 1: 513. 1804		Paleotemplada	Geóf.-riz. (Hemic.-cesp.)	V-VIII	3-12 dm	C	C	
<i>Juncus inflexus</i> L., Sp. Pl.: 326. 1753		Paleotemplada	Geóf.-riz.	VII-IX	4-15 dm	M	M	
<i>Juncus maritimus</i> Lam., Encycl. 3: 264. 1789		Paleotemplada	Geóf.-riz.					

<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2: 178. 1800		Mediterránea-Atlántica	Teróf.-cesp.	IV-VI	3-10 cm	RR	RR	VI
<i>Juncus sphaerocarpos</i> Nees, Flora I: 521. 1818		Paleotemplada	Teróf.-cesp.	IV-VIII	5-20 dm	R	R	
<i>Juncus striatus</i> Schousb. ex E. Mey., Syn. Junc.: 27. 1822		Circunmediterránea	Geóf.-riz.	VI-IX	5-15 dm	R	R	
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, Baier. Fl. I: 616. 1789		Paleotemplada	Geóf.-riz.	VI-IX	5-15 dm	M	M	
<i>Juncus subulatus</i> Forsk., Fl. Aegypt.-Arab.: 75. 1775		Circunmediterránea	Geóf.-riz.	V-VII	4-12 dm	R	R	
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L. f., Suppl. Pl.: 208. 1781		Paleotemplada	Teróf.-cesp.	IV-VIII	5-30 cm	R	R	
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>hemisphaerica</i> (J. Presl & C. Presl) Parl., Fl. Ital. 4: 83. 1868		Circunmediterránea	Nanofan.	IV-VI	5-25 dm	RR	M	
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>badia</i> (H. Gay) Debeaux, Fl. Kabylie: 411. 1894		Mediterránea W	Macrofan.	III-V	3-12 m	R	R	
<i>Juniperus oxycedrus</i> L., Sp. Pl.: 1038. 1753 subsp. <i>oxycedrus</i>		Circunmediterránea	Meso (Nano) fan.	III-V	5-30 dm	CC	CC	
<i>Juniperus phoenicea</i> L., Sp. Pl.: 1040. 1753		Circunmediterránea	Nanofan.	IV-V	3-25 dm	C	C	
<i>Juniperus thurifera</i> L., Sp. Pl.: 1039. 1753		Mediterránea W	Macrofan.	IV-VI	4-15 m	RR	R	
<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC., Prodr. 6: 677. 1838		Mediterránea W	Hemic.-ros.	V-VII	3-7 cm	M	M	
<i>Jurinea pinnata</i> (Pers.) DC., Prodr. 6: 676. 1838		Mediterránea W	Caméf.-sufit.	VI-VII	5-15 cm	RR	RR	
<i>Kickxia commutata</i> (Rehb.) R. M. Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 492. 1897		Circunmediterránea	Hemic.-rept.	V-VII	2-7 dm	RR	RR	

<i>Kickxia elatine</i> subsp. <i>crinita</i> (Mabille) Greuter in Boissiera 13: 108. 1967	<i>Kickxia elatine</i> subsp. <i>sieberi</i> (Rehb.) Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(2): 144. 1929	Mediterránea	Teróf.-rept.	V-VII	2-6 dm	R	R	
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35. 1827 subsp. <i>elatine</i>		Circummediterránea	Teróf.-rept.	V-X	2-6 dm	R	M	
<i>Kickxia spuria</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Brot.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74. 1971		Paleotemplada	Teróf.-rept.	VI-X	2-5 dm	R	M	
<i>Klasea flavescens</i> subsp. <i>leucantha</i> (Cav.) Cantó & Rivas Mart. in Lazarroa 5: 319. 1984		Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VII	2-4 dm	M	M	
<i>Klasea nudicaulis</i> (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2 17: 98. 1869		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	1-4 dm	R	M	
<i>Klasea pinnatifida</i> (Cav.) Talavera in Valdés & al., Fl. Vasc. Andalucía Occ. 3: 164. 1987		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Knautia subscaposa</i> Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 53. 1852		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	5-20 cm	M	M	
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin in Alpina 3: 47. 1808		Mediterránea C-W	Hemic.-cesp.	IV-VI	1-5 dm	CC	CC	
<i>Lactuca saligna</i> L., Sp. Pl.: 796. 1753		Mediterránea-Iranoturaniana	Hemic.-bien. (esc.)	V-IX	4-8 dm	M	M	
<i>Lactuca serriola</i> L., Cent. Pl. 2: 29. 1756		Mediterránea-Iranoturaniana	Hemic.-bien. (esc.)	VI-IX	5-15 dm	M	M	
<i>Lactuca tenerrima</i> Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 321. 1788		Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-IX	2-4 dm	M	M	
<i>Lactuca viminea</i> subsp. <i>ramosissima</i> (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 424. 1882		Mediterránea-Iranoturaniana	Hemic.-bien.	VI-IX	2-8 dm	C	C	

<i>Lactuca virosa</i> L., Sp. Pl.: 795. 1753		Paleotemplada	Hemic.-bien. (esc.)	VI-IX	5-14 dm	M	M	
<i>Lamium amplexicaule</i> L., Sp. Pl.: 579. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	II-X	8-25 cm	CC	CC	
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev in Bjull. Moskovsk. Obsč. Isp. Prir., Otd. Biol. 98(6): 105. 1994	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B.L. Burtt, Bot. J. Linn. Soc. 82: 206. 1981	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	V-IX	1-4 dm	M	M	
<i>Lappula barbata</i> subsp. <i>aragonense</i> (E. Rev. & Freyn) O. Bolós & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 203. 1995	<i>Lappula barbata</i> (M. Bieb.) Gürke, H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 107. 1894	Mediterránea-Iranoturamiana	Teróf.-esc.	V-VII	2-5 dm	R	R	
<i>Lappula patula</i> (Lehm.) Gürke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 107. 1894		Mediterránea-Iranoturamiana	Ter.-esc.	V-VII	1-5 dm	R	R	
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., Fl. Belg.: 40. 1827		Paleotemplada	Ter.-esc.	V-VII	1-5 dm	R	R	
<i>Lathyrus aphaca</i> L. Sp. Pl.: 729. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Lathyrus cicera</i> L., Sp. Pl.: 730. 1753		Mediterránea-Iranoturamiana	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Lathyrus chymenum</i> L., Sp. Pl.: 732. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-V	3-8 dm	M	M	
<i>Lathyrus filiformis</i> (Lam.) J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 4: 8: 315. 1857		Mediterránea N	Hemic.-esc.	IV-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L., Sp. Pl.: 732. 1753		Eurosiberiana	Teróf.-esc.	V-VII	3-8 dm	R	R	
<i>Lathyrus latifolius</i> L., Sp. Pl.: 733. 1753		Eurosiberiana S	Hemic.-escand.	IV-VII	5-20 dm	M	M	

<i>Lathyrus pulcher</i> J. Gay, Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 8: 311. 1857	<i>Lathyrus tremolianus</i> Pau, Not. Bot. Fl. Es- pañ. 4: 29. 1891	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	3-12 dm	M	M	
<i>Lathyrus saxatilis</i> (Vent.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 330. 1852		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	8-25 cm	M	M	
<i>Launaea fragilis</i> (Asso) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 16: 68. 1917		Mediterránea S	Caméf.-sulf.	IV-X	1-4 dm	M	M	
<i>Launaea pumila</i> (Cav.) Kuntze, Re- vis. Gen. Pl. 1: 351. 1891		Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Laurus nobilis</i> L., Sp. Pl.: 369. 1753		Circummediterránea	Mesofan.	III-IV	2-6 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (DC.) Guinea, Bot. J. Linn. Soc. 65: 263. 1972		Mediterránea N	Caméf.-frut.	IV-VI	3-8 dm	RR	R	
<i>Lavandula latifolia</i> Medik., Bot. Beob. 1783: 135. 1784		Mediterránea W	Caméf.-frut.	VII-IX	3-8 dm	M	M	
<i>Lavandula pedunculata</i> (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70. 1801		Mediterránea W	Caméf.-frut.	IV-VII	2-8 dm	R	R	
<i>Lavatera arborea</i> L., Sp. Pl.: 690. 1753	<i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel., Hist. Nat. Iles Canaries 3(2; 1): 30. 1836	Circummediterránea	Nanofan.	IV-IX	1-3 m	M	M	
<i>Lavatera cretica</i> L., Sp. Pl.: 691. 1753	<i>Malva multiflora</i> (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 146: 230. 2005	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	2-5 dm	C	C	
<i>Lavatera maritima</i> Gouan, III. Ob- serv. Bot.: 46. 1773	<i>Malva subovata</i> (DC.) Molero & J.M. Monts., Fontqueria 55: 288. 2005	Mediterránea W	Nanofan.	II-VI	4-12 dm	R	M	
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2: 47. 1800		Mediterránea-Iranoturaniana	Hemic.-esc.	V-VII	1-6 dm	M	M	

<i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans, Cat. Pl. Vasc. Corse: 100. 1985	<i>Legousia falcata</i> (Ten.) Fritsch ex Janch., Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien, n.s., 5: 100. 1907	Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	1-6 dm	R	R	
<i>Lemna gibba</i> L., Sp. Pl.: 970. 1753		Subcosmopolita	Hidrof.-nat.	I-XII	3-10 mm	M	M	
<i>Lemna minor</i> L., Sp. Pl.: 970. 1753		Subcosmopolita	Hidrof.-nat.	II-XII	2-8 mm	M	M	
<i>Leontodon carpetanus</i> Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 2 3: 96. 1861	<i>Scorzoneroidees carpetana</i> (Lange) Greuter, Willdenowia 36: 690. 2006	Mediterránea W	Hemic.-ros.	VII-X	1-3 dm	R	R	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., Fl. Franç. 2: 115. 1779		Paleotemplada	Hemic.-esc.	V-VIII	5-25 cm	M	M	
<i>Lepidium draba</i> L., Sp. Pl.: 645. 1753		Mediterránea-Iranoturaniana	Geóf.-riz.	III-VI	2-6 dm	C	C	
<i>Lepidium graminifolium</i> L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1127. 1759		Mediterránea-Iranoturaniana	Hemic.-esc.	III-IX	2-4 dm	M	M	
<i>Lepidium hirtum</i> subsp. <i>psilopterum</i> (Willk.) M.B. Crespo & Mateo, Flora Montibet. 58: 28. 2014		Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	5-35 cm	M	M	
<i>Leucanthemopsis pallida</i> subsp. <i>virescens</i> (Pau) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 183. 1975		Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	5-15 cm	R	R	
<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (Dufour) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 48. 1902		Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	3-6 dm	M	M	
<i>Leucanthemum maestracense</i> Vogt & F. H. Hellw. in Ruizia 10: 172. 1991		Iberolevantina	Hemic.-esc.	V-VII	3-6 dm	R	R	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2 [W.T. Aiton]. 1810		Chino-japonesa	Macrofan.	VI-VIII	3-10 m	M	M	A (Cult.-Nat.)

<i>Ligustrum vulgare</i> L., Sp. Pl.: 7. 1753	Euroiberiana	Meso (Nano)-fán.	V-VII	3-15 dm	R	R	
<i>Lilium candidum</i> L., Sp. Pl.: 302. 1753	Iranoturániana	Geóf.-bulb.	V-VI	7-12 dm	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Limniris pseudacorus</i> (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636. 1866	Paleotemplada	Geóf.-riz.	III-VI	5-12 dm	R	M	
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80. 1799	Mediterránea	Geóf.-riz.	IV-VII	2-6 dm	M	M	
<i>Limonium cofrentanum</i> Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 314. 1989	Iberolevantina	Caméf.-sulfr.	VII-IX	2-4 dm	RR	RR	
<i>Limonium echinoides</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: no. 11. 1768	Circunmediterránea	Teróf.-ros.	V-VII	5-20 cm	M	M	
<i>Limonium lobatum</i> (L. f.) Chaz., Dict. Jard., Suppl. 2: 35. 1790	Mediterránea S-Sa-haro-Síndica	Teróf.-esc.	II-IV	1-2 dm	RR	RR	
<i>Limonium sucronicum</i> Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 321. 1989	Iberolevantina	Caméf.-sulfr. (Hemic.-esc.)	VII-IX	2-4 dm	RR	RR	
<i>Linaria aeruginea</i> (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21. 1803. 1803	Iberolevantina	Hemic.-esc.	V-IX	5-30 cm	R	M	
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 45. 1798. 1798	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	5-25 cm	M	M	
<i>Linaria badalii</i> Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 33. 1887	Iberolevantina	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	RR	R	
<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (Lange) De la Torre, Alcaraz & M.B. Crespo, Lazaroa 16: 155. 1996	Iberolevantina	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	III-VI	5-20 cm	RR	RR	VI
<i>Linaria hirta</i> (L.) Moench, Suppl. Meth.: 170. 1802	Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Linaria oblongifolia</i> subsp. <i>aragonensis</i> (Lange) D.A. Sutton, Revis. tribe Antirrhineae: 391. 1988	Iberolevantina	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	R	R	

<i>Linaria oligantha</i> subsp. <i>valentina</i> D.A. Sutton, Revis. tribe Antirrhineae: 412. 1988	Iberolevantina	Teróf.-esc.	III-V	5-20 cm	R	R	VI
<i>Linaria repens</i> subsp. <i>blanca</i> (Pau) Fer Casas & Muñoz Garm. in Fern. Casas, Exsicc. Quaed. Nobis Distr. II: 8. 1979	Iberolevantina	Hemic.-esc.	VI-IX	3-12 dm	M	M	
<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC. in Lam. & DC., Fl. France, ed. 3, 3: 588. 1805. 1805	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Linum austriacum</i> subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 125. 1878	Eurosiberiana	Hemic.-esc.	IV-VII	3-6 dm	RR	R	
<i>Linum bienne</i> Mill., Gard. Dict., ed. 8; Linum no. 8. 1768	Circummediterránea	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	IV-VII	1-3 dm	M	M	
<i>Linum catharticum</i> L., Sp. Pl.: 281. 1753	Eurosiberiana	Teróf. (Hemic.)- esc.	V-VII	1-3 dm	R	R	
<i>Linum maritimum</i> L., Sp. Pl.: 280. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-IX	3-10 cm	M	M	
<i>Linum narbonense</i> L., Sp. Pl.: 278. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VII	3-6 dm	C	C	
<i>Linum strictum</i> L., Sp. Pl.: 279. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Linum suffruticosum</i> L., Sp. Pl.: 279. 1753 subsp. <i>suffruticosum</i>	Mediterránea W	Caméf.-frut.	III-VI	3-10 dm	C	C	
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>diffrens</i> (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart., Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 185. 1969	Iberolevantina	Caméf.-frut.	III-VI	3-10 dm	M	M	
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>loeflingii</i> Mart. Labarga & Muñoz Garm., Fl. Iber. 9: 508 2015	Iberolevantina	Caméf.-frut.	III-VI	3-10 dm	R	M	

<i>Linum usitatissimum</i> L., Sp. Pl.: 277. 1753		Mediterránea E	Teróf.esc	IV-VI	3-10 dm	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br. in Aiton, Hortus Kew. 5: 201. 1813	<i>Neottia ovata</i> (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl.: 331. 1820	Paleotemplada	Geóf.-riz.	V-VII	3-6 dm	RR	RR	PNC
<i>Lithodora fruticosa</i> (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 531. 1846		Mediterránea W	Caméf.-frut.	II-VI	1-5 dm	M	M	
<i>Lithospermum officinale</i> L., Sp. Pl.: 132. 1753		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	V-VI	3-9 dm	R	R	
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544. 1864		Eurosiberiana	Hidróf.-rad.	V-VII	3-12 cm	RR	RR	EPE
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 162. 1815		Circunmediterránea	Hemic.-esc. (Geóf.-riz.)	IX-VI	1-4 dm	R	C	
<i>Logfia gallica</i> (L.) Dumort., Florula Belg.: 68. 1827		Mediterránea-Iranoturamiana	Teróf.-esc.	IV-VII	5-20 cm	M	M	
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., Flora Belg.: 68. 1827		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	4-18 cm	R	R	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam., Fl. Franç. 3: 621. 1778		Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-VI	3-10 dm	R	R	
<i>Lolium perenne</i> L., Sp. Pl.: 83. 1753		Holártica	Hemic.-cesp.	III-X	1-4 dm	M	M	
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin. Agrost. Helv. 1: 334. 1811		Paleotropical	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Lomelosia divaricata</i> (Jacq.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 74. 1985		Mediterránea	Teróf.esc	IV-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Lomelosia simplex</i> (Desf.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95. 1838		Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VII	1-4 dm	C	M	
<i>Lomelosia stellata</i> (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95. 1838		Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VII	1-5 dm	C	C	
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, Viagg. Montaniata 1: 113. 1795		Circunmediterránea	Fan.-escand.	V-VII	1-2'5 m	R	M	

<i>Lonicera implexa</i> Aiton, Hort. Kew. 1: 231. 1789		Circummediterránea	Fan.-escand.	IV-VI	0'5-2'5 m	C	C	
<i>Lonicera perichyenum</i> subsp. <i>hispanica</i> (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 322. 1879		Mediterránea W	Fan.-escand.	VI-VIII	1-4 m	RR	R	
<i>Lonicera pyrenaica</i> L., Sp. Pl.: 174. 1753		Mediterránea W	Nanofan.	VI-VII	2-10 dm	RR	R	VI
<i>Lonicera splendida</i> Boiss., Elench. Pl. Nov.: 54. 1838		Iberolevantina	Fan.-escand.	VI-VII	5-20 dm	R	R	VI
<i>Lonicera xylosteum</i> L., Sp. Pl.: 174. 1753		Eurosiberiana	Nanofan.	VI-VII	1-3 m	RR	RR	
<i>Lonicera corniculatus</i> L., Sp. Pl.: 775 1753		Holártica	Hemic.-esc.	V-X	2-6 dm	C	C	
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i> (Timb.-Lagr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 183. 1878		Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VII	8-20 cm	M	M	
<i>Lunaria annua</i> L., Sp. Pl.: 653. 1753		Mediterránea SO	Hemic.-esc.	III-VI	3-8 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Lycopus europaeus</i> L., Sp. Pl.: 21. 1753		Paleotemplada	Hemic.-esc.	VII-IX	3-10 dm	M	M	
<i>Lygeum spartum</i> L., Gen. Pl., ed. 5: 522. 1754		Mediterránea SW	Geóf.-riz.	IV-VI	2-7 dm	R	M	
<i>Lysimachia ephemerum</i> L., Sp. Pl.: 146. 1753	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby, A.P. de Candolle, Prodr. 8: 61. 1844	Mediterránea NW	Hemic.-esc.	VI-VIII	5-12 dm	M	M	
<i>Lythrum borysthenicum</i> (Schränk) Litv. in Majevski, Fl. Sredn. Rossii, ed. 5: 209. 1917		Circummediterránea	Teróf.-esc.	V-VII	5-20 cm	RR	RR	PNC
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., Sp. Pl.: 447. 1753		Subcosmopolita	Teróf.-esc.	V-IX	1-3 dm	R	R	

<i>Lythrum junceum</i> Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 253. 1794		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	V-IX	2-6 dm	M	M	
<i>Lythrum salicaria</i> L., Sp. Pl.: 446. 1753		Subcosmopolita	Hemic.-esc.	VI-IX	5-15 dm	M	M	
<i>Lythrum thymifolia</i> L., Sp. Pl.: 447. 1753		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	V-VII	1-2 dm	RR	RR	
<i>Lythrum tribracteatum</i> Spreng., Syst. Vég. 4(2): 190. 1827		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	V-IX	1-2 dm	RR	RR	VI
<i>Macrochloa tenacissima</i> (L.) Kunth, Révis. Gramin. 1: 59. 1829		Mediterránea SW	Caméf.-sulif. (Hemic.-cesp.)	III-VI	8-18 dm	CC	C	
<i>Malcolmia africana</i> (L.) W. T. Aiton in Aiton, Hortus Kew., ed. 2, 4: 121. 1812	<i>Strigosella africana</i> (L.) Botsch., Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 57: 1038. 1972	Mediterránea-Paleotropical	Teróf.-esc.	III-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forsibot. 2: 1272. 1803		Paleotemplada	Mesofan.	IV-V	2-8 m	RR	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Malva aegyptia</i> L., Sp. Pl.: 690. 1753		Iranoturaniá	Teróf.-esc.	IV-V	5-20 cm	RR	RR	VI
<i>Malva cretica</i> subsp. <i>althaeoides</i> (Cav.) Dalby in Feddes Rept. 74: 26. 1967		Mediterránea SW	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Malva neglecta</i> Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140. 1824		Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-IX	1-4 dm	C	C	
<i>Malva nicaeensis</i> All., Fl. Pedem. 2: 40. 1785		Circunmediterránea	Teróf.-esc. (Hemic.-bien.)	IV-VII	2-5 dm	M	M	
<i>Malva parviflora</i> L., Demonstr. Pl.: 18. 1753		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	1-6 dm	C	C	
<i>Malva sylvestris</i> L., Sp. Pl.: 689. 1753		Subcosmopolita	Hemic.-esc.	IV-IX	2-6 dm	C	C	
<i>Mantisalca salmanica</i> (L.) Briq. & Cavill. in Arch. Sci. Phys. Nat., ser. 5 12: 111. 1930		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	VI-X	4-10 dm	C	C	

<i>Mantisalca yserniana</i> var. <i>spinulosa</i> (Rouy) E. Ruiz & Devesa, Nordic J. Bot. 32: 20. 2013	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-X	4-10 dm	RR	R	
<i>Marrubium ×bastetanum</i> Coincy in J. Bot. (Morot) 18: 294. 1896	Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-IX	2-5 dm	RR	RR	
<i>Marrubium alysson</i> L., Sp. Pl.: 582. 1753	Mediterránea S-Sa-haro-Síndica	Hemic.-esc.	IV-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Marrubium supinum</i> L., Sp. Pl.: 583. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	2-5 dm	M	M	
<i>Marrubium vulgare</i> L., Sp. Pl.: 583. 1753	Paleotemplada	Hemic.-esc.	IV-IX	2-5 dm	C	C	
<i>Marsilea strigosa</i> Willd., Sp. Pl. 5(1): 539. 1810	Circunmediterránea	Hidróf.-rad.	V-VII	5-15 cm	RR	RR	EPE
<i>Matricaria recutita</i> L., Sp. Pl.: 891. 1753	Holártica	Teróf.-esc.	V-VIII	1-4 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311. 1932	Circunmediterránea	Caméf.-sulf.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Matthiola lunata</i> DC. in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 176. 1821	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Matthiola parviflora</i> (Schousb.) W. T. Aiton in Aiton, Hortus Kew., ed. 2, 4: 121. 1812	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	III-V	5-20 cm	M	M	
<i>Medicago ciliaris</i> (L.) All., Fl. Pedem. 1: 315. 1785	Mediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	2-4 dm	RR	R	
<i>Medicago littoralis</i> Loisel., Not. Fl. France: 118. 1810	Mediterránea-Atlántica	Teróf.-rept.	II-V	1-5 dm	C	C	
<i>Medicago lupulina</i> L., Sp. Pl.: 779. 1753	Paleotemplada	Hemic. (Teróf.)-esc.	III-X	2-5 dm	CC	CC	
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal., Cat. Piantes Siena: 60. 1776	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	

<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal., Cat. Pianta Siena: 60. 1776	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Medicago polymorpha</i> L., Sp. Pl.: 779. 1753	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-VI	2-6 dm	C	C	
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316. 1785	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	IV-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Medicago sativa</i> L., Sp. Pl.: 778. 1753	Holártica	Hemic.-esc.	I-XII	2-6 dm	CC	CC	
<i>Medicago suffruticosa</i> subsp. <i>leio- carpa</i> (Benth.) Urb., Quatre Fl. France: 544. 1936	Mediterránea W	Hemic.-esc.	III-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Melica ciliata</i> L., Sp. Pl.: 66. 1753	Mediterránea-Iranoturaniana	Hemic.-cesp.	V-VII	3-10 dm	M	M	
<i>Melica minuta</i> L., Mant. Pl. 1: 32. 1767	Mediterránea W	Hemic.-cesp.	IV-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Melilotus albus</i> Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Okon. Ges. 2: 382. 1787	Paleotemplada	Hemic.-esc.	V-IX	5-15 dm	M	M	
<i>Melilotus elegans</i> Ser. in DC., Prodr. 2: 188. 1825	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	3-14 dm	R	R	
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308. 1785	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	IV-VII	1-5 dm	C	C	
<i>Melilotus ionalis</i> (L.) Lam., Fl. Franç., ed. 2: 594. 1779	Mediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-5 dm	RR	RR	
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., Fl. Franç., ed. 2: 594. 1779	Paleotemplada	Hemic.-esc. (binal)	V-IX	4-15 dm	M	M	
<i>Melilotus spicatus</i> (Sm.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 103: 127. 1956	Mediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Melilotus sulcatus</i> Desf., Fl. Atlant. 2: 193. 1799	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	C	C	

<i>Melissa officinalis</i> L., Sp. Pl.: 592. 1753		Paleotemplada	Hemic.-esc.	VI-IX	3-10 dm	R	R	
<i>Mentha ×rotundifolia</i> (L.) Huds., Fl. Angl. (Hudson): 221. 1762		Mediterránea-Iranoturmiana	Hemic.-esc.	VII-X	3-8 dm	RR	RR	
<i>Mentha aquatica</i> L., Sp. Pl.: 576. 1753		Subcosmopolita	Hemic.-esc.	VII-IX	2-5 dm	R	R	
<i>Mentha cervina</i> L., Sp. Pl.: 578. 1753		Mediterránea W	Hemic.-esc.	VII-IX	5-30 cm	RR	RR	PNC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) L., Fl. Mon-sp.: 19. 1756		Paleotemplada	Hemic.-esc.	VII-IX	3-10 dm	M	M	
<i>Mentha pulegium</i> L., Sp. Pl.: 577. 1753		Subcosmopolita	Hemic.-esc.	VII-X	1-4 dm	R	R	
<i>Mentha spicata</i> L., Sp. Pl.: 576. 1753		Mediterránea-Asiática	Hemic.-esc.	VI-IX	3-8 dm	R	R	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 149. 1792		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	VII-X	3-8 dm	C	C	
<i>Mercurialis ambigua</i> L. f., Dec. Pl. Horti Upsal. 1: 15. 1762	<i>Mercurialis annua</i> L., Sp. Pl.: 1035. 1753	Mediterránea W	Teróf.-esc.	I-XII	1-4 dm	C	C	
<i>Mercurialis huetii</i> Hamy, Billotia 1: 21. 1864		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	I-XII	1-2 dm	M	M	
<i>Mercurialis tomentosa</i> L., Sp. Pl.: 1035. 1753		Mediterránea W	Caméf.-sufr.	IV-IX	2-7 dm	M	C	
<i>Merendera montana</i> (L.) Lange in Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 193. 1862	<i>Colchicum montanum</i> L., Sp. Pl.: 342. 1753	Mediterránea W	Geóf.-bulb.	VIII-X	1-3 cm	R	R	
<i>Mespilus germanica</i> L., Sp. Pl.: 478. 1753	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 215. 1891	Euroiberiana	Mesofan.	V-VI	1-4 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45. 1818		Mediterránea-Atlántica	Teróf.-esc.	II-IV	2-6 cm	RR	RR	

<i>Micromeria fruticosa</i> (L.) Druce, Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles 3: 321. 1913 publ. 1914	<i>Clinopodium serpy- llifolium</i> subsp. <i>fruti- cosum</i> (L.) Bräucher, Taxon 55: 980. 2006	Mediterránea	Caméf.-sulf.	VII-X	1-5 dm	M	M
<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link in Linnaea 17: 398. 1844	<i>Festuca lachenalii</i> (C.C. Gmel.) Spenn., Fl. Friburg. 3: 1050. 1829	Paleotemplada	Teróf.-cesp.	V-VI	5-25 cm	M	M
<i>Minuartia campestris</i> L., Sp. Pl.: 89. 1753		Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VI	2-10 cm	M	M
<i>Minuartia hamata</i> (Hausskn.) Mattf. in Bot. Jahrb. Syst. 57(Beibl. 126): 2. 1921		Mediterránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	IV-VI	2-8 cm	R	R
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., Fl. SSSR 6: 488. 1936	<i>Sabulina tenuifolia</i> (L.) Rehb., Fl. Germ. Excurs. 2: 785. 1832	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	3-20 cm	CC	CC
<i>Minuartia mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) K. Malý, Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 20: 563. 1908	<i>Sabulina mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) Rehb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5: 27. 1841	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	3-12 cm	R	R
<i>Minuartia montana</i> L., Sp. Pl.: 90. 1753		Mediterránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	IV-VI	2-10 cm	R	R
<i>Mirabilis jalapa</i> L., Sp. Pl.: 177. 1753		Neotropical	Geóf.-bulb.	V-XI	4-10 dm	M	M A (Cult.-Nat.)
<i>Misopates microcarpum</i> (Pomel) D.A.Sutton, Revis. tribe Antirrhine- ae: 151. 1988		Mediterránea SW	Teróf.-esc.	III-V	5-30 cm	RR	R
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., Autik. Bot.: 158. 1840		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	1-7 dm	C	C
<i>Moehringia pentandra</i> J. Gay in Ann. Sci. Nat., ser. 1, 26: 230. 1832		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	M	M

<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrunk) H. K. G. Paul in Ber. Bay-er. Bot. Ges. 23: 154. 1938	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank, Baier. Fl. 1: 336. 1789	Mediterránea W	Hemic.-cesp.	VII-X	8-15 dm	R	M	
<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC. in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 626. 1821		Mediterránea S	Teróf.-esc. (Carnéf.-sulfr.)	II-VI	2-8 dm	C	C	
<i>Moricandia moricandioides</i> subsp. <i>moricandioides</i> (Boiss.) Heywood in Feddes Rept. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 154. 1962		Iberolevantina	Teróf. (Hemic.)-esc.	III-VI	3-10 dm	R	M	
<i>Morus alba</i> L., Sp. Pl.: 986. 1753		Chino-japonesa	Macrofan.	IV-VI	4-10 m	RR	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Morus nigra</i> L., Sp. Pl.: 986. 1753		Chino-japonesa	Macrofan.	IV-VI	4-12 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Muscari atlanticum</i> Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 114. 1852		Mediterránea-Iranotur-niana	Geóf.-bulb.	III-IV	1-2 dm	R	R	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8: 2. 1768		Circummediterránea	Geóf.-bulb.	III-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten. & Sangiov., Ann. Civili Regno Due Sicilie 26: 48. 1841		Circummediterránea	Geóf.-bulb.	III-IV	1-3 dm	C	C	
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, in Schultes, Oestr. Fl., ed. 2, 1: 366. 1814		Paleotemplada	Terof.-esc.	III-VI	5-25 cm	R	M	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 5: 529. 1815		Eurosiberiana	Hidrof.-rad.	VI-VIII	1-10 dm	RR	RR	EPE
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., Sp. Pl.: 992. 1753		Holártica	Hidrof.-rad.	VI-VIII	5-20 dm	RR	RR	
<i>Myrtus communis</i> L., Sp. Pl.: 471. 1753		Circummediterránea	Nanofan.	VI-VIII	1-3 m	RR	M	
<i>Narcissus assoanus</i> Dufour ex Schult. & Schult. f. in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 7: 962. 1830		Mediterránea W	Geóf.-bulb.	II-IV	1-3 dm	R	M	

<i>Narcissus bulbocodium</i> L., Sp. Pl.: 289. 1753		Mediterránea NW	Geóf.-bulb.	II-IV	5-20 cm	RR	M	PNC
<i>Neotostema apulum</i> (L.) I. M. Johnston. in J. Arnold Arbor. 34: 6. 1953		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-V	5-15 cm	M	M	
<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn, Ann. Mus. Goulandris 2: 79. 1974 publ. 1975		Circummediterránea	Geóf.-tub.	IV-VI	1-2 dm	M	M	
<i>Nepeta amethystina</i> Desf. ex Poir. in de Lamarck, Encycl., Suppl. 3: 206. 1813	<i>Nepeta nepetella</i> subsp. <i>aragonensis</i> (Lam.) Nymán, Consp. Fl. Eur.: 586. 1881	Mediterránea W	Caméf.-sufr.	IV-VII	2-8 dm	M	M	
<i>Nepeta nepetella</i> subsp. <i>cordifolia</i> (Willk.) Uberta & Valdés, Lagascales 12: 25. 1983	<i>Nepeta nepetella</i> subsp. <i>aragonensis</i> (Lam.) Nymán, Consp. Fl. Eur.: 586. 1881	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-VIII	2-8 dm	R	R	
<i>Nerium oleander</i> L., Sp. Pl.: 209. 1753		Mediterránea S	Mesofan.	V-IX	1-4 m	M	C	
<i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125. 1894		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Nicotiana glauca</i> Graham in Edinburgh New Philos. J. 5: 175. 1828		Neotropical	Mesofan.	I-XII	1-5 m	R	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Nigella damascena</i> L., Sp. Pl.: 534. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Nigella hispanica</i> L., Sp. Pl.: 534. 1753		Mediterránea NW	Teróf.-esc.	V-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Nonea echinoides</i> (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 71. 1819		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Nonea micrantha</i> Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève, ser. 2 38: 213. 1842		Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Odontites longiflorus</i> (Vahl) Webb, Iter Hispan.: 24. 1838		Mediterránea W	Teróf.-esc.	VII-IX	1-3 cm	R	R	

<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32. 1827		Paleotemplada	Teróf.-esc.	VI-IX	15-40 cm	R	R	
<i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207. 1811		Mediterránea W	Teróf.-esc.	VII-X	2-5 dm	M	M	
<i>Olea europaea</i> L., Sp. Pl.: 8. 1753 subsp. <i>europaea</i>		Circunmediterránea	Meso (Macro)-fan.	IV-VI	1-15 m	CC	C	A (Cult.-Nat.)
<i>Olea europaea</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Hegi, III. Fl. Mitt. Eur. 5: 1936. 1927		Mediterránea S	Mesofan.	IV-VI	1-4 m	M	M	
<i>Onobrychis argentea</i> subsp. <i>hispanica</i> (Širj.) P. W. Ball in Feddes Repert. 79: 42. 1968	<i>Onobrychis conferta</i> subsp. <i>hispanica</i> (Širj.) Guitt. & Kerguelen, Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 23: 82. 1991	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Onobrychis saxatilis</i> (L.) Lam. in Lam. & DC., Fl. Franç. 2: 653. 1778		Mediterránea W	Caméf.-sufir.	IV-VII	2-4 dm	M	M	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., Fl. Car-niol., ed. 2. 2: 76. 1772		Mediterránea	Hemic.-esc.	V-IX	3-7 dm	M	M	
<i>Ononis aragonensis</i> Asso, Syn. Stimp. Aragon.: 96. 1779		Mediterránea W	Nanofan.	IV-VI	2-8 dm	R	R	
<i>Ononis fruticosa</i> L., Sp. Pl.: 718. 1753		Iberolevantina	Nanofan.	IV-VII	3-12 dm	M	M	
<i>Ononis laxiflora</i> Desf., Fl. Atlant. 2: 146. 1798		Mediterránea SW	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	RR	RR	
<i>Ononis minutissima</i> L., Sp. Pl.: 717. 1753		Circunmediterránea	Caméf.-sufir.	III-X	1-4 dm	C	C	
<i>Ononis natix</i> L., Sp. Pl.: 717. 1753		Circunmediterránea	Caméf.-sufir.	IV-IX	2-5 dm	M	C	
<i>Ononis pubescens</i> L., Mant. Pl.: 267. 1771		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Ononis pusilla</i> L., Syst. Nat., ed. 10, 10: 1159. 1759		Mediterránea-Iranotur-niana	Caméf.-sufir.	IV-VII	5-20 cm	C	C	

<i>Ononis reclinata</i> subsp. <i>mollis</i> (Savi) Bég. in Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 134. 1912	<i>Ononis reclinata</i> subsp. <i>minor</i> (Moris) Arceuthobium, Comp. Fl. Ital.: 157. 1882	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.		III-VI	4-20 cm	M	M	
<i>Ononis reclinata</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 2: 1011. 1763 subsp. <i>reclinata</i>		Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.		III-VI	4-20 cm	R	M	
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>australis</i> (Širj.) Greuter & Burdet, Willdet nowia 19(1): 33. 1989		Holártica	Hemic.-esc.		V-VIII	1-6 dm	C	C	
<i>Ononis tridentata</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Lange) Devesa & G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 258. 1997		Iberolevantina	Nanofan.		V-IX	3-10 dm	M	M	
<i>Ononis viscosa</i> subsp. <i>breviflora</i> (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 161. 1878		Circummediterránea	Teróf.-esc.		III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Onopordum acanthium</i> L., Sp. Pl.: 827. 1753		Paleotemplada	Hemic.-bien.		VI-VIII	3-15 dm	R	R	
<i>Onopordum acaulon</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 1159. 1763		Mediterránea W	Hemic.-bien.		V-VII	4-8 cm	R	R	
<i>Onopordum corymbosum</i> Willk. in Linnaea 30: 108. 1859		Mediterránea W	Hemic.-bien.		V-VIII	5-14 dm	M	M	
<i>Onopordum ilyricum</i> L., Sp. Pl.: 827. 1753		Mediterránea C-W	Hemic.-bien.		V-VII	4-14 dm	R	R	
<i>Onopordum nervosum</i> Boiss., Voy. Bot. Espagne: 357. 1841		Mediterránea SW	Hemic.-bien.		VI-VIII	6-20 dm	R	R	
<i>Ophrys ×brigitiae</i> H. Baumann, Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württemberg 19: 142. 1981		Mediterránea	Geóf.-tub.		IV-VI	1-4 dm	RR	RR	
<i>Ophrys ×minuticauda</i> Duffort in Orch. Gers: 27. 1902		Mediterránea	Geóf.-tub.		IV-VI	1-4 dm	RR	RR	
<i>Ophrys ×turiana</i> J.E. Arnold in Acta Bot. Barcinon. 52: 65. 2009		Iberolevantina	Geóf.-tub.		IV-VI	1-4 dm	RR	RR	

<i>Ophrys apifera</i> Huds., Fl. Angl.: 340. 1762		Circunmediterránea-Euroiberiana SW	Geóf.-tub.	III-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Ophrys arnoldii</i> P. Delforge, Naturalistes Belges 80: 247. 1999	<i>Ophrys fusca</i> Link, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324. 1800 subsp. <i>fusca</i>	Circunmediterránea	Geóf.-tub.	IV-V	1-3 dm	RR	R	
<i>Ophrys bilunulata</i> Risso, Fl. Nice: 463. 1844		Circunmediterránea	Geóf.-tub.	III-V	1-3 dm	R	M	
<i>Ophrys castellana</i> Devillers-Tersch. & Devillers, Naturalistes Belges 69(2): 108. 1988	<i>Ophrys ×arachniformis</i> Gren. & M. Philippe, Rech. Orchid. Toulon: 9. 1859)	Iberolevantina	Geóf.-tub.	IV-VI	1-3 dm	RR	RR	VU
<i>Ophrys dyris</i> Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 65. 1931	<i>Ophrys omegafiera</i> subsp. <i>dyris</i> (Maire) Del Prete, Webbia 38: 213. 1984	Circunmediterránea	Geóf.-tub.	III-V	1-3 dm	RR	RR	
<i>Ophrys incubacea</i> Bianca, Nov. Pl. Sp. Prope Hyblam: 8. 1842	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>atrata</i> (Rehb.f.) A. Bolòs, Veg. Com. Barcelona: 265. 1950	Mediterránea N	Geóf.-tub.	IV-VI	2-5 dm	R	R	PNC
<i>Ophrys lupercalis</i> Devillers-Tersch. & Devillers, Naturalistes Belges 75(7 Suppl.): 373. 1994	<i>Ophrys fusca</i> Link, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324. 1800 subsp. <i>fusca</i>	Circunmediterránea	Geóf.-tub.	II-III	1-3 dm	R	M	
<i>Ophrys lutea</i> Cav., Icon. 2: 46. 1793		Mediterránea	Geóf.-tub.	III-VI	5-30 cm	RR	R	
<i>Ophrys scolopax</i> Cav., Icon. 2: 46. 1793		Circunmediterránea	Geóf.-tub.	III-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Ophrys speculum</i> Link, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324. 1800		Circunmediterránea	Geóf.-tub.	III-V	5-30 cm	R	R	
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill., Gard. Diet. ed. 8. 1768		Euroiberiana	Geóf.-tub.	IV-VI	1-4 dm	RR	RR	VI
<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd., Sp. Pl., ed. 4. 4: 67. 1805		Circunmediterránea	Geóf.-tub.	IV-VI	1-3 dm	R	M	

<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: Opuntia No. 2. 1768	Neotropical	Fan.-suc.	IV-VII	1-4 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff., Enum. Diagn. Caet.: 154. 1837	Norteamericana	Camef.-suc.	III-VIII	3-5 dm	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Orchis langei</i> Lange ex K. Richt., Pl. Eur. 1: 273. 1890	<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>laxifloriformis</i> Rivas Goday & B. Rodr., Anales Jard. Bot. Madrid 6: 190. 1948	Geóf.-tub.	V-VII	2-5 dm	RR	R	VI
<i>Orchis tenera</i> (Landwehr) Kreutz, Eurochis 3: 98. 1991	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., Fl. Suec., ed. 2: 310. 1755 subsp. <i>mascula</i>	Geóf.-tub.	IV-VI	2-5 dm	RR	RR	
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Laveny in Tabl. Syn. Pl. Vase. France: 248. 1894	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VII-X	2-6 dm	R	M	
<i>Orlaya daucoides</i> (L.) Greuter in Boissiera 13: 92. 1967	Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Ornithogalum bourgaeum</i> Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 52. 1866	Mediterránea W	Geóf.-bulb.	IV-V	1-2 dm	RR	RR	
<i>Ornithogalum narbonense</i> L., Cent. Pl. II: 15. 1756	Mediterránea	Geóf.-bulb.	IV-VI	3-8 dm	RR	R	
<i>Orobanche alba</i> Willd., Sp. Pl. 3: 350. 1800	Paleotemplada	Teróf.-par.	IV-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2: 317. 1800	Eurosiberiana	Teróf.-par.	IV-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Orobanche cernua</i> Loeßl., Iter Hispan.: 152. 1758	Mediterránea W	Teróf.-par.	IV-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Orobanche clausonis</i> Pomet in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 107. 1874	Mediterránea S	Teróf.-par.	IV-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Orobanche gracilis</i> Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172. 1798	Circummediterránea	Teróf.-par.	IV-VII	2-5 dm	M	M	

<i>Orobanchae hederac</i> Duby, Bot. Gall.: 350. 1828	Circunmediterránea	Teróf.-par.	IV-VI	1-5 dm	M	M	
<i>Orobanchae latisquama</i> (F. W. Schultz) Batt. in Battandier & Trabut, Fl. Algérie, Dicot.: 659. 1890	Mediterránea W	Teróf.-par.	IV-VI	2-5 dm	C	C	
<i>Orobanchae nana</i> (Reut.) Beck in Biblioth. Bot. 19: 91. 1890	Paleotemplada	Teróf.-par.	IV-VIII	5-30 cm	R	M	
<i>Orobanchae portulicaitana</i> A. Pujadas & M. B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 146: 98. 2004	Iberolevantina	Teróf.-par.	IV-VI	1-3 dm	RR	RR	VI
<i>Orobanchae rosmarina</i> Welw. ex Beck in Oesterr. Bot. Z. 70: 243. 1921	Mediterránea W	Teróf. (Geóf.)-par.	V-VI	1-2 dm	RR	RR	VI
<i>Orobanchae santolinae</i> Loscos & J. Pardo, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 79. 1863	Circunmediterránea	Teróf.-par.	III-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Orobanchae schulzei</i> Mutel, Fl. Franç. 2: 429. 1835	Circunmediterránea	Teróf.-par.	III-VI	1-4 dm	RR	RR	PNC
<i>Oxyris alba</i> L., Sp. Pl.: 1022. 1753	Circunmediterránea	Nanofan.	III-VI	4-10 dm	M	C	
<i>Oxyris lanceolata</i> Hochst. & Steud., Pl. Exsicc. Unio Itin.: [in sched.]. 1832	Mediterránea SW	(Nano-) Mesofan.	III-V	1-3 m	R	R	
<i>Oxalis articulata</i> Savigny in J.B.A.M.de Lamarck, Encycl. 4: 686. 1798	Neotropical	Geóf.-riz.	IV-IX	1-3 dm	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Oxalis corniculata</i> L., Sp. Pl.: 435. 1753	Cosmopolita	Hemic.-rept.	III-X	5-30 cm	C	C	
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth in Humboldt & al., Nov. Gen. Sp. 5, ed. 4º: 237. 1822	Neotropical	Geóf.-bulb.	II-X	1-3 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Panicum miliaceum</i> L., Sp. Pl.: 58. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	V-VII	8-12 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Panicum repens</i> L., Sp. Pl., ed. 2, 1: 87. 1762	Mediterránea-Paleotropical	Geóf.-riz.	VII-X	2-6 dm	M	M	

<i>Papaver argemone</i> L., Sp. Pl.: 506. 1753	<i>Roemeria argemone</i> (L.) C. Morales, R. Mend. & Romero García, Lagasalia 15(Extra): 184. 1988	Holártica	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Papaver dubium</i> L., Sp. Pl.: 1196. 1753		Holártica	Teróf.-esc.	III-VI	2-6 dm	C	C	
<i>Papaver hybridum</i> L., Sp. Pl.: 506. 1753	<i>Roemeria sicula</i> (Guss.) Galasso, Banfi, L. Sáez & Bartolucci, Ital. Botanist 15: 101. 2023	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Papaver pinnatifidum</i> Moris, Fl. Sardoia 1: 74. 1837		Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	II-V	2-6 dm	R	R	
<i>Papaver rhoeas</i> L., Sp. Pl.: 507. 1753		Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-VII	1-8 dm	CC	CC	
<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang. in Corb., Nouv. Fl. Normandie: 30. 1893		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VII	3-7 dm	R	R	
<i>Parapholis incurva</i> (L.) C. E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14. 1946		Circummediterránea	Teróf.-esc.	VI-VII	5-20 cm	R	R	
<i>Parietaria judaica</i> L., Fl. Palaest.: 32. 1756		Circummediterránea	Hemic.-esc.	I-XII	2-6 dm	CC	CC	
<i>Paronychia aretioides</i> DC., Prodr. 3: 371. 1828		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VI	3-15 cm	R	M	
<i>Paronychia argentea</i> Lam. in Lam. & DC., Fl. Franç. 3: 230. 1778		Mediterránea-Iranoturana	Hemic.-cesp.	III-VI	1-4 dm	C	C	
<i>Paronychia capitata</i> (L.) Lam. in Lam. & DC., Fl. Franç. 3: 229. 1778	<i>Paronychia cephalotes</i> (M. Bieb.) Besser, Enum. Hort. Cremenec: 4. 1830	Circummediterránea	Hemic.-cesp.	III-VI	5-15 cm	C	C	

<i>Paronychia suffruticosa</i> (L.) DC. in Lam. & Poir., Encycl. 5: 25. 1804	Iberolevantina	Camef.-suffr.	III-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir. in Lamarck, Encycl. 5: 35. 1804	Neotropical	Hemic.-cesp.	VII-X	3-9 dm	R	M	A
<i>Paspalum distichum</i> L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 855. 1759	Neotropical	Geóf.-riz.	VII-X	1-5 dm	R	M	A
<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>syhevstris</i> (Mill.) Rouy & E. G. Camus in Rouy, Fl. France 7: 372. 1901	Subcosmopolita	Hemic.-bien.	VII-X	3-10 dm	R	R	
<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 424. 1789	Capense	Camef.-suffr.	I-XII	2-8 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Pennisetum clandestinum</i> Chiov. in Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8: 41. 1903	Paleotropical	Geóf.-riz.	VI-IX	2-10 dm	RR	RR	
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 269. 1821	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	VII-XI	2-8 dm	C	C	A (Cult.-Nat.)
<i>Petrorhagia prolifera</i> subsp. <i>nanteu- ilii</i> O. Bolós & Vigo	Mediterránea W	Teróf.-esc.	IV-VII	1-3 dm	M	M	
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164. 1964	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-IX	1-3 dm	C	C	
<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo, Anales Jard. Bot. Madrid 45: 363. 1988	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	1-3 dm	R	R	
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254. 1866	Mediterránea	Hemic.-bien.	VI-VII	3-6 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)

<i>Peucedanum officinale</i> L., Sp. Pl.: 245. 1753		Paleotemplada	Hemic.-esc.	VII-X	3-13 dm	R	R	
<i>Phagnalon ×murbeckii</i> Faure, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 256. 1923	<i>Phagnalon ×caroli</i> (L.) DC., Prodr. 5: 396. 1836 subsp. <i>rupestre</i>	Mediterránea W	Caméf.-sufir.	IV-VI	1-3 dm	RR	RR	
<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>ilyricum</i> (H. Lindb.) Ginzb. in Österr. Bot. Z. 70: 198. 1921		Circunmediterránea	Caméf.-sufir.	III-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1819: 174. 1819		Circunmediterránea	Caméf.-sufir.	I-V	2-6 dm	C	C	
<i>Phagnalon sordidum</i> (L.) Rehb., Fl. Germ. Excurs.: 224. 1831-1832		Mediterránea W	Caméf.-sufir.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Phalaris arundinacea</i> L., Sp. Pl.: 55. 1753		Holártica	Geóf.-riz.	VI-VII	7-20 dm	M	M	
<i>Phalaris minor</i> Retz., Observ. Bot. 3: 8. 1783		Paleotropical	Teróf.-esc.	IV-VI	1-6 dm	M	M	
<i>Phillyrea angustifolia</i> L., Sp. Pl.: 7. 1753		Circunmediterránea	Meso (Nano)-fan.	III-V	1-3 m	C	C	
<i>Phillyrea latifolia</i> L., Sp. Pl.: 8. 1753		Circunmediterránea	Meso (Nano)-fan.	IV-VI	1-4 m	R	R	
<i>Phillyrea media</i> L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 887. 1759	<i>Phillyrea latifolia</i> L., Sp. Pl.: 8. 1753	Circunmediterránea	Meso (Nano)-fan.	IV-VI	1-4 m	R	R	
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst., Deut. Fl.: 374. 1881		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	V-VII	3-6 dm	R	R	
<i>Phlomis crinita</i> Cav., Icon. 3: 25. 1795		Iberolevantina	Caméf.-sufir.	IV-VI	3-10 dm	R	M	
<i>Phlomis herba-venti</i> L., Sp. Pl.: 586. 1753		Mediterránea-Iranoturamiana	Caméf.-sufir.	VI-VII	2-5 dm	RR	R	
<i>Phlomis hychinitis</i> L., Sp. Pl.: 585. 1753		Mediterránea W	Caméf.-sufir.	III-VII	2-4 dm	C	C	

<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, Prov. Agric. Hort. III. 19: 293. 1882	Macaronésica	Mesofan.	II-V	3-8 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Phoenix dactylifera</i> L., Sp. Pl.: 1188. 1753	Paleotropical	Macrofan.	II-V	3-25 m	R	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Phragmites australis</i> subsp. <i>altissimus</i> (Benth.) Clayton in Taxon 17: 158. 1968	Circunmediterránea	Geóf.-riz. (Helóf.)	VIII-X	2-8 m	M	M	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud., Nomencl. Bot., ed. 2: 324. 1841 subsp. <i>australis</i>	Holártica	Geóf.-riz. (Helóf.)	VIII-X	4-20 dm	C	C	
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2: 10. 1844	Holártica	Hemic.-ros.	I-XII	2-6 dm	RR	RR	PNC
<i>Phytolacca americana</i> L., Sp. Pl.: 441. 1753	Norteamericana	Geóf.-riz.	VI-X	1-3 m	RR	RR	A
<i>Picnemon acarna</i> (L.) Cass. in Cuvier, Diet. Sci. Nat. 40: 188. 1826	Paleotemplada	Teróf.-esc.	VI-VIII	2-5 dm	M	M	
<i>Picris echinoides</i> L., Sp. Pl.: 792. 1753	Paleotemplada	Hemic.-bien. (esc.)	VI-X	3-8 dm	C	C	
<i>Picris hispanica</i> (Willd.) P. D. Sell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 248. 1976	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VI	5-15 cm	R	R	
<i>Pilosella xylocae</i> Mateo, Xiloca 34: 119. 2006	Iberolevantina	Hemic.-ros.	V-VII	5-20 cm	RR	RR	
<i>Pilosella capillata</i> (Arv.-Touv.) Mateo, Egido & Gómiz, Flora Montiber. 84: 52. 2022	Mediterránea W	Hemic.-ros.	V-X	5-20 cm	M	M	
<i>Pilosella hoppeana</i> (Schult.) F. W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 421. 1862	Mediterránea N	Hemic.-ros.	V-VII	5-20 cm	R	R	

<i>Pilosella leptobrachia</i> (Arv.-Touv. & Gaut.) Mateo, Flora Montiber. 51: 78. 2012	Mediterránea W	Hemic.-ros.	V-VII	5-20 cm	RR	RR	
<i>Pilosella periphanooides</i> (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217. 1971	Mediterránea W	Hemic.-ros.	V-VII	5-20 cm	RR	R	
<i>Pilosella portae</i> (T. Durand & B. D. Jacks.) Mateo & Greuter in Willdenowia 37: 136. 2007	Mediterránea	Hemic.-ros	V-VIII	8-25 cm	RR	R	
<i>Pilosella pseudopilosella</i> (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217. 1971	Circunmediterránea	Hemic.-ros.	V-VIII	1-3 dm	M	M	
<i>Pilosella saussureoides</i> Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13. 1873	Circunmediterránea	Hemic.-ros.	V-VII	5-20 cm	RR	R	
<i>Pimpinella propinqua</i> H. Wolff, Pflanzenr. (Engler) Umbellif.-Apioid.-Anmin. 229. 1927	Iberolevantina	Hemic.-esc.	VII-IX	4-15 dm	R	R	
<i>Pimpinella tragium</i> subsp. <i>lithophila</i> (Schischk.) Tutin in Feddes Repert. 79: 62. 1968	Circunmediterránea	Caméf.-sufr.	VII-IX	1-2 dm	RR	RR	
<i>Pinus × saportae</i> nothsubsp. <i>curraii</i> P.P. Ferrer, E. Laguna, R. Roselló & J.B. Peris, Flora Montiber. 88: 45. 2024	Mediterránea W	Macrofan.	III-V	5-35 m	RR	RR	
<i>Pinus eldarica</i> Medw. in Trudy Tiflissk. Bot. Sada 6(2): 21. 1903	Mediterránea-Iranoturana	Macrofan.	II-V	2-20 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)

<i>Pinus halepensis</i> Mill., Gard. Dict., ed. 8: Pinus No. 8. 1768		Circummediterránea	Macrofan.		II-V	2-20 m	CC	CC	
<i>Pinus halepensis</i> var. <i>minor</i> Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 19. 1870		Iberolevantina	Macrofan.		II-V	2-20 m	RR	RR	
<i>Pinus halepensis</i> var. <i>pendula</i> P.P. Ferrer & R. Ferrer, Bouteloua 19: 199. 2014		Iberolevantina	Macrofan.		II-V	2-20 m	RR	RR	
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold, Reise Mari-azell: 8. 1785 subsp. <i>nigra</i>		Eurosiberiana S	Macrofan.		III-VI	4-20 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>salzmannii</i> (Dunal) Franco, Dendrol. Florest.: 56. 1943		Mediterránea W	Macrofan.		III-V	4-30 m	M	M	
<i>Pinus pinaster</i> subsp. <i>escarena</i> (Risso) K. Richtl., Pl. Eur. 1: 1. 1890		Mediterránea W	Macrofan.		III-V	5-35 m	M	C	
<i>Pinus pinea</i> L., Sp. Pl.: 1000. 1753		Circummediterránea	Macrofan.		III-V	5-30 m	M	M	
<i>Pinus sylvestris</i> L., Sp. Pl.: 1000. 1753		Eurosiberiana	Macrofan.		V-VI	5-35 m	R	R	
<i>Piptatherum coenlescens</i> (Desf.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 18. 1812		Circummediterránea	Hemic.-cesp.		IV-VI	3-7 dm	R	M	
<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Röser & Hamasha, Pl. Syst. Evol. 298: 365. 2012		Mediterránea-Iranotur-niana	Hemic.-cesp.		I-XII	4-13 dm	CC	CC	
<i>Achnatherum paradoxum</i> (L.) Banfi, Galasso & Bartolucci, Nat. Hist. Sci. 15: 18. 2017		Mediterránea W	Hemic.-cesp.		V-VII	6-15 dm	M	M	
<i>Pistacia ×saporitae</i> Burnat, Fl. Alpes Marit. 2: 54 1896		Mediterránea	Mesofan.		III-V	1-5 m	RR	RR	
<i>Pistacia lentiscus</i> L., Sp. Pl.: 1026. 1753		Mediterránea-Sub-tropical	Mesofan.		II-IV	5-30 dm	CC	CC	
<i>Pistacia terebinthus</i> L., Sp. Pl.: 1025. 1753		Circummediterránea	Mesofan.		III-V	1-5 m	M	M	

<i>Pistorinia hispanica</i> (L.) DC., Prodr. 3: 399. 1828	Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VIII	5-15 cm	RR	RR	VI
<i>Plantago afra</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 168. 1762	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	
<i>Plantago albicans</i> L., Sp. Pl.: 114. 1753	Circunmediterránea	Caméf.-sufr.	IV-VII	1-3 dm	C	C	
<i>Plantago coronopus</i> L., Sp. Pl.: 115. 1753	Paleotemplada	Teróf. (Hemic.)-ros.	I-XII	3-30 cm	CC	CC	
<i>Plantago crassifolia</i> Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 31. 1775	Mediterránea	Hemic.-ros.	V-VIII	6-20 cm	RR	R	
<i>Plantago holosteum</i> Scop., Fl. Carniol., ed. 2: 1: 108. 1771	Circunmediterránea	Hemic.-esc. (ros.)	VI-VIII	5-15 cm	R	R	
<i>Plantago lagopus</i> L., Sp. Pl.: 114. 1753	Circunmediterránea	Teróf. (Hemic.)-ros.	IV-VII	5-30 cm	CC	CC	
<i>Plantago lanceolata</i> L., Sp. Pl.: 113. 1753	Paleotemplada	Hemic.-ros.	IV-X	3-6 dm	C	C	
<i>Plantago major</i> L., Sp. Pl.: 112. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-ros.	V-IX	1-4 dm	M	M	
<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499. 1882	Paleotemplada	Hemic.-ros.	V-IX	1-4 dm	R	R	
<i>Plantago media</i> L., Sp. Pl.: 113. 1753	Paleotemplada	Hemic.-ros.	V-VII	2-6 dm	R	R	
<i>Plantago sempervirens</i> Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 331. 1766	Mediterránea W	Caméf.-sufr.	IV-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Plantanthera montana</i> (Custer) Rehb. in J.C.Mössler, Handb. Gewächsk., ed. 2: 2: 1565. 1829	Paleotemplada	Geóf.-bulb.	V-VII	2-5 dm	RR	RR	
<i>Plantanus hispanica</i> Münchb., Hausvater 5: 229. 1770	Mediterránea W	Macrofan.	IV-VI	5-30 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Platycapnos spicata</i> (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471. 1833	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-VI	1-3 dm	M	R	

<i>Poa annua</i> L., Sp. Pl.: 68. 1753 sub-sp. <i>annua</i>		Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-XII	5-30 cm	CC	CC	
<i>Poa annua</i> subsp. <i>exilis</i> (Tomm. ex Freyn.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson & Graebner] 2(1): 389. 1900	<i>Poa infirma</i> Kunth in F.W.H. von Humboldt, A.J.A. Bonpland & C.S. Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 158. 1816	Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-XII	5-30 cm	R	M	
<i>Poa bulbosa</i> L., Sp. Pl.: 70. 1753		Paleotemplada	Geóf.-bulb.	III-V	1-4 dm	M	M	
<i>Poa compressa</i> L., Sp. Pl.: 69. 1753		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	IV-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Poa flaccidula</i> Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan: 128. 1852		Mediterránea SW	Hemic.-cesp.	IV-VI	3-6 dm	R	R	
<i>Poa nemoralis</i> L., Sp. Pl.: 69. 1753		Holártica	Hemic.cesp.	V-IX	2-6 dm	R	R	
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 112. 1824	<i>Poa angustifolia</i> L., Sp. Pl.: 67. 1753	Holártica	Geóf.-riz.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Poa trivialis</i> L., Sp. Pl.: 67. 1753		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	V-VI	2-7 dm	M	M	
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., Syst. Nat., ed. 10: 881. 1759		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-15 cm	C	C	
<i>Polygala monspeliaca</i> L., Sp. Pl.: 702. 1753		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Polygala rupestris</i> Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325. 1788		Mediterránea W	Caméf.-sufr.	IV-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226. 1906		Holártica	Geóf.-riz.	V-VI	2-4 dm	R	R	
<i>Polygonum aviculare</i> L., Sp. Pl.: 362. 1753		Cosmopolita	Teróf.-rept.	VI-IX	1-4 dm	CC	CC	
<i>Polygonum bellardii</i> All., Fl. Pedem. 2: 207. 1785		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-X	2-5 dm	M	M	
<i>Polygonum orientale</i> L., Sp. Pl.: 362. 1753	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 537. 1841	Asiática	Teróf.-esc.	IV-X	2-5 dm	RR	RR	A

<i>Polypodium cambricum</i> L., Sp. Pl.: 1086. 1753		Mediterránea-Atlántica	Geóf.-riz.	IX-VII	4-40 cm	M	M
<i>Polypodium vulgare</i> L., Sp. Pl.: 1085. 1753		Euroiberiana	Geóf.-riz.	IX-VII	4-40 cm	R	R
<i>Polypogon maritimus</i> Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 442. 1801 subsp. <i>maritimus</i>		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	1-3 dm	R	R
<i>Polypogon maritimus</i> subsp. <i>subspathaceus</i> (Req.) Bonnier & Lavenex. Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 356. 1894	<i>Polypogon subspathaceus</i> Req., Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 386. 1825	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	1-3 dm	M	M
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67. 1798		Paleotropical	Teróf.-esc.	III-V	1-5 dm	M	M
<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110 (Sess. Extr.): 56. 1966		Paleotropical	Hemic.-cesp.	V-VII	2-8 dm	C	C
<i>Populus ×canadensis</i> Moench in Verz. Auslând. Bäume: 81. 1785		Desconocido	Macrofan.	II-IV	5-40 m	RR	RR A (Cult.-Nat.)
<i>Populus ×canescens</i> (Aiton) Sm., Fl. Brit. 3: 1080. 1804		Desconocido	Macrofan.	II-IV	5-40 m	RR	RR A (Cult.-Nat.)
<i>Populus alba</i> L., Sp. Pl.: 1034. 1753		Paleotemplada	Macrofan.	II-IV	5-30 m	M	M
<i>Populus deltoides</i> Marshall, Arbust. Amer.: 106. 1785 (Dec.)		Norteamericana SE	Macrofan.	II-IV	5-30 m	M	M A (Cult.-Nat.)
<i>Populus nigra</i> L., Sp. Pl.: 1034. 1753		Paleotemplada	Macrofan.	II-IV	5-40 m	M	M
<i>Portulaca oleracea</i> L., Sp. Pl.: 445. 1753		Subcosmopolita	Teróf.-rept.	V-IX	1-4 dm	C	C
<i>Potamogeton coloratus</i> Homem. in Oeder, Fl. Dan. 9(25): 4. 1813		Mediterránea-Atlántica	Hidrof.-rad.	V-VII	2-5 dm	R	R VI
<i>Potamogeton densus</i> L., Sp. Pl.: 126. 1753	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, n.s., 17: 169. 1869	Paleotemplada	Hidrof.-rad.	V-VI	1-5 dm	M	M

<i>Potamogeton nodosus</i> Poir. in Lamarek, Encycl. Suppl. 4: 535. 1816	Holártica	Hidrof.-rad.	VI-VIII	5-18 dm	M	M	
<i>Potamogeton pectinatus</i> L., Sp. Pl.: 127. 1753	Subcosmopolita	Hidrof.-rad.	V-VII	4-15 dm	M	M	
<i>Potentilla caulescens</i> L., Cent. Pl. II: 19. 1756	Mediterránea N	Hemic.-esc.	VII-IX	1-3 dm	R	R	
<i>Potentilla cinerea</i> Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 46. 1779	Eurosiberiana	Hemic.-esc.	IV-VI	3-30 cm	R	R	
<i>Potentilla reptans</i> L., Sp. Pl.: 499. 1753	Holártica	Hemic.-esc.	III-IX	1-4 dm	C	C	
<i>Potentilla supina</i> L., Sp. Pl.: 497. 1753	Cosmopolita	Hemic.-esc.	V-X	2-5 dm	RR	RR	VI
<i>Potentilla verna</i> L., Sp. Pl.: 498. 1753	Eurosiberiana	Hemic.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Prunella hyssopifolia</i> L., Sp. Pl.: 600. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-IX	1-3 dm	R	R	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837. 1763	Mediterránea N	Hemic.-esc.	IV-VII	1-3 dm	R	M	
<i>Prunella vulgaris</i> L., Sp. Pl.: 600. 1753	Holártica	Hemic.-esc.	VI-IX	1-4 dm	M	M	
<i>Prunus armeniaca</i> L., Sp. Pl.: 474. 1753	Paleotemplada	Mesofan.	III-V	2-5 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Prunus avium</i> (L.) L., Fl. Suec., ed. 2: 165. 1755	Eurosiberiana	Macrofan.	III-IV	5-20 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Prunus domestica</i> L., Sp. Pl.: 475. 1753	Eurosiberiana	Macrofan.	III-IV	5-10 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, in Feddes Rept. 74: 24. 1967	Iranoturaniiana	Mesofan.	I-IV	3-8 m	CC	C	A (Cult.-Nat.)

<i>Prunus insititia</i> L., Cent. Pl. I: 12. 1755		Mediterránea-Eu-rosiberiana	Mesofan.	III-V	1-5 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Prunus mahaleb</i> L., Sp. Pl.: 474. 1753		Paleotemplada	Mesofan.	III-V	2-5 m	RR	R	
<i>Prunus prostrata</i> Labill., Icon. Pl. Syr. 1: 15, t. 6. 1791		Circunmediterránea	Caméf.-frut.	IV-VI	1-5 dm	RR	RR	
<i>Prunus spinosa</i> L., Sp. Pl.: 475. 1753		Paleotemplada	Nanofan.	III-V	5-30 dm	R	M	
<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40. 1933	<i>Festuca incurva</i> (Gouan) Gutermann, Phytion (Horn) 54: 190. 2014	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-V	5-25 cm	R	R	
<i>Pyrolis saxifraga</i> (L.) Loret & Bar- randon, Fl. Montpellier: 283. 1876		Mediterránea N	Hemic.-bien.	VII-IX	2-6 dm	R	R	
<i>Puccinellia hispanica</i> M. A. Juliá & J. M. Monts. in Fontqueria 53: 3. 1999		Iberolevantina	Hemic.-cesp.	V-VIII	2-8 dm	RR	RR	PNC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., Syst. Verz.: 153. 1800		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	VII-X	3-8 dm	M	M	
<i>Punica granatum</i> L., Sp. Pl.: 472. 1753		Mediterránea-Iranotur- miana	Mesofan.	III-V	1-4 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K. Schneid., Ill. Handb. Laub- holz. 1: 761. 1906		Chino-japonesa	Mesofan.	V-VI	1-3 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 219. 1847		Chino-japonesa	Mesofan.	V-VI	1-3 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Pyrus communis</i> L., Sp. Pl.: 479. 1753		Paleotemplada	Macrofan.	IV-V	2-15 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Quercus ×auzandrii</i> nothosubsp. <i>agrifolia</i> M.B. Crespo & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 262. 1990		Mediterránea W	Macrofan.	III-VI	4-25 m	RR	RR	
<i>Quercus ×battandieri</i> A. Camus, Chênes. Texte 2: 411, 792. 1939		Mediterránea W	Macrofan.	III-VI	4-25 m	RR	RR	

<i>Quercus xnumantina</i> Ceballos & C. Vicioso, Anales Jard. Bot. Madrid 2: 200 1942	Mediterránea W	Macrofan.	III-VI	4-25 m	RR	RR	
<i>Quercus xsemmeniana</i> A. Camus in Chênes, Atlas 2: 55. 1935	Mediterránea W	Macrofan.	III-VI	4-25 m	RR	RR	
<i>Quercus coccifera</i> L., Sp. Pl.: 995. 1753	Circunmediterránea	Meso (Nano)-fan.	III-V	5-30 dm	CC	CC	
<i>Quercus faginea</i> Lam., Encycl. I: 725. 1785	Mediterránea W	Macrofan.	IV-V	3-25 m	M	M	
<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>rotundifolia</i> (Lam.) O. Schwarz ex Tab. Morais, Bol. Soc. Brot., II, 14: 122. 1940	Mediterránea W	Macrofan.	III-VI	4-25 m	CC	C	
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., Sp. Pl. 4 (1): 451. 1805	Mediterránea W	Macrofan.	IV-VI	3-20 m	RR	R	VI
<i>Ranunculus arvensis</i> L., Sp. Pl.: 555. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Ranunculus bulbosus</i> subsp. <i>aleae</i> (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106. 1893	Circunmediterránea	Hemic.-esc.	IV-VI	1-5 m	M	M	
<i>Ranunculus gramineus</i> L., Sp. Pl.: 549. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	III-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) C. D. K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473. 1984	Paleotemplada	Hidr.-rad.	I-VI	1-8 dm	R	R	
<i>Ranunculus repens</i> L., Sp. Pl.: 554. 1753	Paleotemplada	Hemic.-esc.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Ranunculus sceleratus</i> L., Sp. Pl.: 551. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-VI	2-5 dm	R	R	
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, Pl. Vapinc.: 31. 1785	Subcosmopolita	Hidr.-rad.	IV-VIII	3-8 dm	R	R	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L., Sp. Pl.: 669. 1753	Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	III-VI	2-5 dm	R	R	

<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257. 1785	Circummediterránea	Hemic.-bien. (esc.)	IV-VII	2-5 dm	C	C	
<i>Reichardia intermedia</i> (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Bot. 24: 68. 1909	Circummediterránea	Hemic.-bien. (Teróf.-esc.)	III-XI	2-5 dm	C	C	
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35. 1787	Circummediterránea	Hemic.-esc.	III-X	2-5 dm	C	C	
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35. 1787	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	III-V	1-3 dm	M	M	
<i>Reseda lutea</i> L., Sp. Pl.: 449. 1753	Mediterránea W	Hemic.-bien.	III-VI	2-5 dm	R	R	
<i>Reseda luteola</i> L., Sp. Pl.: 448. 1753	Paleotemplada	Hemic.-bien.	V-VII	3-8 dm	M	M	
<i>Reseda phyteuma</i> L., Sp. Pl.: 449. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VII	1-4 dm	CC	CC	
<i>Reseda stricta</i> Pers., Syn. Pl. 2: 10. 1806	Mediterránea W	Hemic.-bien.	III-VI	2-5 dm	R	R	
<i>Reseda undata</i> L., Syst. Nat., ed. 10, 10: 1046. 1759	Iberolevantina	Hemic.-bien.	III-V	3-10 dm	M	M	
<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144. 1840	Mediterránea SW	Nanofan.	I-V	1-3 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Retama sphaerocarpa</i> (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144. 1840	Mediterránea W	Nanofan.	V-VII	1-2,5 m	R	R	
<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 354. 1791	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Rhamnus alaternus</i> L., Sp. Pl.: 193. 1753	Circummediterránea	Meso (Nano)-fan.	II-IV	2-30 dm	C	C	
<i>Rhamnus lycioides</i> subsp. <i>borgiae</i> Rivas Mart. & J.M. Pizarro, Int. J. Geobot. Res. 1(1): 58. 2011	Iberolevantina	Nanofan.	III-V	5-20 cm	R	R	
<i>Rhamnus infectoria</i> L., Mant. Pl.: 49. 1767	Mediterránea N	Nanofan.	IV-VI	3-15 dm	R	R	
<i>Rhamnus lycioides</i> L., Sp. Pl. 2: 279. 1762	Mediterránea W	Nanofan.	III-V	5-20 dm	C	C	

<i>Rhamnus oleoides</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Lange) Rivas Mart. & J. M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 61. 2011	<i>Rhamnus oleoides</i> L., Sp. Pl., ed. 2.: 279. 1762 subsp. <i>oleoides</i>	Mediterránea SW	Nanofan.		III-V	5-20 dm	M	M	
<i>Rhamnus pumila</i> Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120. 1765		Mediterránea N	Caméf.-rept.		V-VI	1-5 dm	RR	RR	
<i>Rhaponticum confierum</i> (L.) Greuter in Willdenowia 33: 61. 2003		Mediterránea W	Hemic.-esc.		V-VII	1-3 dm	C	M	
<i>Rhus coriaria</i> L., Sp. Pl.: 265. 1753		Mediterránea E	Mesofan.		V-VIII	1-4 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Ridolfia segetum</i> (Guss.) Moris, Enum. Sem. Hort. Taur.: 43. 1841		Mediterránea S	Teróf.-esc.		III-VI	1-4 dm	R	M	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., Sp. Pl.: 722. 1753		Norteamericana	Macrofan.		III-VI	3-25 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92. 1821		Mediterránea-Iranoturániana	Teróf.-esc.		III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser in Besser, Enum. Pl.: 27. 1821		Eurosiberiana	Hidroóf.-rad.		III-XI	1-5 dm	RR	R	
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek, Sched Fl Stiriac. N. 170. 1905 [in Sched], Sched. Fl. Stiriac., 3-4: 22. 1905		Cosmopolita	Hidroóf.-rad.		III-XI	1-5 dm	C	C	
<i>Rosa agrestis</i> Savi, Fl. Pis. 1: 475. 1798		Eurosiberiana S	Fan.-escand.		V-VII	5-25 dm	M	M	
<i>Rosa canina</i> L., Sp. Pl.: 491. 1753		Paleotemplada	Fan.-escand.		V-VII	1-3 m	R	R	
<i>Rosa micrantha</i> Sm. in Smith & Sowerby, Engl. Bot. 35: t. 2490. 1813		Eurosiberiana S	Fan.-escand.		V-VII	1-3 m	M	M	
<i>Rosa pouzini</i> Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112. 1823		Circunmediterránea	Fan.-escand.		V-VII	1-2 m	M	M	
<i>Rosmarinus officinalis</i> L., Sp. Pl.: 23. 1753	<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn., Handb. Angew. Bot. 2: 447. 1835	Circunmediterránea	Nanofan.		IX-VI	2-15 dm	CC	CC	

<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vyss. Rast. 7: 47. 1971	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-VI	5-40 cm	C	C	
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>longifolia</i> (Poir.) O. Bolòs, V Simp. Fl. Eur., Publ. Univ. Sevilla: 84. 1969	Circummediterránea	Fan.-escand.	IV-VI	3-20 m	C	C	
<i>Rubia peregrina</i> L., Sp. Pl.: 109. 1753 subsp. <i>peregrina</i>	Circummediterránea	Fan.-escand.	IV-VI	3-20 dm	C	C	
<i>Rubia tinctorum</i> L., Sp. Pl.: 109. 1753	Asiática	Hemic.-esc.	VI-VII	3-10 m	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Rubus caesius</i> L., Sp. Pl.: 493. 1753	Paleotemplada	Fan.-escand.	V-VIII	1-5 m	R	R	
<i>Rubus canescens</i> DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 139. 1813	Euroiberiana S	Fan.-escand.	V-VIII	5-20 dm	RR	RR	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott in Isis (Oken) 2: 821. 1818	Paleotemplada	Fan.-escand.	V-VIII	1-6 m	CC	CC	
<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>angiocarpus</i> (Murb.) Murb. in Bot. Not.: 41. 1899	Subcosmopolita	Hemic. (Teróf.)-esc.	V-VI	5-30 cm	M	M	
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>gallicus</i> (Steinh.) Rech. f. in Bot. Not. 1939: 497. 1939	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	M	M	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, Prodr. Sturp. Gott.: 52. 1770	Holártica	Hemic.-esc.	VII-IX	3-8 dm	M	M	
<i>Rumex crispus</i> L., Sp. Pl.: 335. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	VI-IX	4-12 dm	C	C	
<i>Rumex intermedius</i> DC. in Lamarek & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 5: 369. 1815	Mediterránea NW	Hemic.-esc.	IV-VI	3-7 dm	M	M	
<i>Rumex obtusifolius</i> L., Sp. Pl.: 335. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	VI-VIII	4-10 dm	R	R	
<i>Rumex pulcher</i> L., Sp. Pl.: 336. 1753 subsp. <i>pulcher</i>	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	IV-VII	3-8 dm	R	R	
<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>woodsii</i> (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585. 1882	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	IV-VII	3-8 dm	C	C	

<i>Ruscus aculeatus</i> L., Sp. Pl.: 1041. 1753	Circunmediterránea	Geóf.-riz.	X-IV	2-6 dm	M	M	
<i>Ruta angustifolia</i> Pers., Syn. Pl. 1: 464. 1805	Mediterránea W	Caméf.-sufi.	IV-VII	2-7 dm	C	C	
<i>Ruta chalepensis</i> L., Mant. Pl.: 69. 1767	Mediterránea E	Caméf.-sufi.	IV-VII	2-6 dm	M	M	
<i>Ruta montana</i> (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52. 1756	Circunmediterránea	Caméf.-sufi.	V-VIII	2-5 dm	R	R	
<i>Sagina apetala</i> Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 2: 22. 1763	Paleotemplada	Teróf.cesp	II-V	2-5 dm	M	M	
<i>Sagina sabuletorum</i> (J. Gay) Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 3. 1864	Mediterránea W	Hemic.-ros.	V-VII	5-10 cm	RR	RR	
<i>Salix ×fragilis</i> L., Sp. Pl. 2: 1017. 1753	Eurosiberiana	Macrofan.	II-V	3-20 m	R	R	
<i>Salix ×pseudoelaagnos</i> T.E. Díaz & Llamas in Acta Bot. Malactana 12: 133. 1987	Mediterránea W	Mesofan.	III-IV	1-4 m	RR	R	
<i>Salix alba</i> L., Sp. Pl.: 1021. 1753	Paleotemplada	Macrofan.	II-IV	5-20 m	R	R	
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., Fl. Lusit. 1: 31. 1804	Eurosiberiana S	Mesofan.	II-IV	3-12 m	M	M	
<i>Salix eleagnos</i> Scop., Fl. Camiol., ed. 2, 2: 257. 1772	Eurosiberiana S	Mesofan.	III-IV	1-4 m	M	M	
<i>Salix neotricha</i> Goert. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 385. 1926	Mediterránea W	Macrofan.	II-V	3-20 m	R	M	
<i>Salix purpurea</i> subsp. <i>lambertiana</i> (Sm.) Rech. f. in Oesterr. Bot. Z. 110: 341. 1963	Paleotemplada	Mesofan.	III-IV	1-4 m	R	M	
<i>Salsola kali</i> L., Sp. Pl.: 222. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	VII-X	2-8 dm	CC	C	
<i>Salsola vermiculata</i> L., Sp. Pl.: 323. 1753	Mediterránea W	Caméf.-sufi.(Nanofan.)	VI-X	3-8 dm	M	M	
<i>Salvia aethiopis</i> L., Sp. Pl.: 27. 1753	Paleotemplada	Hemic.-esc.	V-VII	3-8 dm	R	R	

<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl, Enum. Pl. 1: 222. 1804	Mediterránea W	Nanofan.	V-VII	2-5 dm	M	M
<i>Salvia phlomoides</i> Asso, Intr. Oryctog. Arag.: 158. 1784	Mediterránea SW	Hemic.-esc.	V-VII	2-4 dm	RR	RR
<i>Salvia pratensis</i> L., Sp. Pl.: 25. 1753	Euroiberiana	Hemic.-esc	V-VIII	2-6 dm	R	M
<i>Salvia sclarea</i> L., Sp. Pl.: 27. 1753	Mediterránea E	Hemic.-bien. (esc.)	V-VII	4-12 dm	R	R
<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>contraversa</i> (Ten.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 520. 1895	Circummediterránea	Hemic.-esc.	I-VII	1-4 dm	CC	CC
<i>Salvia verbenaca</i> L., Sp. Pl.: 25. 1753 subsp. <i>verbenaca</i>	Paleotemplada	Hemic.-esc.	I-XI	1-4 dm	M	M
<i>Sambucus ebulus</i> L., Sp. Pl.: 269. 1753	Paleotemplada	Geóf.-riz.	V-VIII	5-15 dm	M	M
<i>Sambucus nigra</i> L., Sp. Pl.: 269. 1753	Paleotemplada	Mesofan.	V-VII	2-6 m	M	M
<i>Samolus valerandi</i> L., Sp. Pl.: 171. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	V-IX	5-30 cm	C	C
<i>Sanguisorba minor</i> Scop., Fl. Camiol., ed. 2, 1: 110. 1771	Holártica	Hemic.-esc.	IV-IX	1-5 dm	R	R
<i>Sanguisorba rupicola</i> (Boiss. & Reut.) A. Braun & C. D. Bouché, Append. Sp. Nov. Hort. Berol.: 11. 1867	Mediterránea W	Hemic.-ros (Caméf.-sufr.)	II-VI	1-4 dm	M	M
<i>Sanguisorba verrucosa</i> (G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2: Ad Tab. S. Dodecandrae. 1842	Mediterránea-Macaronésica	Hemic.-esc.	IV-IX	1-5 dm	CC	CC
<i>Santolina ericoides</i> Poir. in Lamarck, Encycl. 6: 504. 1805	Mediterránea W	Caméf.-sufr.	V-VII	2-5 dm	C	C
<i>Saponaria ocymoides</i> L., Sp. Pl.: 409. 1753	Mediterránea N	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M
<i>Saponaria officinalis</i> L., Sp. Pl.: 408. 1753	Euroiberiana	Hemic.-esc.	VI-VIII	3-8 dm	R	R
						A (Cult.-Nat.)

<i>Sarcocapnos enneaphylla</i> (L.) DC., Syst. Nat. 2: 129. 1821	Mediterránea W	Hemic.-esc. (Caméf.-sufr.)	I-X	5-25 cm	M	M	
<i>Satureja innota</i> (Pau) G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 38: 393. 1981 publ. 1982	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	VII-X	2-5 dm	M	M	
<i>Satureja intricata</i> subsp. <i>gracilis</i> (Willk.) Rivas Mart. ex G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202. 1984	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	VII-XI	1-4 dm	M	M	
<i>Satureja intricata</i> var. <i>gracilis</i> (Willk.) R. Morales, G. López & Sánchez-Gómez, Fl. Iber. 12: 419. 2010							
<i>Satureja montana</i> L., Sp. Pl.: 568. 1753	Mediterránea N	Caméf.-sufr.	VII-IX	15-40 cm	R	R	
<i>Saxifraga carpetana</i> Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 12. 1842	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	RR	RR	VI
<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (Boiss. & Reuter) D. A. Webb in Feddes Repert. 68: 203. 1963	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Saxifraga cuneata</i> subsp. <i>paniculata</i> (Pau) Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430. 1995	Iberolevantina	Hemic.-esc.	V-VII	1-3 dm	R	R	
<i>Saxifraga fragilis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Pau) Muñoz Garm. & P. Vargas, Anales Jard. Bot. Madrid 47: 279. 1989 publ. 1990							
<i>Saxifraga latepetiolata</i> Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 120. 1874	Iberolevantina	Hemic.-bien.	IV-VI	8-25 cm	R	R	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L., Sp. Pl., ed. 1: 404. 1753	Holarctica	Teróf.-esc.	II-V	2-15 cm	M	M	
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L., Sp. Pl.: 100. 1753	Circunmediterránea	Hemic.-esc.	I-XII	2-8 dm	CC	CC	
<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>affinis</i> (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 344. 1879	Circunmediterránea	Hemic.-esc.	VI-IX	3-8 dm	M	M	

<i>Scabiosa turalensis</i> Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 74. 1893	Iberolevantina	Hemic.-esc.	VII-IX	2-6 dm	R	M	
<i>Scandix australis</i> L., Sp. Pl.: 257. 1753	Mediterránea SW	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Scandix pecten-veneris</i> (L.) Thell. in J. Bot. (Morot) 8: 289. 1894	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-V	5-30 cm	M	M	
<i>Scandix stellata</i> Banks & Sol. in Russell. Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 249. 1794	Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell. in J. Bot. (Morot) 8: 289. 1894	Mediterránea-Iranotur-miana	Teróf.-esc.	II-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> subsp. <i>glau-cus</i> (Sm) Luccho & Marín, Anales Bot. Jahrb. Syst. 10: 299. 1888	Eurosiberiana	Geóf.-riz.	V-VII	5-15 dm	RR	R	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299. 1888	Eurosiberiana	Geóf.-riz.	V-VII	5-15 dm	RR	R	
<i>Schoenoplectus littoralis</i> (Schrad.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299. 1888	Subcosmopolita	Geóf.-riz. (Hi-dr.-rad.)	V-VII	5-15 dm	R	R	
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 38: 49. 1888	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	VII-IX	4-20 cm	R	R	
<i>Schoenus nigricans</i> L., Sp. Pl.: 43. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-cesp.	III-VII	2-6 dm	M	M	
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják in Sborn. Nár. Mus. V Praze, Rada B, Přír. Vedy 140: 127. 1972	Paleotemplada	Geóf.-riz.	V-VII	6-20 dm	CC	CC	

<i>Scirpus lacustris</i> L., Sp. Pl.: 48. 1753	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299. 1888	Subcosmopolita	Geórf.-riz. (Hidr.-rad.)	V-VII	1-3 m	R	R	
<i>Scleranthus delortii</i> Gren. in F. W. Schultz. Arch. Fl. France Allem.: 206. 1852		Paleotemplada	Terórf.-esc.	III-VII	2-8 cm	RR	R	
<i>Scleranthus polycarpus</i> L., Cent. Pl. 2: 16. 1756	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 109. 1894	Mediterránea-Atlántica	Terórf.-esc.	IV-VII	5-18 cm	RR	R	
<i>Scolymus hispanicus</i> L., Sp. Pl.: 813. 1753		Circummediterránea	Hemic.-bien.	V-VIII	2-10 dm	C	C	
<i>Scolymus maculatus</i> L., Sp. Pl.: 813. 1753		Mediterránea S	Terórf.-esc.	V-VII	2-8 dm	M	M	
<i>Scorpiurus subvillosus</i> L., Sp. Pl.: 745. 1753	<i>Scorpiurus muricatus</i> L., Sp. Pl.: 745. 1753	Circummediterránea	Terórf.-esc.	III-V	1-3 dm	M	M	
<i>Scorpiurus sulcatus</i> L., Sp. Pl.: 745. 1753	<i>Scorpiurus muricatus</i> L., Sp. Pl.: 745. 1753	Circummediterránea	Terórf.-esc.	III-V	1-3 dm	C	C	
<i>Scorzonera angustifolia</i> L., Sp. Pl.: 791. 1753		Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Scorzonera hirsuta</i> (Gouan) L., Mant. Pl.: 278. 1771	<i>Gelasia hirsuta</i> (Gouan) Zaika, Sukhor. & N. Kilian, PhytotKeys 137: 57. 2020	Mediterránea NW	Hemic.-esc.	V-VII	2-4 dm	R	R	
<i>Scorzonera hispanica</i> L., Sp. Pl.: 791. 1753	<i>Pseudopodospermum hispanicum</i> (L.) Zaika, Sukhor. & N. Kilian, PhytotKeys 137: 68. 2020	Iberolevantina	Terórf.-esc. (Hemic.-bien.)	IV-VI	1-4 dm	RR	M	
<i>Scorzonera laciniata</i> L., Sp. Pl.: 791. 1753		Paleotemplada	Terórf.-esc. (Hemic.-bien.)	IV-VI	1-4 dm	C	C	

<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>pseudauriculata</i> (Sennen) O. Bolós & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97. 1983	<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>valentina</i> (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm., Fl. Iber. 13: 111. 2009	Iberolevantina	Hemic.-esc.	VI-IX	4-12 dm	C	C	
<i>Scrophularia canina</i> L., Sp. Pl.: 621. 1753		Circummediterránea	Caméf.-suffr.	IV-VII	3-8 dm	M	M	
<i>Scrophularia tanacetifolia</i> Willd. in Hort. Berol. 1: t. 56. 1805		Iberolevantina	Hemic.-esc. (Caméf.-suffr.)	IV-VII	4-10 dm	M	M	
<i>Sedum acre</i> L., Sp. Pl.: 432. 1753		Paleotemplada	Caméf.-suc.	V-VII	3-10 cm	M	M	
<i>Sedum album</i> L., Sp. Pl.: 432. 1753		Holártica	Caméf.-suc.	V-VII	5-20 cm	C	C	
<i>Sedum amplexicaule</i> DC., Rapp. Voy. Bot.: 80. 1808	<i>Petrosedum amplexicaule</i> (DC.) Velayos, Anales Jard. Bot. Madrid 45: 584. 1988 publ. 1989	Circummediterránea	Caméf.-suc.	V-VII	5-15 cm	R	R	
<i>Sedum brevifolium</i> DC., Rapp. Voy. Bot. 2: 79. 1808		Mediterránea W	Caméf.-suc.	V-VII	4-12 cm	RR	R	
<i>Sedum cespitosum</i> (Cav.) DC., Prodr. 3: 406. 1828		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-V	1-4 cm	R	R	
<i>Sedum dasyphyllum</i> L., Sp. Pl.: 431. 1753 subsp. <i>dasyphyllum</i>		Circummediterránea	Caméf.-suc.	V-VII	4-15 cm	C	C	
<i>Sedum dasyphyllum</i> subsp. <i>glanduliferum</i> (Guss.) Nymán, Consp. Fl. Eur.: 263. 1879	<i>Sedum dasyphyllum</i> L., Sp. Pl.: 431. 1753	Mediterránea W	Caméf.-suc.	V-VII	4-15 cm	M	M	
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246. 1909	<i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich, Preslia 56: 41. 1984	Mediterránea	Caméf.-suc.	VI-VIII	1-4 dm	CC	CC	
<i>Senecio doria</i> L., Syst. Nat., ed. 10: 1215. 1759		Mediterránea N	Hemic.-esc.	VII-IX	8-18 dm	R	R	
<i>Senecio gallicus</i> Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67. 1785		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	1-4 dm	C	C	

<i>Senecio vulgaris</i> L., Sp. Pl.: 867. 1753	Cosmopolita	Teróf.-esc.	I-XII	5-25 cm	CC	CC	
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 321. 1986	Mediterránea	Teróf.-esc	V-VII	1-2 dm	RR	R	
<i>Seseli montanum</i> L., Sp. Pl.: 260. 1753	Mediterránea N	Hemic.-esc.	VII-X	1-6 dm	R	M	
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 51. 1812	Paleotemplada	Teróf.-esc.	VI-X	1-5 dm	R	R	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 51. 1812	Paleotropical	Teróf.-esc.	VI-X	2-5 dm	R	R	
<i>Sherardia arvensis</i> L., Sp. Pl., ed. 1: 102. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	
<i>Sideritis xmurica</i> nothosubsp. <i>medievalina</i> M.B. Crespo & E. Laguna, Flora Montiber. 6: 87. 1997	Iberolevantina	Caméf.-sufi.	III-VII	2-5 dm	RR	RR	
<i>Sideritis xvalentina</i> nothosubsp. <i>rierae</i> P.P. Ferrer, E. Laguna, Gómez Nav. & Peris, Flora Montiber. 67: 126. 2017	Iberolevantina	Caméf.-sufi.	III-VII	2-5 dm	RR	RR	
<i>Sideritis xvalentina</i> nothosubsp. <i>roselloi</i> P.P. Ferrer, E. Laguna, Gómez Nav. & Peris, Flora Montiber. 67: 126. 2017	Iberolevantina	Caméf.-sufi.	III-VII	2-5 dm	RR	RR	
<i>Sideritis hirsuta</i> L., Sp. Pl.: 575. 1753	Mediterránea W	Caméf.-sufi.	IV-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Sideritis incana</i> L., Sp. Pl.: 575. 1753	Mediterránea SW	Caméf.-sufi.	V-VII	2-4 dm	M	M	
<i>Sideritis montana</i> subsp. <i>eburacea</i> (Asso) Murb., Acta Univ. Lund. 34(7): 35. 1898	Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VI	5-20 cm	R	R	
<i>Sideritis regimontana</i> subsp. <i>edetana</i> (Pau) ex Font Quer) M.B. Crespo & Mateo, Flora Montiber. 58: 30. 2014	Iberolevantina	Caméf.-sufi.	V-VII	2-4 dm	R	R	

<i>Sideritis romana</i> L., Sp. Pl.: 575. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-20 cm	M	M
<i>Sideritis tragoriganum</i> Lag., Gen. Sp. Pl.: 18. 1816 subsp. <i>tragoriganum</i>		Iberolevantina	Caméf.-sufir.	III-VII	2-5 dm	C	C
<i>Sideritis tragoriganum</i> subsp. <i>mu-gronensis</i> (Borja) Obón & D. Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 365. 1994	<i>Sideritis tragoriganum</i> Lag., Gen. Sp. Pl.: 18. 1816 subsp. <i>tragoriganum</i>	Iberolevantina	Caméf.-sufir.	III-VII	2-5 dm	R	C
<i>Silene colorata</i> Poit., Voy. Barbarie 2: 163. 1789		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	M	M
<i>Silene conica</i> L., Sp. Pl.: 418. 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VI	3-25 cm	M	M
<i>Silene conoidea</i> L., Sp. Pl.: 418. 1753		Mediterránea-Iranoturmiana	Teróf.-esc.	V-VII	2-4 dm	M	M
<i>Silene diversifolia</i> Oth in DC., Prodr. 1: 378. 1824		Mediterránea-Iranoturmiana	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	C	C
<i>Silene gallica</i> L., Sp. Pl.: 417. 1753		Subcosmopolita	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	R	R
<i>Silene inaperta</i> L., Sp. Pl.: 419. 1753		Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VII	2-5 dm	R	R
<i>Silene latifolia</i> Poit., Voy. Barbarie 2: 165. 1789		Holártica	Hemic.-esc.	III-VI	3-8 dm	M	M
<i>Silene legionensis</i> Lag., Gen. Sp. Pl.: 14. 1816		Mediterránea W	Hemic.-ros.	VI-IX	2-4 dm	R	R
<i>Silene mellifera</i> Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève n.s., 38: 200. 1842		Iberolevantina	Hemic.-ros.	IV-VI	3-7 dm	M	M
<i>Silene muscipula</i> L., Sp. Pl.: 420. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	2-5 dm	M	M
<i>Silene nocturna</i> L., Sp. Pl.: 416. 1753		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VII	2-6 dm	C	C
<i>Silene nutans</i> L., Sp. Pl.: 417. 1753		Eurosiberiana	Hemic.-ros.	V-VII	2-7 dm	R	R
<i>Silene oropetium</i> Coss., Ill. Fl. Atlant. 1: 132. 1891		Mediterránea SW	Teróf.-esc.	IV-VII	1-3 dm	RR	RR

<i>Silene portensis</i> L., Sp. Pl., ed. 2: 600. 1762		Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VII	1-4 dm	RR	RR	
<i>Silene saxifraga</i> L., Sp. Pl.: 421. 1753		Mediterránea N	Caméf.-sufr.	V-VII	8-25 cm	R	R	
<i>Silene sclerocarpa</i> Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 245. 1860		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-V	5-25 cm	M	M	
<i>Silene tridentata</i> Desf. Fl. Atlant. 1: 349. 1798		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	5-25 cm	M	M	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Gareke, Fl. Nord-Mittel-Deutschl., ed. 6: 64. 1863		Paleotemplada	Hemic.-esc.	IV-VII	2-6 dm	CC	CC	
<i>Silybum eburneum</i> Coss. & Durieu in Bull. Soc. Bot. France 2: 366. 1855		Mediterránea SW	Hemic.-bien.	IV-VI	3-12 dm	RR	R	
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378. 1791		Mediter- ránea-Iranotura- niana	Hemic.-bien.	IV-VI	4-15 dm	M	M	
<i>Sinapis alba</i> subsp. <i>mairei</i> (H. Lindb.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 197. 1933		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	2-6 dm	R	R	
<i>Sinapis arvensis</i> L., Sp. Pl.: 668. 1753	<i>Mutarda arvensis</i> (L.) D. A. German, Turczaninowia 25(2): 56. 2022	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-IX	2-6 dm	M	M	
<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach in Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426. 1838		Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VII	1-3 dm	RR	R	
<i>Sisymbrium austriacum</i> subsp. <i>con-tortum</i> (Cav.) Rouy & Foucaud in Rouy, Fl. France 2: 19. 1895	<i>Sisymbrium hispani-cum</i> Jacq., Collectanea 1: 69. 1787	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VII	3-8 dm	RR	RR	
<i>Sisymbrium crassifolium</i> Cav., Deser. Pl.: 437. 1802 subsp. <i>crassifolium</i>		Mediterránea SW	Hemic.-bien.	IV-VI	3-6 dm	M	M	
<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (Boiss.) O. Bolos & Vigo, Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., Secc. Bot. 38(1): 73. 1974	<i>Sisymbrium crassifo-lium</i> Cav., Deser. Pl.: 437. 1802	Iberolevantina	Hemic.-bien. (esc.)	IV-VI	3-8 dm	M	M	

<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf., Fl. Atlant. 2: 84. 1798	Mediterránea S	Teróf.-esc.	II-V	2-5 dm	M	M
<i>Sisymbrium irio</i> L., Sp. Pl.: 659. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-V	1-5 dm	CC	CC
<i>Sisymbrium macroloma</i> Pomel in Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.: 368. 1875	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VI	8-16 dm	RR	R
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., in Scopoli, Fl. Carniol., ed. 2, 2: 26. 1772	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	2-6 dm	M	M
<i>Sisymbrium orientale</i> L., Cent. Pl. II.: 24. 1756	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	III-VI	3-8 dm	C	C
<i>Sisymbrium runcinatum</i> DC. in Candolle, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 478. 1821	Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-esc.	IV-VI	1-5 dm	M	M
<i>Dichasanthus runcinatus</i> (Lag. ex DC.) V.I. Dorof., Konspekt Fl. Kavkaza 3(2): 450. 2012						
<i>Smilax aspera</i> L., Sp. Pl.: 1028. 1753	Mediterránea-Paleotropical	Fan.-escand.	VII-X	1-5 m	M	C
<i>Solanum dulcamara</i> L., Sp. Pl.: 185. 1753	Paleotemplada	Fan.-escand.	V-IX	4-25 dm	M	M
<i>Solanum lycopersicum</i> L., Sp. Pl.: 185. 1753	Neotropical	Teróf.-esc.	VII-X	3-10 dm	R	R
<i>Solanum nigrum</i> L., Sp. Pl.: 186. 1753	Cosmopolita	Teróf.-esc.	I-XII	1-6 dm	CC	CC
<i>Solanum tuberosum</i> L., Sp. Pl.: 185. 1753	Neotropical	Geóf.-tub.	VI-X	3-7 dm	RR	R
<i>Solidago virgaurea</i> L., Sp. Pl.: 880. 1753	Holártica	Hemic.-esc.	VII-X	2-6 dm	M	M
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47. 1769	Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-XII	2-5 dm	C	C

<i>Sonchus maritimus</i> subsp. <i>aqualis</i> (Pour.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 434. 1879	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-X	2-6 dm	C	C	
<i>Sonchus oleraceus</i> L., Sp. Pl.: 794. 1753	Subcosmopolita	Teróf. (Hemic.)- esc.	I-XII	2-6 dm	CC	CC	
<i>Sonchus tenerrimus</i> L., Sp. Pl.: 794. 1753	Circummediterránea	Teróf. (Hemic.)- esc.	I-XII	2-6 dm	CC	CC	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, Stürp. Austr. Fasc. 2: 46. 1763	Paleotemplada	Mesofan.	V-VI	1-8 m	RR	RR	
<i>Sorbus domestica</i> L., Sp. Pl.: 477. 1753	Eurosiberiana S	Macro (Meso)- fan.	IV-VI	5-15 m	RR	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, Stürp. Austr. Fasc. 2: 45. 1763	Paleotemplada	Meso (Macro)- fan.	IV-V	4-15 m	RR	RR	V1
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101. 1805	Paleotropical	Geóf.-riz.	VI-X	3-16 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>ne- glectum</i> (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & Keller, Fl. Schweiz, ed. 3, 1: 26. 1909	Paleotemplada	Hidróf.-rad.	VI-VIII	5-15 dm	RR	R	
<i>Spartium junceum</i> L., Sp. Pl.: 708. 1753	Circummediterránea	Nanofan.	III-VI	8-25 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Spergula pentandra</i> L., Sp. Pl.: 440. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	II-V	5-30 cm	R	R	
<i>Spergularia bocconei</i> (Scheele) Asch. & Gracbn., Syn. Mitteleur. Fl. 5: (1) 849. 1919	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-VI	1-2 dm	R	M	
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Boiss., Fl. Orient. 1: 733. 1867	Mediterránea-Iranoturana miana	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	M	M	

<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl, Fl. Sicul.: 161. 1826		Subcosmopolita	Caméf.-sufr.	IV-IX	1-3 dm	M	M
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 94. 1819		Holártica	Caméf.-sufr.	IV-IX	1-3 dm	R	R
<i>Sphenopus divaricatus</i> (Gouan) Rehb., Fl. Germ. Excurs.: 45. 1830		Mediterránea-Iranoturani niana	Teróf.-esc.	IV-V	5-25 cm	R	R
<i>Spinacia oleracea</i> L., Sp. Pl.: 1027. 1753		Iranoturani niana	Teróf.-esc.	VI-X	3-6 dm	RR	RR
<i>Stachys heraclea</i> All., Fl. Pedem. 1: 31. 1785		Mediterránea NW	Hemic.-esc.	V-VII	2-5 dm	RR	R
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis., Prosp. Fl. Eugán.: 26. 1842	<i>Betonica officinalis</i> L., Sp. Pl.: 573. 1753	Euroiberiana	Hemic.-esc.	VI-VIII	2-5 dm	RR	R
<i>Stachelina dubia</i> L., Sp. Pl.: 840. 1753		Mediterránea W	Caméf.-sufr.	V-VII	2-4 dm	M	M
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo, Essent. Pl. Char. Comment.: 36. 1784		Paleotemplada	Teróf.-esc.	I-XII	1-4 dm	C	C
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 794. 1891		Tropical	Geóf.-riz.	VII-X	1-4 dm	RR	M A (Cult.-Nat.)
<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng., Syst. Veg. 2: 57. 1825		Mediterránea E	Geóf.-bulb.	IX-X	5-10 cm	RR	RR A (Cult.-Nat.)
<i>Stipa barbata</i> Desf., Fl. Atlant. 1: 97, t. 27. 1798		Circummediterránea	Hemic.-cesp.	V-VI	3-6 dm	RR	RR PNC
<i>Stipa iberica</i> Martinovský in Feddes Repert. 73: 150. 1966		Mediterránea W	Hemic.-cesp.	V-VI	2-8 dm	M	M
<i>Stipa lagascae</i> Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 333. 1817		Mediterránea SW	Hemic.-cesp.	IV-VI	2-8 dm	R	R
<i>Stipa offneri</i> Breistr. in Procès-Verbaux Soc. Dauphin. Études Biol. Bio-Club., ser. 3, 13: 2. 1950		Mediterránea W	Hemic.-cesp.	IV-VI	3-10 dm	CC	CC

<i>Stipa parviflora</i> Desf., Fl. Atlant. 1: 98, t. 29. 1798	<i>Achnatherum parviflorum</i> (Desf.) M. Nobs, Ann. Missouri Bot. Gard. 105: 39. 2020	Mediterránea W	Hemic.-cesp.	III-V	3-8 dm	R	R	
<i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 38. 1934		Mediterránea-Iranoturmiana	Teróf.-esc.	V-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Tamarix africana</i> Poir., Voy. Barbare 2: 139. 1789		Circunmediterránea	Mesofan.	V-VI	2-5 m	R	R	
<i>Tamarix gallica</i> L., Sp. Pl.: 270. 1753		Mediterránea W	Mesofan.	IV-VI	2-5 m	M	M	
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip., Tanacetum: 57. 1844		Circunmediterránea	Hemic.-esc.	IV-VII	2-6 dm	M	M	
<i>Taraxacum colummare</i> Pau ex Hand-Mazz., Oesterr. Bot. Z. 72: 259. 1923		Mediterránea W	Hemic.-ros.	II-V	5-15 cm	R	R	
<i>Taraxacum dubium</i> Soest in Melhoramento 22: 84. 1970		Mediterránea W	Hemic.-ros.	II-V	5-15 cm	R	R	
<i>Taraxacum marginellum</i> H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 171. 1932		Paleotemplada	Hemic.-ros.	II-V	5-15 cm	M	M	
<i>Taraxacum obovatum</i> (Willd.) DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dépt. Seine 11: 15. 1808		Mediterránea W	Hemic.-ros.	III-VI	5-15 cm	C	C	
<i>Taraxacum pyropappum</i> Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 19. 1842		Mediterránea W	Hemic.-ros.	III-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Taxus baccata</i> L., Sp. Pl.: 1040. 1753		Euroiberiana	Macrofan.	III-V	2-10 m	RR	RR	VI
<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J. P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289. 1912		Circunmediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	2-12 cm	RR	RR	VI
<i>Telephium imperati</i> L., Sp. Pl.: 271. 1753		Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323. 1788	<i>Lotus maritimus</i> L., Sp. Pl.: 773. 1753	Holártica	Hemic.-esc.	IV-VII	1-4 dm	M	M	

<i>Teucrium</i> × <i>coeleste</i> Schreb., Pl. Ver-ticill. Unilab. Gen. Sp.: 49. 1774	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	III-VI	1-3 dm	RR	RR	
<i>Teucrium</i> × <i>guarae-requense</i> P.P. Ferrer, E. Laguna, Gómez Nav., R. Roselló & J.B. Peris, Collect. Bot. (Barcelona) 31: 30. 2012	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	III-VI	1-3 dm	RR	RR	
<i>Teucrium</i> × <i>jaraguense</i> P.P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & J.B. Peris, Flora Montiber. 84: 56. 2024	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-VIII	5-15 cm	RR	RR	
<i>Teucrium</i> × <i>robledoi</i> De la Torre & Alcaraz, Acta Bot. Malac. 17: 136. 1992	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	III-VI	1-3 dm	RR	RR	
<i>Teucrium angustissimum</i> Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 49. 1774	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-VII	1-4 dm	RR	R	
<i>Teucrium botrys</i> L., Sp. Pl.: 562. 1753	Circunmediterránea	Teróf.-esc	V-VII	5-20 cm	RR	R	
<i>Teucrium capitatum</i> L., Sp. Pl.: 566. 1753	Circunmediterránea	Caméf.-sufr.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>pinnatifidum</i> (Sennen) Rech. f., Bot. Arch. 42: 383. 1941	Mediterránea W	Caméf.-sufr. (Geóf.-riz)	VI-VIII	1-3 dm	M	M	
<i>Teucrium expansum</i> Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 14. 1889	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-VIII	5-15 cm	M	M	
<i>Teucrium gnaphalodes</i> L'Hér., Stirp. Nov.: 84. 1788	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VII	5-25 cm	R	R	
<i>Teucrium meridionale</i> (P.P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav., E. Laguna & J.B. Peris) P.P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & J.B. Peris, Flora Montiber. 88: 57. 2024	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-VIII	5-15 cm	R	M	
<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L., Sp. Pl.: 562. 1753	Mediterránea W	Caméf.-sufr.	III-VI	1-3 dm	C	C	
<i>Teucrium pugionifolium</i> Pau in Act. Soc. Esp. Hist. Nat.: 199. 1897	Iberolevantina	Caméf.sufr	VI-VII	1-3 dm	RR	RR	VI

<i>Teucrium romigeri</i> Sennen, Bull. Soc. Iber. Ci. Nat. 30(13): 47. 1931	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Teucrium scordium</i> L., Sp. Pl.: 565. 1753	Paleotemplada	Hemic.-estol.	VI-VIII	1-4 dm	R	R	
<i>Teucrium thymifolium</i> Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 50. 1774	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	V-VII	3-25 cm	M	M	
<i>Teucrium valentinum</i> Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 46. 1774 subsp. <i>valentinum</i>	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Teucrium valentinum</i> subsp. <i>gracillimum</i> (Rouy) P.P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & J.B. Peris, Flora Montiber. 88: 57. 2024	Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Thalictrum tuberosum</i> L., Sp. Pl.: 545. 1753	Mediterránea NW	Geóf.-tub.	IV-VI	2-6 dm	M	M	
<i>Thapsia dissecta</i> (Boiss.) Arán & Mateo in Flora Montiber. 20: 17. 2002	Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	3-18 dm	R	R	
<i>Thapsia villosa</i> L., Sp. Pl.: 261. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	V-VII	3-18 dm	M	M	
<i>Thesium divaricatum</i> Mert. & W. D. J. Koch in Röhl. Deutschl. Fl., ed. 3, 2: 285. 1826	Circunmediterránea	Hemic.-esc.	IV-VII	1-4 dm	RR	M	
<i>Thesium humifusum</i> DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franc., ed. 3, 5: 366. 1815	Circunmediterránea	Hemic.-esc. (Caméf.-sufr.)	IV-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., Sp. Pl. 2: 646. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-V	5-25 cm	M	M	

<i>Thlaspi stenopterum</i> Boiss. & Reut. in Boissier, Diagn. Pl. Orient. Nov. 2(8): 40. 1849	<i>Nocca stenoptera</i> (Boiss. & Reut.) F.K. Mey., Feddes Reper. 84: 461. 1973	Iberolevantina	Hemic.-esc.	III-V	5-25 cm	RR	RR	
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Paris, ed. 2: 360. 1859		Paleotemplada	Terof.-esc.	VI-X	1-5 dm	RR	R	
<i>Thymelaea pubescens</i> (L.) Meisn. in Candolle, Prodr. 14: 558. 1857		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	IV-VII	5-25 cm	M	M	
<i>Thymelaea tinctoria</i> (Pourr.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4: 66. 1848		Mediterránea NW	Caméf.-sufr.	II-V	2-5 dm	RR	R	
<i>Thymus ×armuniae</i> Morales, Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 94. 1984		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	I-XII	1-4 dm	RR	RR	
<i>Thymus ×josephi-angeli</i> nothosubsp. <i>edetanus</i> Mateo, M.B. Crespo & E. Laguna, Anales Jard. Bot. Madrid 49(1): 140. 1991		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	I-XII	1-4 dm	RR	RR	
<i>Thymus ×monrealensis</i> nothosubsp. <i>conquensis</i> Mateo & Arán, Flora Montiber 4: 35. 1996		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	I-XII	1-4 dm	RR	RR	
<i>Thymus lacaitae</i> Pau, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71. 1929		Iberolevantina	Caméf.-rept.	V-VII	5-20 cm	RR	RR	PNC
<i>Thymus leptophyllus</i> Lange, Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd. 1893: 198. 1893		Iberolevantina	Caméf.-rept.	IV-VII	4-15 cm	RR	RR	
<i>Thymus mastichina</i> (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827. 1763		Iberolevantina	Caméf.-frut.	V-VII	2-5 dm	RR	RR	
<i>Thymus piperella</i> L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 400. 1767		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	VII-XI	1-4 dm	R	M	
<i>Thymus vulgaris</i> L., Sp. Pl.: 591. 1753 subsp. <i>vulgaris</i>		Iberolevantina	Caméf.-sufr.	VI-XI	1-4 dm	CC	CC	
<i>Thymus vulgaris</i> subsp. <i>aestivus</i> (Reut. ex Willk. & Lange) A. Bolòs & O. Bolòs, Misc. Fontserre: 95. 1961		Mediterránea W	Caméf.-sufr.	I-XII	1-4 dm	CC	CC	

<i>Thymus zygis</i> subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales, Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93. 1984	Mediterránea SW	Caméf.-sufi.	V-VIII	5-25 cm	R	R	
<i>Tolpis umbellata</i> Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133. 1803	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265. 1821 subsp. <i>arvensis</i>	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	V-VIII	2-7 dm	R	R	
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>neglecta</i> (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 1055. 1926	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	V-VIII	2-7 dm	C	C	
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>recta</i> Jury in Lagasalia 18: 282. 1996	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	IV-VII	3-10 dm	M	M	
<i>Torilis elongata</i> (Hoffmanns. & Link) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 154. 1921	Mediterránea W	Teróf.-esc.	V-VIII	2-7 dm	R	R	
<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb. f. in Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83. 1866	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	M	M	
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn. Fruct. Sem. Pl. 1: 82. 1788	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	IV-IX	2-5 dm	M	M	
<i>Torilis pseudonodosa</i> Bianca, Giorn. Gab. Lett. Accad. Gioenia, ser. 2, 3: 31. 1846	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	III-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Trachelium caeruleum</i> L., Sp. Pl.: 171. 1753	Mediterránea W	Hemic.-esc.	VI-XI	2-8 dm	M	M	
<i>Tragopogon castellanus</i> Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 26. 1881	Mediterránea W	Hemic.-bien.	IV-VI	3-6 dm	RR	R	

<i>Tragopogon dubius</i> Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2: 95, 1772		Mediterránea-Iranoturana	Hemic.-bien. (Teróf.-esc.)	IV-VI	3-7 dm	C	C
<i>Tragopogon porrifolius</i> L., Sp. Pl.: 789, 1753		Circummediterránea	Hemic.-bien.	IV-VI	3-6 dm	M	M
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All., Fl. Pedem. 2: 241, 1785		Subtropical	Teróf.esc.	VIII-XI	1-3 dm	RR	R
<i>Tribulus terrestris</i> L., Sp. Pl.: 387, 1753		Mediterránea-Iranoturana	Teróf.-rept.	V-X	2-8 dm	M	M
<i>Trifolium angustifolium</i> L., Sp. Pl.: 769, 1753		Mediterránea-Atlántica	Teróf.-esc.	IV-VI	2-5 dm	M	M
<i>Trifolium arvense</i> L., Sp. Pl.: 769, 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	5-35 cm	M	M
<i>Trifolium campestre</i> Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. Abth. 1: 16, 1804		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	5-30 cm	C	C
<i>Trifolium fragiferum</i> L., Sp. Pl.: 772, 1753		Paleotemplada	Hemic.-cesp.	IV-VIII	5-25 cm	M	M
<i>Trifolium glomeratum</i> L., Sp. Pl.: 770, 1753		Mediterráneo-Atlántico	Teróf.esc.	III-VI	3-35 cm	R	R
<i>Trifolium lappaceum</i> L., Sp. Pl.: 768, 1753		Mediterránea	Térof.esc.	IV-VII	1-4 dm	R	R
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., Fl. Angl.: 283, 1762		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	V-VII	2-5 dm	R	R
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., Sp. Pl.: 766, 1753		Mediterránea-Atlántica	Teróf.-esc. (rept.)	IV-VI	5-30 cm	RR	RR
<i>Trifolium pratense</i> L., Sp. Pl.: 768, 1753		Subcosmopolita	Hemic.-esc.	IV-X	2-6 dm	C	C
<i>Trifolium repens</i> L., Sp. Pl.: 767, 1753		Subcosmopolita	Hemic.-cesp.	III-X	5-30 cm	C	C
<i>Trifolium scabrum</i> L., Sp. Pl.: 770, 1753		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C

<i>Trifolium striatum</i> subsp. <i>brevidens</i> (Lange) Muñoz Rodr., Acta Bot. Malac. 17: 100. 192	<i>Trifolium striatum</i> L., Sp. Pl.: 770. 1753	Paletemplada	Teróf.-esc.		V-VII	1-4 dm	R	R	
<i>Trifolium tomentosum</i> L., Sp. Pl.: 771. 1753		Mediterránea	Teróf.esc.		III-VI	4-20 cm	R	R	
<i>Trigonella gladiata</i> M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 222. 1808		Circunmediterránea	Teróf.-esc.		III-VI	5-20 cm	R	R	
<i>Trigonella monspeliaca</i> L., Sp. Pl.: 777. 1753	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv., Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 272. 1841	Mediter-ránea-Iranotura-niana	Teróf.-esc.		III-VII	5-25 cm	C	C	
<i>Trigonella polyceratia</i> L., Sp. Pl.: 777. 1753	<i>Medicago polyceratia</i> (L.) Sauvages ex Trautv., Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 272. 1841	Mediterránea W	Teróf.-esc.		IV-VII	1-4 dm	C	C	
<i>Trisetum scabriusculum</i> (Lag.) Willk. in Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 73. 1861	<i>Trisetaria scabriuscula</i> (Lag.) Paunero, Anales Jard. Bot. Madrid 9: 519. 1950	Mediterránea W	Teróf.-esc.		V-VII	1-3 dm	RR	R	
<i>Triticum aestivum</i> L., Sp. Pl.: 85. 1753		Iranoturaniana	Teróf.-esc.		IV-VII	4-12 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Triticum turgidum</i> L., Sp. Pl.: 86. 1753		Iranoturaniana	Teróf.-esc.		IV-VII	4-12 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Four. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 16: 340. 1868		Circunmediterránea	Teróf.-esc.		IV-VI	5-35 cm	M	M	
<i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp. in Bol. Soc. Brot., ser. 2, 1: 128. 1922		Mediterránea W	Hemic.-ros.		IV-VI	2-4 dm	R	R	
<i>Tulipa australis</i> Link, J. Bot. (Schrader) 2: 317. 1799	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1914: 13. 1914	Mediterránea W	Geóf.-bulb.		IV-VI	2-4 dm	M	M	

<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59. 1814	Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	1-4 dm	M	M
<i>Tussilago farfara</i> L., Sp. Pl.: 865. 1753	Paleotemplada	Geóf.-riz.	II-IV	1-3 dm	M	M
<i>Typha angustifolia</i> L., Sp. Pl.: 971. 1753	Holártica	Hidrof.-rad. (Geóf.-riz.)	VI-VII	1-3 m	R	R
<i>Typha domingensis</i> Pers., Syn. Pl. 2: 532. 1807	Subcosmopolita	Hidrof.-rad. (Geóf.-riz.)	VI-VII	1-2 m	C	C
<i>Typha latifolia</i> L., Sp. Pl.: 971. 1753	Subcosmopolita	Hidrof.-rad. (Geóf.-riz.)	VI-VII	1-3 m	M	M
<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 334. 1788	Mediterránea W	Nanofan.	X-V	4-18 dm	C	CC
<i>Ulmus laevis</i> Pall., Fl. Ross. 1(1): 75. 1784	Euroiberiana	Macrofan.	II-III	5-50 m	RR	M A (Cult.-Nat.)
<i>Ulmus minor</i> Mill., Gard. Dict., ed. 8: Ulmus no. 6. 1768	Paleotemplada	Macrofan.	II-III	5-50 m	M	M
<i>Ulmus pumila</i> L., Sp. Pl.: 226. 1753	Paleotemplada	Macrofan.	II-III	5-25 m	RR	R A (Cult.-Nat.)
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy in Ridd., Hedley & W. R. Price, Fl. Gloucestershire: 611. 1948	Paleotemplada	Geóf.-tub.	IV-VII	1-5 dm	M	M
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Ökon. Aufsätze 1: 276. 1795	Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VI	2-4 dm	M	M
<i>Urospermum pictoides</i> (L.) F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Ökon. Aufsätze 1: 275. 1795	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	2-5 dm	C	C
<i>Urtica dioica</i> L., Sp. Pl.: 984. 1753	Subcosmopolita	Hemic.-esc.	III-X	3-15 dm	RR	M
<i>Urtica pilulifera</i> L., Sp. Pl.: 983. 1753	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VII	2-5 dm	M	M
<i>Urtica urens</i> L., Sp. Pl.: 984. 1753	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-IX	1-4 dm	CC	CC

<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496. 1965	<i>Gypsophila vaccaria</i> (L.) Sm. in J. Sibthorp & J.E. Smith, Fl. Graec. Prodr. 1: 279. 1809	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	IV-VII	2-5 dm	M	M	
<i>Valeriana tuberosa</i> L., Sp. Pl.: 33. 1753		Circummediterránea	Hemic.-esc.	IV-VI	1-3 dm	R	R	
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 4: 241. 1805	<i>Valeriana coronata</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: n.º 11. 1768	Holártica	Teróf.-esc.	V-VII	1-3 dm	M	M	
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30. 1776	<i>Valeriana dentata</i> (L.) All., Fl. Pedem. 1: 4. 1785	Circummediterránea	Teróf.-esc.	V-VII	1-3 dm	R	R	
<i>Valerianella discoidea</i> (L.) Loisel., Not. Fl. France. 148. 1810	<i>Valeriana discoidea</i> (L.) Willd., Sp. Pl., ed. 4, 1: 184. 1797	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314. 1809	<i>Valeriana eriocarpa</i> (Desv.) Christenh. & Byng, Global Fl. 4: 148. 2018	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	R	R	
<i>Valerianella multidentata</i> Loscos & J. Pardo in Willkomm, Ser. Inconf. Pl. Aragon: 49. 1863		Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-4 dm	RR	R	
<i>Velezia rigida</i> L., Sp. Pl.: 332. 1753	<i>Dianthus nudiflorus</i> Griff., Not. Pl. Asiat. 4: 466. 1854	Mediterránea-Iranoturaniana	Teróf.-esc.	V-VII	5-15 cm	R	R	
<i>Verbascum blattaria</i> L., Sp. Pl.: 178. 1753		Paleotemplada	Hemic.-esc.	V-VII	4-10 dm	RR	R	
<i>Verbascum boerhavii</i> L., Mant. Pl.: 45. 1767		Mediterránea W	Hemic.-bien.	V-VII	3-12 dm	M	M	
<i>Verbascum rotundifolium</i> subsp. <i>haenseleri</i> (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. 29: (2) 401. 1933		Mediterránea SW	Hemic.-bien.	V-VII	4-14 dm	M	M	

<i>Verbasicum rotundifolium</i> subsp. <i>ri-pacuricum</i> O. Bolós & Vigo in Col-lect. Bot. (Barcelona) 14: 96. 1983	Mediterránea W	Hemic.-bien.	V-VII	4-14 dm	M	M	
<i>Verbasicum sinuatum</i> L., Sp. Pl.: 178. 1753	Mediterránea-Iranotur-mania	Hemic.-bien.	V-VIII	4-10 dm	CC	CC	
<i>Verbasicum thapsus</i> L., Sp. Pl.: 177. 1753	Paleotemplada	Hemic.-bien.	V-VIII	5-15 dm	C	C	
<i>Verbena officinalis</i> L., Sp. Pl.: 20. 1753	Paleotemplada	Hemic.-esc.	V-X	2-7 dm	C	C	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., Sp. Pl.: 12. 1753	Cosmopolita	Hemic.-esc. (Hi-dr.-rad.)	IV-IX	2-6 dm	C	C	
<i>Veronica arvensis</i> L., Sp. Pl.: 13. 1753	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	III-VI	5-30 cm	C	C	
<i>Veronica beccabunga</i> L., Sp. Pl.: 12. 1753	Paleotemplada	Hemic.-rept.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Veronica hederifolia</i> L., Sp. Pl.: 13. 1753	Euroasiática	Teróf.-esc.	II-V	1-6 dm	R	R	
<i>Veronica persica</i> Poir. in Lam. & Poir., Encycl. 8: 542. 1808	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	I-VI	1-5 dm	C	C	
<i>Veronica polita</i> Fr., Nov. Fl. Suec., ed. 1: 63. 1819. 1819	Subcosmopolita	Teróf.-esc.	II-X	5-35 cm	CC	CC	
<i>Veronica praecox</i> All., Auct. Fl. Pedem.: 5. 1789	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-20 cm	M	M	
<i>Veronica tenuifolia</i> Asso, Syn. Stirp. Arag.: 2. T. 1. 1779.	Iberolevantina	Caméf.-sufir.	IV-VII	1-3 dm	R	R	
<i>Veronica triphyllos</i> L., Sp. Pl.: 14. 1753	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	5-18 cm	RR	RR	
<i>Viburnum lantana</i> L., Sp. Pl.: 268. 1753	Eurosiberiana	Mesofan.	IV-VI	1'5-3'5 m	R	R	
<i>Viburnum tinus</i> L., Sp. Pl.: 267. 1753	Circummediterránea	Mesofan.	I-IV	1-4 m	M	M	

<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Roth) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 86. 1894	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309. 1788	Paleotemplada	Hemic.-esc.	IV-VII	3-12 dm	M	M	
<i>Vicia dasycarpa</i> Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81. 1830	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb., Nouv. Fl. Normandie: 181. 1894	Circummediterránea	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	RR	R	
<i>Vicia faba</i> L., Sp. Pl.: 737. 1753		Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614. 1821		Holártica	Teróf.-esc.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Vicia lutea</i> L., Sp. Pl.: 736. 1753		Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Vicia monantha</i> subsp. <i>calcarata</i> (Desf.) Romero Zarco in Anales Iard. Bot. Madrid 57: 223. 1999	<i>Vicia monantha</i> subsp. <i>biflora</i> (Desf.) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 17. 1940	Mediterránea W	Teróf.-esc.	III-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Vicia onobrychitoides</i> L., Sp. Pl.: 735. 1753		Mediterránea-Eu- rosiberiana	Hemic.-esc.	IV-VI	2-5 dm	M	M	
<i>Vicia pannonica</i> Crantz, Stirp. Austr. Fasc., ed. 2: 393. 1769		Paleotemplada	Teróf.-esc.	IV-VII	2-5 dm	M	M	
<i>Vicia parviflora</i> Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73. 1801		Mediterránea-Al- lántica	Teróf.-esc.	III-VI	1-5 dm	M	M	
<i>Vicia peregrina</i> L., Sp. Pl.: 737. 1753		Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	III-VI	1-6 dm	C	C	
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. in Hannover. Mag. 18: 229. 1780		Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-VI	1-5 dm	C	C	
<i>Vicia sativa</i> L., Sp. Pl.: 736. 1753 subsp. <i>sativa</i>		Holártica	Teróf.-esc.	IV-VI	3-8 dm	M	M	

<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>pseudocracca</i> (Bertol.) Rouy, Fl. France 5: 239. 1899	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>ambigua</i> (Guss.) Ker- guélen, Lejeunia, n.s., 120: 183. 1987	Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VI	3-12 dm	M	M	
<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb., Nouv. Fl. Normandie: 181. 1893		Circummediterránea	Teróf.-esc.	III-VII	3-12 dm	M	M	
<i>Vinca difformis</i> Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 337. 1788		Mediterránea W	Caméf.-rept.	II-V	2-8 dm	M	M	
<i>Vinca major</i> L., Sp. Pl.: 209. 1753		Mediterránea N	Caméf.-rept.	III-VI	1-5 dm	R	R	A (Cult.-Nat.)
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>intermedium</i> (Loret & Barrandon) Markgr. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 374. 1971		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	V-VII	1-6 dm	R	R	
<i>Vincetoxicum nigrum</i> (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313. 1802		Mediterránea W	Hemic.-esc.	IV-VII	2-6 dm	M	M	
<i>Viola alba</i> Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1: 171. 1809		Circummediterránea	Hemic.-ros.	II-V	5-15 cm	M	M	
<i>Viola arvensis</i> Murray, Prodr. Stimp. Gott.: 73. 1770 subsp. <i>arvensis</i>		Eurasiática	Teróf.esc	III-V	3-25 cm	R	R	
<i>Viola arvensis</i> subsp. <i>minima</i> (Gau- din) Mateo, M.B. Crespo & E. Lagu- na, Fl. Valentina 5: 233. 2023	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult., J.J. Roemer & J.A. Schultes, Syst. Veg., ed. 15[^{bis}]. 5: 383. 1819	Paleotemplada	Teróf.-esc.	III-V	3-25 cm	M	M	
<i>Viola riviniana</i> Rehb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81. 1823		Eurosiberiana	Hemic.esc	IV-VI	8-25 cm	R	R	
<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt in Neu- ere Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. 1: 60. 1791		Eurosiberiana	Hemic.-esc.	III-VI	4-12 cm	M	M	
<i>Viola wilkommii</i> R. Roem. in Lin- naea 25: 10. 1852		Iberolevantina	Hemic.-esc.	IV-VI	5-25 cm	R	R	

<i>Vitis ×gallica</i> F.M. Vázquez, Folia Bot. Extremadur. 11: 16. 2017		Mediterránea	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Vitis ×goliath</i> Ardenghi, Galasso & Banfi, Phytotaxa 224: 241. 2015		Mediterránea	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Vitis ×hispanica</i> F.M. Vázquez & García Alonso, Folia Bot. Extremadur. 11: 18. 2017		Mediterránea	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Vitis ×instabilis</i> Ardenghi, Galasso, Banfi & Lastrucci, Phytotaxa 166: 182. 2014		Mediterránea	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Vitis ×koberi</i> Ardenghi, Galasso, Banfi & Lastrucci, Phytotaxa 166: 184. 2014		Mediterránea	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Vitis ×ruggerii</i> Ardenghi, Galasso, Banfi & Lastrucci, Phytotaxa 166: 187. 2014		Mediterránea	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Vitis rupestris</i> Scheele, Linnaea 21: 591. 1848		Norteamericana	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	RR	RR	A (Cult.-Nat.)
<i>Vitis vinifera</i> L., Sp. Pl.: 202. 1753 subsp. <i>vinifera</i>		Circunmediterránea	Fan.-escand.	V-VI	1-3 m	M	M	A (Cult.-Nat.)
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100. 1824	<i>Festuca ambigua</i> Le Gall, Fl. Morbihan: 731. 1852	Circunmediterránea	Teróf.-cesp.	IV-VI	1-3 dm	M	M	
<i>Vulpia hispanica</i> (Reichard) Kerguelén, Fl. Fr. Suppl. 5: 545. 1979	<i>Festuca maritima</i> L., Sp. Pl.: 75. 1753	Paleotemplada	Teróf.-cesp.	V-VI	5-25 cm	R	R	
<i>Vulpia muralis</i> (Kunth) Nees in Linnaea 19: 694. 1847	<i>Festuca muralis</i> Kunth, Syn. Pl. Aequin. 1: 218. 1822	Circunmediterránea	Teróf.-cesp.	IV-VI	1-5 dm	M	M	
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350. 1978	<i>Festuca maritima</i> L., Sp. Pl.: 75. 1753	Circunmediterránea	Teróf.-cesp.	IV-VI	1-5 dm	RR	R	
<i>Wangenheimia lima</i> (L.) Trin., Fund. Agrost.: 132. 1820		Mediterránea-Iranotauraniana	Teróf.-cesp.	V-VII	5-25 dm	R	R	

<i>Xanthium italicum</i> Moretti in Giom. Fis., ser. 2 5: 326. 1822	<i>Xanthium orientale</i> L., Sp. Pl., ed. 2.: 1400. 1763	Neotropical	Teróf.-esc.	VII-X	2-8 dm	M	M	A
<i>Xanthium spinosum</i> L., Sp. Pl.: 987. 1753		Neotropical	Teróf.-esc.	VII-X	2-7 dm	C	C	A
<i>Xanthium strumarium</i> L., Sp. Pl.: 987. 1753		Cosmopolita	Teróf.-esc.	VII-X	2-8 dm	M	M	A
<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: Xeranthemum No. 2. 1768		Mediter- ránea-Iranotura- niana	Teróf.-esc.	IV-VII	1-4 dm	M	M	
<i>Xiphion vulgare</i> Mill., Gard. Dict. ed. 8: 2. 1768	<i>Iris xiphium</i> L., Sp. Pl.: 40. 1753	Mediterránea W	Geóf.-bulb.	IV-VI	5-10 dm	R	R	
<i>Zinnichellia peltata</i> Bertol., Fl. Ital. Crypt. 10: 10. 1854		Mediterránea-At- lántica	Hidróf.-rad.	V-VII	1-4 dm	RR	R	VI
<i>Zea mays</i> L., Sp. Pl.: 971. 1753		Neotropical	Teróf.-esc.	VII-IX	1-3 m	M	M	A (Cult.-Nat.)

