


**FAUNA VERTEBRADA
DE LA COMARCA
DE REQUENA-UTIEL**

Javier Armero Iranzo

1.- INTRODUCCIÓN: EL ESTUDIO DE LOS ANIMALES:

La zoología es la rama de la biología que estudia los animales. Esta disciplina del saber, fuertemente arraigada en otras regiones de Europa, es en Requena - Utiel poco practicada. Apenas ha habido tradición científica en este sentido en la comarca, si exceptuamos la notable figura de D. Laureano Pérez Arcas, el ilustre entomólogo requenense que llegara a cofundar la prestigiosa Real Sociedad de Historia Natural de España en el siglo XIX. En la actualidad, los estudios zoológicos prestan unos servicios indispensables de cara a la protección de un medio natural cada vez más deteriorado. Por tanto, hoy más que nunca, se hace imprescindible conocer para conservar.



Se expone en este artículo una síntesis de las investigaciones que la delegación comarcal en Requena-Utiel de la Societat Valenciana d'Ornitologia ha ido desarrollando en los últimos años en esta comarca sobre la situación de su fauna vertebrada.

Se tiene constancia de al menos 288 especies distintas, de las que la inmensa mayoría, 205, corresponden a aves. De mamíferos se conocen 42 especies, 17 de reptiles, 16 de peces y únicamente 8 de anfibios. No obstante se debe insistir más en el desarrollo de estudios de campo que saquen a la luz nuevas especies, no citadas aún, especialmente en lo que respecta a aves y en menor medida a mamíferos y peces.

La conservación de este importante patrimonio natural pasa, primeramente, por el conocimiento exhaustivo de sus valores, para poder después identificar las distintas problemáticas ambientales y abordar, por último, las políticas necesarias y medidas concretas de preservación.

El Oso Pardo, el Lobo, el Quebrantahuesos, el Buitre Negro, el Buitre Leonado, el Águila Imperial o

la Avutarda fueron habitantes de estas tierras hasta que la presión humana las llevó al exterminio. El Lince Ibérico muy probablemente haya llevado el mismo camino. ¿Cuál será la próxima víctima?

2.- PECES:

Los peces, en la comarca de Requena-Utiel, apenas están representados por 16 especies aproximadamente; de las cuáles únicamente la mitad son autóctonas.

Estas son: la Anguila, especie de carácter migratorio y que encuentra en las presas sobre los ríos Magro y Júcar unos obstáculos insalvables en sus viajes hacia o desde el mar; la Trucha Común, de escasa presencia en los tramos más altos del río Cabriel; el Barbo Mediterráneo, bien distribuido por la comarca; la Loina, quizás el vertebrado en mayor peligro de extinción de la Comunidad Valenciana; la Madrilla del Turia, pez endémico de las cuencas de río Turia y Mijares; el Cacho, especie considerada En Peligro en las cuencas del litoral mediterráneo; la Colmilleja, pequeño pez en franco declive poblacional en la comarca; y el Fraile, especie catalogada en Peligro de Extinción a nivel nacional, pero aún con densidades sorprendentes en el río Cabriel.

2.1.-DOS RAREZAS:

El Fraile (*Salaria fluviatilis*):

Es un pececillo de distribución circummediterránea. En España únicamente se le encuentra en las cuencas de los ríos Júcar, Ebro, Fluviá y



Guadiana. Es precisamente en el río Cabriel donde la especie llega incluso a ser abundante, lo que contrasta con el fuerte declive de las poblaciones ibéricas en general. Es de costumbres bentónicas y gusta de refugiarse entre las piedras del río, entre las cuales hace también la puesta.

La Loina (*Chondrostoma arrigonis*):



La Loina es un pez endémico de la Cuenca del río Júcar de ahí que también se le conozca como Madrilla del Júcar. Su distribución original abarcaba prácticamente toda la cuenca, pero en los últimos años ha causado una fuerte disminución de efectivos que la ha dejado al mismo borde de la extinción mundial.

Apenas se ha citado su presencia en la actualidad en unos pocos

sectores del río Cabriel y en bajas densidades. La competencia con otras especies introducidas en esta cuenca como la Boga de Río, por ejemplo, y la regulación de los ríos mediante embalses explican esa brusca rarefacción. En este sentido, los fuertes desembalses de Contre-ras que originan considerables oscilaciones del caudal hídrico del Cabriel pueden incidir negativamente sobre las fuentes de alimento y sobre su biología reproductiva.

2.2.- PECES INTRODUCIDOS:

Muchos son los factores que amenazan la supervivencia de las especies de peces autóctonos en nuestros ríos, pero quizás la introducción por parte del hombre de peces exóticos sea el mayor problema a que se enfrentan estos animales.

La mayor parte de estas introducciones obedecen a causas relacionadas con el fomento de la pesca deportiva. Sin ningún conocimiento y sin criterio alguno sobre el impacto ambiental que puedan generar es, lamentablemente, una práctica demasiado habitual entre los aficionados a este deporte la suelta de especies autóctonas en los ríos.

Los peces introducidos compiten por el espacio y el alimento,



depredan o se hibridan con los autóctonos, introducen parásitos y enfermedades, alteran los delicados procesos ecológicos y reducen la calidad ambiental.

Hoy en Requena-Utiel son ya, al menos, 8 especies exóticas las que habitan en sus ríos. Son las siguientes: Trucha Arco-iris, Lucio, Alburno, Carpa, Gobio, Gambusia, Perca Americana y Lucioperca.

3.- ANFIBIOS:



Únicamente son ocho las especies de anfibios que se distribuyen por los enclaves húmedos de la comarca. Son las siguientes: el Gallipato, único urodelo comarcal, es decir, anfibio que en estado adulto presenta cola y patas no adaptadas al salto; el Sapo Partero Común, cuyos machos suelen acarrear las puestas de huevos hasta encontrar un humedal adecuado donde depositarlos; el Sapillo Pintojo Meridional, nuestro anfibio más escaso y amenazado de extinción y del que se dispone de muy pocas observaciones; el Sapo de Espuelas, con preferencias por los suelos arenosos donde gusta excavar y enterrarse, es especie muy escasa y puntual en la

comarca; el Sapillo Moteado Común, pequeño anfibio de presencia todavía habitual en nuestros enclaves húmedos; el Sapo Común, anfibio totalmente inofensivo y que incomprensiblemente goza de mala reputación; el Sapo Corredor, precioso sapo de elevadas costumbres terrestres y ciertamente común en la demarcación; y la Rana Común, el anfibio más resistente a la alteración del hábitat.

Gallipato (*Pleurodeles waltli*):

Es una especie en acusado declive en Requena-Utiel. Su distribución comarcal cada vez es más reducida y puntual. Es un anfibio asociado tanto a charcas naturales de aguas permanentes o incluso estacionales como a balsones y albercas.



Su rápida desaparición se debe a la pérdida de puntos de agua como consecuencia del abandono de actividades tradicionales, transformación del paisaje, contaminación de las aguas y por la introducción del cangrejo rojo americano que compite por los recursos tróficos e incluso preda sobre sus puestas y larvas.

3.1.- BALSAS Y FUENTES:



La presencia de anfibios en la comarca está estrechamente ligada a sus principales cursos de agua (ríos Cabriel, Magro, Reatillo y Regajo) y sus ramblas tributarias, así como a otros enclaves húmedos menores como son los lavajos, acequias, balsas y fuentes.

Precisamente la conservación de estos últimos enclaves permiten que muchas poblaciones altamente fragmentadas de distintas especies no desaparezcan. Las aguas cristalinas y poco corrientes, con abundante vegetación acuática de las numerosas fuentes y balsas de riego de cientos de partidas agrarias de la demarcación suponen lugares de especial importancia para el establecimiento de unas interesantes comunidades biológicas. El mantenimien-



to, lo más natural posible, de estos valiosos enclaves garantizará la continuidad en el futuro de esos animales tan interesantes pero tan desconocidos como son los anfibios.

4.- REPTILES:

Existe una rica comunidad herpetológica en el ámbito comarcal compuesta por un total de 17 especies de muy distintos requisitos ecológicos y estatus de abundancias relativas.



La única especie de tortuga con la que se cuenta es el Galápagos Leproso. Existen dos especies muy poco conocidas por sus hábitos subterráneos: la Culebrilla Ciega y el Eslizón Ibérico. También hay dos tipos de geco: la Salamanquesa Rosada, de distribución restringida al Bajo Cabriel, y la más habitual Salamanquesa Común. Cuatro especies de lagartijas: la Lagartija Colirroja, típica de los suelos arenosos; la Lagartija Colilarga, muy frecuente en ambientes forestales; la Lagartija Cenicienta, la más escasa y localizada; y la Lagartija Ibérica, común en pueblos y aldeas. Entre los lagartos ibéricos aquí sólo está el Lagarto Ocelado, frecuente y bien distribuido.



Por último contamos con 7 especies de ofidios: la Culebra de Herradura, poco frecuente; la Culebra de Escalera y la Culebra Bastarda, ambas comunes y de gran longitud; la Culebra Lisa Meridional, poco conocida por sus costumbres crepusculares; la Culebra Viperina y la Culebra de Collar, ambas culebras de agua; y la Víbora Hociuda, muy difícil de detectar por su escasez y carácter poco conspicuo.

El Galápagos Leproso (*Mauremys leprosa*):

El Galápagos Leproso es uno de los reptiles más interesantes de la comarca Requena-Utiel. Todavía, se distribuye, aunque de manera muy escasa, por los principales cursos de agua de la zona.



La fragilidad de sus poblaciones y los numerosos problemas de

conservación que le afectan cuestionan la viabilidad de su presencia en la comarca. Entre los factores que le amenazan destacan: la pérdida o alteración del hábitat, la captura y tenencia ilícita de ejemplares, y la posible suelta de tortugas exóticas en los lugares de cría.

4.1.- ¡NO LAS MATES!:

Las culebras y serpientes son animales poco apreciados, e incluso considerados tradicionalmente perjudiciales para los intereses del hombre. Su mala fama les precede desde tiempo inmemorial. Por ignorancia, todavía hoy culebra que se ve, culebra que se mata. Sirvan estas líneas para tratar de cambiar esa imagen de estos interesantes y, ¿por qué no?, hermosos animales.



Los ofidios son unos seres vivos más que intervienen igual que otros en los complejos procesos ecológicos de los ecosistemas mediterráneos. Podrían considerarse, incluso, grandes aliados de los agricultores, pues está demostrado que consumen gran cantidad de roedores y de insectos que podrían constituir una amenaza para los campos. Además son totalmente inofensivos para



el hombre, salvo la Víbora Hociuda, especie tremendamente escasa, y que sólo en contadísimas ocasiones ha hecho uso de su veneno. ¿Por qué matarlas entonces?


5.- AVES:

La comarca de Requena-Utiel presenta una de las más ricas comunidades orníticas de todo el ámbito valenciano. Su enorme superficie y la diversidad de paisajes que ofrece, junto con el desarrollo que la ornitología está experimentando en estas tierras en los últimos años, ha permitido citar ya algo más de 200 especies distintas.

5.1.- RAPACES NOCTURNAS:

Las rapaces nocturnas constituyen un fascinante grupo de aves tanto por su biología peculiar como por su extrema belleza. Lejos de considerarlas aves de mal agüero, son unas excelentes raticidas y controladoras de las poblaciones de roedores. En Requena-Utiel se presentan 7 especies distintas.

El majestuoso Búho Real, todavía habitual en los principales desfiladeros y cantiles de la comarca. El Búho Chico, sin embargo, es de presencia más puntual y ocupa ciertos



pinares próximos a cultivos. El Cárabo, en cambio, es relativamente común en los pinares de montaña. El Autillo, pequeño búho estival, habita de manera común por las choperas de ríos, fuentes y cultivos. El Mochuelo prefiere partidas agrarias arboladas y está bien distribuido. La Lechuza Común, en claro declive poblacional, sólo aparece ya en unos pocos caseríos y pueblos de la zona. De la Lechuza Campestre poco se sabe; citada puntualmente en paso migratorio, quizás sea también invernante, aunque probablemente muy escasa.

5.2.- RAPACES DIURNAS:

Las rapaces diurnas constituyen uno de los grupos de aves más

valiosos en los ecosistemas mediterráneos por su carácter predador y regulador de las poblaciones de otras especies. Por ello y por ser, lógicamente, especies mucho más escasas que otras, están protegidas por la Ley y deben por tanto ser respetadas.

Hasta 24 especies se han localizado en alguna ocasión en la comarca de Requena-Utiel, aunque con efectivos numéricos muy dispares. De éstas, 8 son sedentarias: Águila Real, Águila-azor Perdicera, Elanio Común, Busardo Ratonero, Gavilán, Azor, Cernícalo Vulgar y Halcón Peregrino; 3 son estivales: Culebrera Europea, Aguillilla Calzada y Alcotán; 3 son invernantes: Milano Real, Aguilucho Pálido y Esmerejón; 7 son migrantes: Alimoche, Águila Pesca





dora, Milano Negro, Aguilucho Lagunero, Aguilucho Cenizo, Abejero Europeo y Cernícalo Primilla; y 3 son accidentales: Buitre Común, Buitre Negro y Cernícalo Patirrojo.

Destaca por su escasez a nivel nacional, el grupo de rapaces rupícolas, aves asociadas a los acantilados que aparecen en las principales sierras de la zona. Concretamente el Águila-azor Perdicera, rapaz casi exclusivamente ibérica, está inmersa en un acusado proceso de rarefacción, que si no se invierte puede llevarla a la extinción definitiva. En Requena-Utiel apenas cuenta una exigua población de 7 parejas, de futuro poco halagüeño por los peligros que todavía ocasionan los cazadores, los tendidos eléctricos o las molestias en el entorno de los nidos en época de cría. En una situación similar aquí se encuentran el Águila Real y el Halcón Peregrino, aunque con mayor rango de distribución mundial.

En nuestras bosques todavía crían rapaces no siempre fáciles de detectar: la Culebrera Europea, el Aguililla Calzada, el Busardo Ratonero, el Azor y el Gavilán. Los

trabajos forestales en época de cría y la tala de árboles añosos son dos de los problema a que se enfrentan estas aves.

Mención aparte merece la presencia en esta comarca de la única pareja conocida de Elanio Común en toda la Comunidad Valenciana que, en un sorprendente y gratificante, proceso de expansión y colonización de nuevos territorios ibéricos se ha establecido recientemente aquí.

5.3.- PASERIFORMES:

Aproximadamente la mitad de todas las especies de aves detectadas en la comarca son pájaros; a fecha de hoy, 105, aunque la cifra puede aumentar a medida que se vaya investigando más. Según el tipo de paisaje que exista se presentarán unos pájaros u otros, aunque es cierto que muchas especies son poco exigentes a la hora de establecerse.

Así en los bosques aparecen carboneros comunes y garrapinos, herrerillos capuchinos, y más raramente, herrerillos comunes, mitos, agateadores comunes, mosquiteros papialbos, reyezuelos listados y sencillos, piquituertos, pinzones vulgares, mirlos, etc. En los matorrales y monte bajo son otras las especies típicas: cogujadas montesinas, tarabillas comunes, currucas rabilargas, cabecinegras y tomilleras, escribanos montesinos, etc. En los farallones rocosos se presentan los aviones roqueros, los colirrojos tizones, los roqueros solitarios y rojos (más raramente), los acentores alpinos, etc. En los ríos y bosques de



ribera se presentan lavanderas cascadeñas, bisbitas alpinos, currucas capirotadas y mosquiteras, chochines, ruisenores comunes y bastardos, oropéndolas, etc. En los pocos carrizales y juncuales que existen se han citado especies muy interesantes para una comarca de interior como carriceros comunes y tordales, carricerines comunes, pechiazules, pájaros moscones, escribanos palustres, etc.

En los campos de cultivo la lista de especies es aún mayor: alondras, terreras comunes, e incluso calandrias (puntualmente), en los cereales; cogujadas comunes, collalbas rubias, alcaudones comunes, meridionales y reales, escribanos cerillos, jilgueros, etc. en los videños y otros secanos; verderones, verdecillos, gorriones molineros,

urracas, etc. en los huertos de regadío. Incluso en los pueblos y aldeas aparecen aves: golondrinas comunes, aviones comunes, lavanderas blancas, gorriones comunes, estorninos negros y pintos, etc.

5.4.- AVES ACUÁTICAS:

Requena-Utiel no es una comarca especialmente rica en aves acuáticas. Pocos son los parajes que permiten acoger este tipo de animales. Entre estos destacan los embalses de Contreras y Buseo donde, especialmente en el primero, se dan cita en invierno cierto número de Cormoranes Grandes, Somormujos Lavancos y algunas anátidas. Sin embargo es en pequeños enclaves húmedos como ciertos estanques de riego o depuradoras de aguas residuales donde se observan mayor número de especies, especialmente durante los pasos migratorios: zampullines, anátidas, garzas y, sobre todo, limícolas de todo tipo. En las riberas de ríos, especialmente el Cabriel y el Magro, crían especies como el Anáde Azulón o la Gallineta Común, o incluso puntualmente el Rascón Europeo o el Chorlitejo Chico; mientras que en los pasos son



comunes los Anadriños Chicos y Grandes, y en invernada aparece alguna Agachadiza Común y Becada.

5.5.- OTRAS AVES:

Muchas otras aves de diferentes categorías taxonómicas ocupan el suelo comarcal. Entre las de alimentación granívora aparecen la Perdiz Roja y la Codorniz; tres especies de Paloma: Torcaz, Zurita y Bravía; y dos de Tórtola: Común y Turca.

Destacan, asimismo, el Cuco y el Críalo, conocidos parásitos de otras aves. De comportamiento crepuscular y nocturno, vienen en época de cría los Chotacabras Pardo y Gris. Dos especies de Vencejo existen aquí: el Real, de costumbres rupícolas, y el Común, cada vez más afectado por las restauraciones de tejados y edificios históricos. Y entre las aves más llamativas encontramos las Abubillas, los Abejarucos, los Martines Pescadores e incluso alguna Carraca vista en migración. Por último se cuenta con tres especies de Pícidis: el Pito Real, el cada vez más habitual Pico Picapinos, y el Torcecuello, de estatus todavía algo incierto.



6.- MAMÍFEROS:



Los mamíferos conforman, quizás, el grupo de vertebrados más difícil de estudiar en el campo por sus costumbres escondedizas, y en general, nocturnas. No obstante, el conocimiento que de estos se dispone no es precisamente poco y revela que son al menos 42 especies las que pueblan el territorio comarcal. De todas maneras se hace necesario insistir en la investigación de determinados tipos de mamíferos, como murciélagos o insectívoros, pues existen todavía grandes lagunas sobre el grado de implicación de estos animales en las comunidades biológicas de la zona. En cuanto al resto de especies destaca la notable riqueza de carnívoros, aunque todavía muy perseguidos por el hombre, y la incipiente recolonización de algunos artiodáctilos que fueron exterminados muchas décadas atrás. Estos dos aspectos avalan una cierta calidad ambiental de nuestros montes.

6.1.- INSECTÍVOROS Y QUIRÓPTEROS:

Estos son los vertebrados de que menos información se dispone, y en especial el grupo de quirópteros.

Se hace necesario, pues, desarrollar estudios específicos en pro de un mayor conocimiento sobre la situación de estos animales en la comarca.



Entre los insectívoros se tiene constancia de la presencia del Erizo Europeo en diversos puntos de la demarcación, siendo relativamente frecuente en la vega agrícola del Magro. Probablemente mejor distribución presentan dos especies de musarañas: la Gris y el Musgaño Enano. Del Topo Ibérico apenas se sabe nada; hay indicios de su existencia en localidades del noroeste comarcal, pero falta información al respecto.

En cuanto a los quirópteros, debido a su dificultad de estudio, apenas se tiene el siguiente listado de las 11 especies de cuya presencia en la comarca ha sido comprobada: Murciélago Grande de Herradura, Pequeño de Herradura, Mediterráneo de Herradura, Ratonero Grande, Ratonero Pardo, Enano/de Cabrera, Montañero, Hortelano, Orejudo Gris, de Cueva y Rabudo.

6.2.- ROEDORES Y LAGOMORFOS:

Diez especies de roedores aparecen por los campos y rincones de



Requena-Utiel. Entre ellos destacan, por sus costumbres arborícolas la Ardilla Roja y el Lirón Careto, éste último mucho más escaso y localizado. De hábitos acuáticos, la Rata de Agua, ocupa algunos ríos y ramblas apropiadas.. Existen dos especies de Topillo: el Mediterráneo, relativamente común, y el de Cabrera, interesantísimo endemismo ibérico con varias poblaciones conocidas en junqueras y otros ambientes adecuados de la comarca. Otros roedores, de amplia distribución, son: el Ratón de Campo, el Ratón Casero, el Ratón Moruno, la Rata Negra y la Rata Parda.



La Liebre Ibérica y el Conejo son lagomorfos que por su abundancia son considerados como especies clave en el funcionamiento del Bosque Mediterráneo. La acusada disminución numérica que los conejos han sufrido en las últimas décadas por enferme

dades infecciosas como la hemorragia vírica o la mixomatosis, ha repercutido negativamente en multitud de predadores tanto terrestres como alados a los que sirve de alimento amenazándolas de desaparición.

6.3 CARNÍVOROS:

Los mamíferos carnívoros, al igual que las aves rapaces, cumplen una función importantísima como controladores de los espectaculares incrementos demográficos de las especies presa, cuyas consecuencias en el medio natural serían catastróficas. Fuertemente perseguidos desde antiguo con todo tipo de medios, sus poblaciones hoy están seriamente mermadas.

En la comarca aún se cuenta con 8 especies de mamíferos carnívoros. Sin duda el más común de todos ellos sea el Zorro Rojo, especie oportunista y muy adaptable a la disponibilidad de recursos tróficos del medio. Lamentablemente, el uso de métodos no selectivos de caza, como los lazos o incluso las caja trampa (selectivas a criterio del usuario) que se utilizan para controlar su población afectan negativamente al resto de especies, que estando prote-

gidas por la Ley son capturadas y muertas. En consecuencia se hace imprescindible su total prohibición.

Entre los mustélidos destaca por su pequeño tamaño la Comadreja, que suele ocupar márgenes de cultivos y no rehuye la cercanía de los asentamientos humanos. El Tejón también prefiere partidas agrarias aunque siempre en la cercanía de refugios montañosos. Más forestales son la Garduña, habitual en nuestras sierras, y la Gineta, más escasa y difícil de detectar. Pero sin duda los más valiosos desde el punto de vista de la conservación son dos carnívoros de requerimientos fluviales o al menos riparios: la Nutria y el Turón. La primera, en grave peligro de extinción en la Comunidad Valenciana, tan sólo se ha detectado en el río Cabriel donde mantiene una pequeña población. El Turón, rarísimo en el oriente peninsular, se ha citado únicamente en las riberas del Cabriel y del Regajo.



Entre los felinos únicamente aparece el Gato Montés. Aunque citado en la mayoría de sierras de la comarca corre el riesgo de seguir los pasos del Lince Ibérico que, acosado

por la persecución humana, parece haber desaparecido de nuestros montes en las últimas décadas.

6.4.- ARTIODÁCTILOS:



Hasta siete especies de ungulados silvestres se llegan a presentar en Requena-Utiel. Tres de ellas, el Gamo, el Muflón y el Arrui se localizan en cercados cinegéticos, introducidos por el hombre. Lamentablemente, ya se tiene constancia de algunos ejemplares que, escapados de esos recintos, se han adaptado a vivir en sus inmediaciones, alterando con su presencia todavía más el delicado equilibrio ecológico de estos montes y compitiendo con otras especies autóctonas. El Ciervo, extinguido a primeros del siglo XX, vuelve a aparecer en determinados lugares procedente también de escapes de esos vallados.




Sin embargo, el Corzo y la Cabra Montés, parecen retornar lentamente a colonizar antiguos territorios donde hace ya más de un siglo fueron abatidos los últimos ejemplares. El Corzo aparece, hoy, tímidamente en los bosques de Sinarcas e incluso de Utiel procedente de la Serranía Baja Conquense; la Cabra, ocupa los riscos del río Cabriel y sus ramblas aledañas, así como las Sierras de Martés y de las Cabrillas, e incluso parece expandirse por el entorno de Chera. El Jabalí, por su parte, es un animal relativamente común por casi todos los montes de la comarca.

7.- LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA:

La diversidad de fauna vertebrada en Requena-Utiel es muy elevada. No obstante existen muchos factores que la amenazan y comprometen seriamente su viabilidad. A continuación se exponen los principales problemas de conservación de estos animales. Se adjunta un mapa comarcal con los espacios naturales de mayor importancia para la fauna y que necesitan de una urgente protección administrativa que garantice su preservación.

7.1.- TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAT:





La pérdida de hábitats naturales o modificación de los mismos constituye el mayor problema de conservación de los animales de la comarca; en especial de aquellos de requerimientos ecológicos más exigentes.

Entre las afecciones más significativas destacan las siguientes: la simplificación de los paisajes agrarios tendentes al monocultivo de la vid, la conversión de montes en terrenos agrícolas, el urbanismo creciente, la construcción de nuevas



infraestructuras viarias, la instalación de parques eólicos, los tendidos eléctricos, el azote de los incendios forestales, la repoblación forestal monoespecífica, etc.

7.2.- LA CAZA:

La práctica de la caza tiene unas repercusiones negativas sobre la fauna comarcal. La captura de especies



protegidas (bien por disparo o bien por medio de métodos no selectivos de caza), los problemas derivados de un excesivo censo de escopetas, la inclusión como especies cinegéticas



de animales escasos a nivel comarcal, o la proliferación de vallados cinegéticos son algunos de los problemas que conlleva el desarrollo de esta actividad.

7.3.- LA PESCA:

La pesca deportiva no debería representar ningún problema para nuestros ríos. Sin embargo, la cada vez más habitual práctica de introducir especies piscícolas foráneas en ellos, con el dudoso beneficio para el desarrollo de tal actividad, afecta gravísimamente el delicado equilibrio de unos medios tan sumamente sensibles, y amenaza de extinción especies ya muy raras.



7.4.- CONTAMINACIÓN:

La contaminación de las aguas en esta comarca afecta gravemente a uno de sus espacios naturales de mayor importancia, el río Magro. Las aguas residuales tanto urbanas como industriales de Utiel y Requena principalmente, se vierten muchas veces sin depurar al cauce del río, degradando su caudal, su lecho y sus riberas e impidiendo una mayor representación faunística.


7.5.- MOLESTIAS:

Diversas actividades humanas llevadas a cabo en el medio natural pueden producir puntualmente efectos perniciosos a la fauna. Entre otras destacan la práctica de ciertas actividades depor-

tivas como la escalada, el rafting, el senderismo o la conducción de vehículos todoterreno e incluso de aeroplanos; la apertura indiscriminada de pistas forestales que atraen a excursionistas a parajes hasta entonces tranquilos; o la realización de trabajos forestales en época de cría.



8.- PRINCIPALES ESPACIOS NATURALES A PROTEGER



9.- LA SVO EN REQUENA - UTIEL:

La Societat Valenciana d'Ornitologia es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental consiste en el estudio, protección y divulgación del patrimonio ornítico de la Comunidad Valenciana. Desde hace varios años la SVO cuenta con una activa delegación en la comarca de Requena - Utiel compuesta por personas procedentes de la mayoría de sus municipios.

¿Quieres colaborar con nosotros? (insertar logo svo)

Si te gustan las aves o la naturaleza en general y quieres participar en cualquiera de nuestras actividades puedes contactar con nosotros así:

- svorequeutiel@yahoo.es
- Sede comarcal: C/ San Fernando, nº 2, 2º piso (46.340 Requena).
- Sede central: Gran Vía Marqués del Turia, nº 28 (46.005 Valencia).

IMÁGENES CEDIDAS POR:

- C.I.P.-Conselleria de Territorio y Vivienda • Javier Armero
- Carlos Sáez • Gabriel Llorens / Javier Barona
- Gloria Priego • Jesús Martínez

